

F. Cirlincione, M. L. Gargano, G. Venturella, G. Balenzano, G. Mirabile, V. Ferraro & P. Colasuonno

The historical fungi collection of the General Herbarium of Palermo (PAL)

Abstract

Cirlincione, F., Gargano, M. L., Venturella, G., Balenzano, G., Mirabile G., Ferraro, V. & Colasuonno, P.: The historical fungi collection of the General Herbarium of Palermo (PAL). — *Borziana* 3: 43-196. 2022.

1707 specific and intraspecific taxa, 698 genera, 254 families are included in the historical fungi collection of the General Herbarium of Palermo, most of which are mycomycetes responsible for diseases on major agricultural crops, with backgrounds from all parts of the world. The most substantial nucleus is represented by the collections of the Italian Cryptogamic Herbarium in which many researchers of the XIX Century participated.

Key words: Biodiversity, Historical data, Scientific collections, Macrofungi, Microfungi.

Introduction

A considerable number of taxonomic, ecological and distributional data on the Kingdom Fungi can still be found scattered in many historical herbaria.

This is a wealth of information of primary importance to researchers engaged in the preparation of checklists, both nationally and regionally, and in mycological census and mapping programs.

Historical collections are also the fundamental basis for cataloging fungal biodiversity information for use in a database (Berendsohn & al. 2010).

In the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), the Italian Ministry of Culture has included a “Digitization” sub-investment among the implementation lines. It is aimed at digitizing the collections of museums, archives and libraries and cultural places, to increase the digital cultural resources available in platforms and thus multiply cultural information.

The Herbarium Mediterraneum Panormitanum (acronym PAL) of the Botanical Garden of the University of Palermo was established in the early 18th century. Its collections (vascular plants, ferns, mosses, liverworts, algae, as well as fungi and lichens) come not only from Sicily but also from different parts of the world: Australia, Africa, Central and South America, Europe, etc. The PAL Herbarium is a recent evolution of the originally separate General Herbarium and Herbarium Siculum, whose collections were estimated at around

200 thousand specimens for the General Herbarium and 60 thousand for the Herbarium Siculum. Today, as a result of new collections and some recent acquisitions, its size is calculated at around 500 thousand specimens.

This study reports data on the historical collection of fungi deposited at the General Herbarium of Palermo (PAL).

Material and methods

The data refer to the following collections: Ch. Magnier, Flora selecta exsiccata, de Thümen, Mycoteca universalis, de Thümen, Fungh. Sup., Ex Herb. de Thümen, Erbario Crittogamico Italiano, Erbario Crittogamico Italiano ser. II, ex herb. Richter, Flora hungarica, Marcus E. Jones, Flora of Arizona, Marcus E. Jones, Flora of New Mexico, Marcus E. Jones, Flora of Texas, Marcus E. Jones, Flora of Utah, F. Schultz, Herbarium Normale ser. II, F. Schultz et F. Winter, Herbarium Heuflerianum, Herbarium R. Horti Bot. Panormitani-Plantae Siculae, Herbarium Feuilleaubeis, J. Arcangeli, Plantae Italicae Exsiccatae, Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccate, Fungi helvetici, A. Baldacci, Iter Creticum 1893, Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, M. Gandoger, Flora Algeriensis exsiccata, O. Debeaux, Plantes de l'Algérie, Rabenhorst, Herb. Mycologicum ed II, Nilagiri & Hohenacker, Pl. Indiae orientalis, Société Helvétique, G.E. Mattei, Fungi bonienses, C. Müller & W. Retzdorff, Flora der Provinz Brandenburg, Hohenacker, Fungi discophori-Cryptogamia Fungi, Hohenacker, Fungi Gasteromycetes. Cryptogamia Fungi, Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol, Flora Galliae et Germaniae exsiccate de C.B., Flora hassiaria, Flora von Darmstadt et Herb. Delpino.

The taxa are listed in alphabetical order, and the transcription in the original language of the handwritten or printed label of the herbarium specimens is given for each one.

Parts of the labels that are illegible due to bad handwriting or deterioration of the paper material are indicated with the symbol [...].

The scientific binomials and trinomials and their authors' names were updated using Index Fungorum of CABI-Biosciences (<http://www.indexfungorum.org/names/names.asp>) while the names of the collectors were compared with those reported by Nepi & Cuccuini (1992) and Cuccuini (1997).

List of taxa

Abortiporus biennis (Bull.) Singer [*Podoscyphaceae*]

sub: *Polyporus biennis* f. *rufescens*; ne ceppi di pino; a Collecchio, provincia di Parma; Autunno 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Acrospermum compressum Tode [*Acrospermaceae*]

caules plantarum exsiccatos; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Acrospermum graminum Lib. [*Acrospermaceae*]

in foliis exsiccatis Elymi europaei aliorumque graminum; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les chaumes morts des graminees; dans les dunes d'Ostende.

Actinonema robergi (Desm.) Sacc. [*Gnomoniaceae*]
dans l'intérieur des tiges mortes de l'*Heracleum sphondylium*.

Aecidiolum exanthematicum Unger [*Pucciniaceae*]
sub: *A. exanthematicum* Unger f. *cyparissias*; Franconia: prope Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Aecidium aconiti-napelli (DC.) G. Winter [*Pucciniaceae*]
sub: *A. aconiti-napelli* DC.; ad *Aconiti napelli* L. folia viva; in Monte "Rigi" prope Luzern (Helvetia); frequens; altit. ca. 1500 meter; Juni 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, *Fungi selecti exsiccati*, *Fungi helvetici* no. 157.

Aecidium actaeae Wallr. [*Pucciniaceae*]
Bohemia pr. Osseg; 6. 1873; Ex herb. de Thümen; sulle foglie _dell' *Actea spicata*; a Riva in Valsesia; 1865; *Carestia*; *Erbario Crittogamico Italiano ser. II*.

Aecidium calystegiae Desm. [*Pucciniaceae*]
alle foglie della *Calystegia sepium*; presso Bolzano nel Tirolo meridionale; Giugno 1868; Hausmann; *Erbario Crittogamico Italiano*.

Aecidium cathartici Schumach. [*Pucciniaceae*]
Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Aecidium cichoriae Fr. [*Pucciniaceae*]
Avignon; dans les lieux sauvages; par M. Duna.

Aecidium circaeae Ces. [*Pucciniaceae*]
sub: *A. circaeae* Ces. et Mont.; presso Oldenico, provincia di Vercelli; estate 1860; Malinverni; *Erbario Crittogamico Italiano*.

Aecidium convolvulacearum Ces. [*Pucciniaceae*]
nei dintorni di Oldenico, nel Vercellese; 1857; Malinverni.

Aecidium cornutum J. F. Gmel. [*Pucciniaceae*]
in *Sorbi aucupari*; Iglo, Hungaria; 1878; Aug.; leg. Dick.; [...]; Botzen; Haussman.

Aecidium crepidis Wallr. [*Pucciniaceae*]
sub: *A. crepidis* f. *Crepis paludosae*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Aecidium cressae DC. [*Pucciniaceae*]
dans les champs, [...]; sur la *Cressa cretica*; 13 aofit 1874; [...]; sur la *Cressa cretica*; Oran, Lac [...].]; 17 Jun 1884; 0. Debeaux, *Plantes de l'Algerie*; El Paso; 22 April 1884; Marcus E. Jones A. M.; Marcus E. Jones, *Flora of Texas*.

Aecidium fediae Bals. [*Pucciniaceae*]
sulle foglie della valerianella; ne campi presso Lucca; Maggio 1860; Bicchi; *Erbario Crittogamico Italiano*.

Aecidium laceratum Sowerby [*Pucciniaceae*]

Perpignan (Pyr. Orient.); 26 Mai 1876; O. Debeaux.

Aecidium lampsanae Westend. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Lampsana communis*; aux environs de Namur; Mr l'Abbe Bellynck.

Aecidium leucoji Bergam. [*Pucciniaceae*]

sub: *A. leucojii* Bals. et De Not.; sulle foglie del *Leucojum aestivum*; presso Pavia; 1866; Gibelli; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Aecidium loniceræ Duby. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie della *Lonicera caerulea*; al Monte Cenisio; Agosto 1857; Cesati, Malinverni.

Aecidium majanthæ Schumach. [*Pucciniaceae*]

sub: *A. majanthemi* Schumach.; Franconia: Bayreuth; 5.1874; Ex herb. de Thümen.

Aecidium molluginis Wurth [*Pucciniaceae*]

sub: *A. molluginis* Bals. et De Not.; sul *Galium mollugo*; presso Locarno; Daldini, Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Aecidium orobi Pers. [*Pucciniaceae*]

de Thümen, Fungh. Suph. n. 638; sur les feuilles de l'*Orobus vernus*; aux environs de Namur; Mr l'Abbe Bellynck.

Aecidium phaceliae Peck [*Pucciniaceae*]

Thistle, Wasatch Mts.; August 1883; collected by Marcus E. Jones A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah.

Aecidium phaseolorum Wallr. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Phaseolus vulgaris*; aux environs de Courtrai.

Aecidium senecionis Desm. [*Pucciniaceae*]

sub: *A. senecionis* Desm. f. *Senecio fuchsii*; Bohemia: Königswald; 6.1873; Ex herb. de Thümen.

Aecidium sonchi Westend. [*Pucciniaceae*]

sur les tiges et plus rarement sur les feuilles du *Sonchus oleraceus*; dans un champ de betteraves, pres de Courtrai.

Aecidium statices Desm. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Statice armeria*; dans les jardin du college de la Paix, a Namur; Mr Bellynck.

Aecidium valerianearum Duby [*Pucciniaceae*]

sub: *A. valerianearum*, *Centranthi calcitrape*; inviata a Saccardo il 26 marzo.

Aecidium verbasci Ces. [*Pucciniaceae*]

Verbascum phlom.; N-Varad; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; dintorni di Vercelli; Estate 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; Austria inf.: Krems; 8. 1870; Ex herb. de Thümen.

Aecidium verrucosum Schultzer [*Pucciniaceae*]

Chamarophillo bulbo; Podhny; leg. Holuby; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Aecidium sp. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie dell'*Inula viscosa*; Chiavari; VIII. 1890; F. Delpino; Herb. Delpino; sulle foglie dell'*Euphorbia peplus*; Chiavari; VIII. 1890; F. Delpino; Herb. Delpino.

Agaricus calopus Pers. [*Agaricaceae*]

in fagetis locis graminosis; Aug.-Sept.; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Agaricus rubiginosus Schumach. [*Agaricaceae*]

mousses; dans les bois des environs de Namur; Mr le Professeur Bellynck.

Agaricus trechisporus Berk. [*Agaricaceae*]

nelle pinete ed abetaie; Collecchio, presso Parma; Novembre 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Agaricus sp. [*Agaricaceae*]

nell'Orto botanico di Bologna; V. 1885; F. Delpino; Herb. Delpino.

Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [*Strophariaceae*]

in arvis inter corticem coriariorum; Autunno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Agrocybe vervacti (Fr.) Singer [*Strophariaceae*]

sub: *Agaricus vervacti* Fr.; nei prati; a Vigheffio ed a Gasine, presso Parma; Autunno 1866; Passerini.

Agyriella nitida Lib. ex Sacc. [*Stictidaceae*]

ad ramos *Pruni padii* et *Rubi fruticosi* siccos; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. & Pouzar [*Albatrellaceae*]

sub: *Polyporus ovinus* (Schaeff.) Fr., Lindenberg; leg. Heufler.

Albugo candida (Pers. ex J.F. Gmel.) Roussel [*Albuginaceae*]

sub: *Cystopus candidus* de Bary f. *Sisymbri officinalis*; Franconia: Bayreuth; VIII. 1874, Dr. Walther; sub: *Cystopus candidus* Lev.; su *Capsella bursa-pastoris*; 18 gennaio 1874; De Bary; sub: *Cystopus candidus* Lev.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Cystopus candidus* Lev.; sulla *Capsella bursa-pastoris* nell'Orto botanico dell'Università di Pisa; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Cystopus candidus* Lev.; sulla *Matthiola incana*; Albissola marina; primavera 1861; Pi. Savi, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *Cystopus candidus* de Bary. f. *Sisymbri thaliani*; Franconia: Bayreuth; V. 1874; Ex herb de Thümen; sub: *Cystopus candidus* (Pers.) Lév., sopra la *Senediera coronopus*; Castiglione dei Pepoli; agosto 1889; F. Delpino; Herb. Delpino; sub: *Uredo candida* Rabenh. b. *pyrethri* Nob.; sur les feuilles du *Pyrethrum parthenium* Smith; trouvé ou jardin du Collège de la Paix à Namur; par le révérend Père Haan; Mr l'Abbé Bellynck.

Albugo portulacaeum (Selina) Kochman & T. Majewski [*Albuginaceae*]

sub: *Cystopus portulacae* Lev.; sulla *Portulaca oleracea*; negli Orti di Parma; Luglio 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser II.

Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza aurantia* Oed.; sul pendio ombreggiato di un colle e suolo in massima parte siliceo;

Biella; Settembre 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Peziza aurantia* Oed.; sur la terre argilleuse; dans les Bois des environs de Namur; l' Abbe Bellynck.

Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schröt. [*Stereaceae*]

Bohemia: Teplitz; 5. 1873; sub: *C. amorphum* Fr.; sui rami secchi dei larici e degli abeti; presso Riva in Valsesia; 1858; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. amorphum* Fr.; sugli abeti in deperimento; a Riva, in Valsesia; 1869; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Aleurodiscus aurantius (Pers.) J. Schrot. [*Stereaceae*]

sub: *Thelephora rubi*; ad ramos Ruborum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Aleurodiscus disciformis (DC.) Pat. [*Stereaceae*]

sub: *Stereum disciforme* Fr., sulle querce; a S. Giovanni di Campiglia, nel Biellese; Sept 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Allantonectria miltina (Durieu & Mont.) Weese [*Incertae Sedis*]

sub: *Nectria miltina* Mouton, ad folia marcescentia *Agaves americanae*; etam in H. Botanico Neapoli; sat frequens utraque formae; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Allodus prostii (Moug. ex Duby) S. Ullah, Aime, Abbasi & Khalid [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia prostii* Moug. ex Duby; sulle foglie di bulbi sterili di una *Tulipa*; nei prati del giardino pubblico a Parma; Aprile 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. prostii* Duby; in foliis *Tulipae*; de Thümen, Fungh. Suph. n. 374; in *Tulipa sylvestris*; Parmae; Mart.-Apr.; G. Passerini.

Alternaria septorioides (Westend.) E.G. Simmons [*Pleopsoraceae*]

Sporidesmium septorioides Westend., sur les feuilles languissantes du *Reseda odorata*; Septembre-October; à Courtrai.

Amanita caesarea (Scop.) Pers. [*Amanitaceae*]

sub: *A. caesarea* Fr.; dintorni di Oldenico, nel Vercellese; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Amanita muscaria (L.) Lam. [*Amanitaceae*]

sub: *A. muscaria* L.; Bohemia: Zinnwald; 9. 1873; Ex herb. de Thümen.

Ambarignomonium petiolorum (Schwein.) Sogonov [*Gnomoniaceae*]

sub: *Sphaeria petiolorum* Schwein, ad petiolos foliorum emortuorum Coryli; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ampelomyces quisqualis Ces. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *A. quisqualis* Ces.; Biella, Piemont; Hohenack Arzn u. Handelspf. no. 719.

Amphisphaeria umbrina (Fr.) De Not. [*Amphisphaeriaceae*]

sub: *A. conica* Schumach.; sul legno morto ed indurato di quercia; ne cedui a Collecchio, presso Parma; Autunno 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Sphaeria umbrina* Fr., sulla corteccia degli olmi annosi; nei dintorni di Firenze; 1858; Caldesi.

Anaphysmene heraclei (Lib.) Bubak [*Incertae Sedis*]

sub: *Cheilaria heraclei* Lib.; ad caules *Heraclei sphondilii*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Anisogramma virgultorum (Fr.) Theiss. & Syd. [*Incertae Sedis*]

sub: *Hypoxylon virgultorum* Fr., sui rami e ramoscelli della *Betula alba*; S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella; Agosto 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Annulohypoxylon michelianum (Ces. & De Not.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh [*Hypoxylaceae*]

sub: *Hypoxylon michelianum* Ces. & De Not., *Laurus nobilis*; nell'Orto botanico di Pisa; 1862; leg. O. Beccari; Rabenhorst, Fungi europaei, sui ceppi de vecchi allori; nell'Orto botanico di Pisa; 1862; Prof. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. michelianum* De Not.; su ceppi di vecchi allori; all'Orto botanico di Pisà; 1868; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Antennariella elaeophila (Mont.) Bat. & Cif. [*Capnodiaceae*]

sub: *Antennina elaeophila*; sulle foglie e rami degli olivi ad Argiano, provincia Senese, nei possessi del Sig. Conte Ferdinando Pieri Pecci de Marchesi Ballati Merli; Marzo 1862; Prof. A. Tassi; Erbario Crittogamico Italiano.

Antherospora vaillantii (Tul. & C. Tul.) R. Bauer, M. Lutz, Begerow, Piątek & Vánky [*Ustilaginaceae*]

sub: *Ustilago vaillantii* Tul. & C. Tul., nei fiori del *Muscari comosum*; a Parma; Maggio 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Anthostoma gastrinum (Fr.) Sacc. [*Diatrypaceae*]

sub: *Hypoxylon gastrinum* (Fr.) Fr., sur des branches mortes de Forme; à Bavichove près de Courtrai.

Anthostoma melanotes (Berk. & Broome) Sacc. [*Diatrypaceae*]

sub: *A. schmidtii* Nke. f. *castaneae*; Venetia: Treviso; 9.1874; leg. Saccardo; Ex herb. de Thümen.

Anthostoma turgidum (Pers.) Nitschke [*Diatrypaceae*]

sub: *Valsa turgida* Fr.; sur les branches du hêtre; aux environs de Louvain; Mr l' Abbé Leburton.

Anthostomella lugubris (Roberge ex Desm.) Sacc. [*Xylariaceae*]

sub: *Sphaeria lugubris* Rob., sur les feuilles mortes de l'*Ammophila arenaria*; dans les dunes d'Ostende.

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst. [*Fomitopsidaceae*]

sub: *Polyporus sinuosus* Fr., su rami di quercia putridi; nella Selva Pisana; Ottobre 1863; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Apiognomonia errabunda (Roberge ex Desm.) Höhn. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Gloeosporium fagi* Westend.; sur les feuilles languissantes ou mourantes du hêtre; à la campagne de W Goethals Delevigne; près de Courtrai; sub: *Gloeosporium quercinum* Westend.; sur les feuilles languissantes du chêne; au bois de Mr Vandenpeereboom-Delacroix; à Courtrai.

Apiognomonia veneta (Sacc. & Speg.) Höhn. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Fusarium nervisequum* Fuckel f. *Platani acerifoliae*; Bohemia: Tetschen; 10. 1873; Ex herb. de Thümen.

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini [*Lycoperdaceae*]

sub: *Lycoperdon pyriforme* Schaeff.; Aidone, Valle di Stura, sulle Alpi marittime; Sett. 1874; C. Bagnis; sub: *L. pyriforme* Schaeff.; appié dé larici; a Riva in Valsesia; 1869; Carestia; Erbario

Crittogamico Italiano ser. II; sub: *L. pyriforme* Schaeff.; nell'abetaie; Boscolungo nell'Appennino Pistoiese; Autunno 1862; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano.

Apiognomonium erythrostoma (Pers.) Höhn. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Ascochyta effusa* Lib.; in foliis *Pruni avium*; Autunno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *Ascochyta stipata* Lib.; ad folia *Pruni padi*; Autunno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Apiosporopsis carpinea (Fr.) Mariani . [*Apiosporopsidaceae*]

sub: *Ascospora carpinea* Fr., Kent; Vere; 1861; leg. C. A. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Sphaeria carpinea* Fr., croit sur les feuilles mortes du charme (*Carpinus betula*); pendant l'hiver; aux environs de Courtrai.

Aplosporella ruborum (Ellis) Petr. [*Aplosporellaceae*]

sub: *Sphaeria ruborum* Schwein., ad ramos *Ruborum putrescentes*; Perennis; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel [*Arachnopezizaceae*]

sub: *Peziza aurelia* Pers., in fagetis; ad ligna et muscos; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. [*Physalacriaceae*]

sub: *Agaricus melleus* L.; ad pedes Salicum utque Robiniarum caulis; Octobre 1889; Auctore G. E. Mattei; G. E. Mattei, Fungi Bononienses; sub: *Agaricus melleus* Vahl.; su un tronco di melo; a Faenza; Nov. 1863; Caldesi; sub: *Agaricus melleus* Vahl.; nei castagneti; presso Pontedecimo, sopra Genova; Octobre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Arthrimum phaeospermum (Corda) M.B. Ellis [*Apiosporaceae*]

sub: *Melanconium sphaerospermum* (Pers.) Link var. *donacis* Thiim; in culmis siccis *Arundinis donacis*; Graecia: Athenas; leg. de Heldreich; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *M. sphaerospermum* Link; sur les chaumes de l'*Arundo phragmites*; su vecchie canne; a Persolino, presso Faenza; Luglio 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Arthrimum puccinioides Kunze [*Apiosporaceae*]

sub: *Goniosporium puccinioides* Link.; sulle carici palustri essiccate; nei dintorni di Vercelli, Piemonte; Primavera 1858; Cesati; sub: *G. puccinioides* Link.; in foliis aridis Caricum; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Arthrimum sporoplaeum Ces. [*Apiosporaceae*]

in foliis aridis *Luzulae albidae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sulle carici; a Brescia; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Arthrospis microsperma (Berk. & Broome) Sigler sub: [*Erysiphaceae*]

sub: *Oidium microspermum* Berk. & Broome, in cortice *Pini sylvestris*; Batheaston; Feb. 1871; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascobolus immarginatus Becc. [*Ascobolaceae*]

sulle masse di concio; nell'Orto botanico di Pisa; Febbraio, Marzo 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Ascobolus macrosporus P. Crouan & H. Crouan [*Ascobolaceae*]
in fimo vaccino; prope Bath, Angliae; Octb. 1867; G. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascobolus tetricum Carestia [*Ascobolaceae*]
cum *Sporormia promiscua* Carestia; sugli escrementi invernali del *Tetrao tetrix*; Riva in Valsesia; Abbe Carestia; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascochyta aegopodi Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis languentibus *Aegopodi podagrariae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascochyta aesculi Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Aesculi hippocastani*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ascochyta anemones Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Anemone nemorosae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ascochyta aquifolii Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis siccis *Ilicis aquifolii*, raro in caulibus et foliis *Vincae minoris*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Ascochyta caulina (P. Karst.) Aa & Kesteren [*Didymellaceae*]
sub: *Phyllosticta atriplicis* Desm.; ad folia *Atriplicis latifoliae*; Lipsiae; Julio 1868; leg. Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Phyllosticta atriplicis* Westend.; sur les feuilles de l'*Atriplex hastatus*, ainsi que sur celles de quelques espèces de *Chenopodium*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Ascochyta corni Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Corni sanguineae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascochyta crataegi Fuckel [*Didymellaceae*]
sub: *A. crataegi* Lib.; in foliis *Crataegi oxyacanthae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Ascochyta cytisi Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Cytisi laburni*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ascochyta equiseti (Desm.) Grove [*Didymellaceae*]
sub: *Phoma equiseti* Desm., sur les tiges de l'*Equisetum arvense*; au mont d'Avelghem; Automne.

Ascochyta grossulariae Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Ribis grossulariae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Ascochyta hippocastani Lib. [*Didymellaceae*]
in cortice ramorum *Aesculi hippocastani*; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ascochyta kabatiana Trotter [*Didymellaceae*]
sub: *Phyllosticta cytisi* Desm., sur les feuilles du *Cytisus laburnum*; dans le jardin de M.

Vanderplancken, jardinier fleuriste à Menin; pendant l'automne; in foliis *Cytisi laburni*; Constanz; Augusto; leg. Stizenberger; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascochyta menyanthes Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Menyanthis trifoliatae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Ascochyta quercicola Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Quercus*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Ascochyta quercina Lib. [*Didymellaceae*]
ad corticem *Quercus*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascochyta rosarum Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis languescentibus *Rosae tomentosae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascochyta sedi Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis *Sedi telephii*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Ascochyta siliquastri Pass. [*Didymellaceae*]
ad legumina adhuc pendula *Cercis siliquastri* L.; Colorno prov. Parmens.; Januario–Martio; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascochyta strobilina Lib. [*Didymellaceae*]
in pagina exteriore squamarum *Pini abietis* et *Piceae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Ascochyta syringae (Westend.) Bres. [*Didymellaceae*]
sub: *Phyllosticta syringae* Westend., épiphyllie sur les feuilles mourantes du lilas commun (*Syringa vulgaris*); au jardin de M^{re} Ve Pycke, à Courtrai.

Ascochyta tenerrima Sacc. & Roum. [*Didymellaceae*]
sub: *Phyllosticta lonicerae* Westend.; amphigène sur les feuilles du *Lonicera peryclimenum*; aux environs de Namur; le R. P. Bourquenoud; sub: *Phyllosticta symphoricarpi* Westend., Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Ascochyta vaccinii Lib. [*Didymellaceae*]
ad folia dejecta *Vaccinii vitis-idaea*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascochyta virgaureae Lib. [*Didymellaceae*]
in foliis languescentibus *Solidaginis virgaureae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson [*Gelatinodiscaceae*]
sub: *Bulgaria sarcoides* Fr., sui ceppi fracidi dei faggi; a S. Giovanni di Campiglia nel Biellese; Settembre 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Ascodichaena rugosa Butin [*Ascodichaenaceae*]
sub: *Psilospora faginea* (Pers.) Rabenh., sulla scorza di giovani faggi; né boschi di Collecchio presso

Parma; 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *Psilospora quercus* Rabenh., su rami di *Quercus pubescens*; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1869; Hausmann.

Ascophanus franzonianus (De Not.) Boud. [*Thelebolaceae*]

sub: *Pyronema franzonianum* De Not., sulle paste per carta; presso Locarno; 1862; Baglietto, Franzoni.

Ascospora microscopica Niessl [*Incertae Sedis*]

in foliis semiputridis *Rubi fruticosi*; prope Voitsberg (Stiria); leg. G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascospora pulverulenta Riess [*Incertae Sedis*]

Austria inf.: Krems; 10.1871; Ex herb. de Thümen.

Ascotricha chartarum Berk. [*Xylariaceae*]

on white printed paper; Batheaton; C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ascozonus solms-laubachii (Rabenh.) Brumm. [*Thelebolaceae*]

sub: *Ascobolus solms-laubachii* Rabenh., Laubach pr. Giessen; leg. Com. Fr. Solms Laubach; Rabenhorst, Fungi europaei.

Aspergillus clavatus Desm. [*Aspergillaceae*]

durch Kultur gewonnen, Conidienpilz; Strassburg; 1877; Wilhelm; Rabenhorst, Fungi europaei.

Aspergillus flavus Link [*Aspergillaceae*]

sub: *A. flavus* (Link.) Bref.; durch Kultur gewonnen; Brefeld; Rabenhorst, Fungi europaei.

Aspergillus glaucus (L.) Link [*Erysiphaceae*]

sub: *E. herbariorum* Link; piante d'erbario nei luoghi umidi; sub: *E. herbariorum* Link; leg. Heufler; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Aspergillus niger Thiegh. [*Aspergillaceae*]

durch Kultur gewonnen, sclerotien; Strassburg; 1877; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *A. niger* Bref.; durch Kultur gewonnen; Brefeld; Rabenhorst, Fungi europaei.

Asterina veronicae (Lib.) Cooke [*Asterinaceae*]

sub: *Dothidea veronicae* Lib., in foliis *Veronicae officinalis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Asteroma alneum (Pers.) B. Sutton. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Leptothyrium alneum* Lib.; ad folia *Alni glutinosae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *Gloeosporium alneum* Westend.; sur les feuilles de l'*Alnus glutinosus*; aux environs de Courtrai; sub: *Dothidea alnea* Fr. sur les feuilles vivantes du *Betula alba* L.; aux environs de Courtrai.

Asteroma betulae Roberge ex Desm. [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. betulae* Rob.; sur les feuilles mortes et tombées à terre du bouleau (*Betula alba*); aux environs d'Ypres.

Asteroma capreae Desm. [*Gnomoniaceae*]

Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Asteroma delicatulum Desm. [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. delicatulum* Desm.; ad legumina *Lunulariae redivivae*; Helvet. Saxonicae; Desmazières; Rabenhorst, Fungi europaei.

Asteroma geographicum (DC.) Desm. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Dothidea geographica* Fr., sur les feuilles mortes du pommier, du poirier, du chêne et du *Crataegus terminalis*; nouvelle pour la Flore Belge.

Asteroma graminis Westend. [*Gnomoniaceae*]

sur les chaumes et les feuilles mortes de l'*Ammophila arundinacea*; dans les dunes d'Ostende.

Asteroma mali Desm. [*Gnomoniaceae*]

feuilles mortes du pommier.

Asteroma padi DC. [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. padi* DC.; in foliis languescens *Pruni padi*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Asteroma paeoniae Westend. [*Gnomoniaceae*]

sur les feuilles de la pivoine ordinaire; dans les jardin de M. d'Hondt, horticulteur à Courtrai.

Asteroma parmelioides Desm. [*Gnomoniaceae*]

R. bosco di Caserta; Febbraio, Marzo 1872; Terracciano; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Asteroma populi Roberge ex Desm. [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. populi* Rob.; a la face supérieure des feuilles mortes des peupliers; aux environs de Courtrai.

Asteroma prunellae Purton [*Gnomoniaceae*]

sur les feuilles, les petioles et même les fleurs vivantes du *Prunella vulgaris*; pendant l'hiver; aux environs de Courtrai.

Asteroma salicis Roberge ex Desm. [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. salicis* Rob.; sur les feuilles du *Salix vitellina* et autres; à Marcke, près de Courtrai.

Asteroma venulosum (Wallr.) Fuckel [*Gnomoniaceae*]

sub: *A. venulosum* Fuckel; Mir scheint die Nfirpflanze nicht Typha, vielmehr Acorus (oder *Sparganium*) zu sein; Fuckel; Rabenhorst, Fungi europaei.

Asteromella anemonicola Aa [*Incertae Sedis*]

sub: *P. anemones* Fuckel; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Asteromella aviculariae (Westend.) Petr. [*Incertae Sedis*]

sub: *Phyllosticta melanoplaca* Westend.; sur les feuilles languissantes du *Polygonum aviculare*; dans les dunes de Nieuport.

Asterosporium asterospermum (Pers.) S. Hughes [*Asterosporiaceae*]

sub: *A. hoffmanni* Kunze; sur un jeune tronc de hêtre; au jardin de Mr Devriesere, jardinier-fleuriste, à Courtrai.

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan [*Diplocystidiaceae*]

sub: *Geaster hygrometricus* Pers.; ad terram; Dresden; Sept 1868; Flora hassiara; sub: *Geaster hygrometricus* Pers.; renai della selva Pisana; Autunno 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *A. stellatus* Pers.; Luglio 1891; F. Delpino; Herb. Delpino.

Atichia mosigii Flot. [*Seuratiaceae*]

Carlsruhe; legit Bausch; Rabenhorst, Fungi europaei.

Atopospora betulina (Fr.) Petr. [*Dothideaceae*]

sub: *Dothidea betulina* Fr.; ad folia *Betulae albae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. 11(1832); sub: *D. betulina* Fr.; sulle foglie di *Betula alba*; a S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella; Agosto 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; [...]; leg. Heufler.

Aulographum hederæ Lib. [*Aulographaceae*]

ad folia dejecta *Hederæ*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sub: *A. vagum* Desm. f. *rhododendri*; ad paginam superiorem, rarius inferiorem foliorum *Rhododendri hirsuti*; Biberwier pr. Lermoos (Tirol); 25 Juni 1869; Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei, cette espèce est souvent mêlée sur la même feuille avec le *Microthyrium microscopicum*, l'*Eustegia ilicis*, etc.; du moins dans nos échantillons qui ont été trouvés sur les feuilles du Houx; on le reconte aussi sur d'autres plantes à feuilles dures et persistantes.

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quéf. [*Auriculariaceae*]

sub: *Exidia auricula* Fr.; sur les troncs de vieux sureaux; aux environs de Mons; Mrs Michot et Dumont; sub: *Exidia auricula-judae* Fr.; sui pali delle viti; nella Valle del Serchio, in Toscana; Autunno 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Exidia auricula-judae* Fr.; su un *Ailanthus* morente; all'Acquasola a Genova; Autunno 1859; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Exidia auricula-judae* Fr.; *Sambucus*; Sud Deutschland; Hohenacker Arzn. u. Handelsplf 851; Fungi, Gasteromycetes - Cryptogamia Fungi; sub: *Exidia auricula-judae* L.; ad arborum truncos prope *Betulas*; ad [...], Florentiae; Marzo 1876; Legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. [*Auriculariaceae*]

sub: *A. mesenterica* Pers.; sul tronco degli alberi; nei dintorni di Montaldéo, nell'alto Monferrato; Maggio 1858; Doria; sub: *A. tremelloides* Bull.; sur un tronc d'arbre mort; à la campagne de Mr Willemse, près de Courtrai; sub: *A. mesenterica* Pers.; Glaggenitz; Heufler.

Auriscalpium vulgare Gray [*Auriscalpiaceae*]

sub: *Hydnum auriscalpium* L.; sui conii fracidi del Pinus sylvestris; né boschi di Sala e Collecchio, presso Parma; Autunno 1863; Passerini, Erbario Crittogamico Italiano.

Bactridium album Petch. [*Incertae Sedis*]

in foliis graminum; Bonorden; Rabenhorst, Fungi europaei.

Baggea pachyascus Auersw. [*Patellariaceae*]

ad rudimenta ramulorum exsiccatorum adhuc pendencia in querceto; prope Sugenheim, Franconiae mediae; Dr Rehm; Rabenhorst, Fungi europaei.

Balsamia vulgaris Vittad. [*Helvellaceae*]

Piemonte; Hohenack. Arzn. u. Handespfl. no. 714; Fungi, Gasteromycetes -Cryptogamia Fungi.

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. [*Cordycipitaceae*]

sub: *Botrytis bassiana* Bals. - Criv., dalle bigatterie di Oldenico, presso Vercelli; Primavera 1861; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; Unter der Namen Muscardina Mal del Legno; Calcine; als deu Seidenraupen verderblich, Piemont.

Belonidium pruinorum (Jerdon ex Berk. & Broome) Rehm [*Lachnaceae*]

sub: *Helotium pruinorum* Jerdon, Batheaston; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Bertia moriformis (Tode) De Not. [*Bertiaceae*]

sub: *B. moriformis* De Not.; sul rododendro; a Riva in Valsesia; 1869; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Bionectria ralfsii (Berk. & Broome) Schroers & Samuels [*Bionectriaceae*]

sub: *Nectria ralfsii* Berk, Penzance; Cornwall; J. Ralfs Esq. in herb. M. J. Berkeley; Rabenhorst, Fungi europaei.

Bipolaris oryzae (Breda de Haan) Shoemaker [*Pleosporaceae*]

sub: *Helminthosporium macrocarpum* Grev., in caulibus siccis *Spiraeorum*, *Ruborum*, etc.; in horto prope Róchlitz ad Reichenberg, Bohemiae; leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei; in ramulis dejecti *Coryli* et *Alni*; prope Gratz, leg. G. von Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les branches mortes de l'*Aulne glutineux*; aux environs d'Ypres.

Biscogniauxia nummularia (Bull.) Kuntze [*Graphostromataceae*]

sub: *Hypoxylon nummularium* Bull., su un tronco secco di *Cytisus alpinus*; a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Agosto 1858; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Biscogniauxia repanda (Fr.) Kuntze [*Graphostromataceae*]

sub: *Hypoxylon repandum* Fr., sui tronchi scortecciati di antichi *Sorbus aucupari*; a Riva in Valsesia; Maggio 1868; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Bispora antennata (Pers.) E.W. Mason [*Incertae Sedis*]

sub: *Torula antennata* Pers., sur les branches coupées en biseau ou cassées sur les capeaux de chéne; dans les coupes de bois, etc.

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. [*Phanerochaetaceae*]

sub: *Polyporus adustus* Fr.; sugli alberi morti; a Faenza; Dicembre 1863; Caldesi; sub: *P. adustus* Fr.; ad ligna cariata; M. Senario (Florentiae); 15 Martio 1876; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Blitridium enteroleucum Pass. [*Triblidiaceae*]

in cortice annoso *Castanae rusticae*; raro; Collecchio prope Parmam; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Blumeria graminis (DC.) Spee [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe graminis* DC., sur les feuilles de l'*Agropyron repens* De Not. (*Triticum repens* L.); dans les moissons; aux environs de Courtrai; Août.

Blumeriella jaapii (Rehm) Arx [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Ascochyta padi* Lib.; in foliis languescensibus *Pruni padi*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Boletus debeauxi Roumeuguère [*Boletaceae*]

bois de *Pinus*; Oran (Algérie); 16 avril 1884; 0. Debeaux, Plantes de l'Algérie.

Boletus edulis Bull. [*Boletaceae*]

[...]; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Boletus flavus Bull. [*Boletaceae*]

[...]; bei Duisburg; leg. Heufler.

Bombardia bombardia (Batsch) J. Schröt. [*Bombardiaceae*]

sub: *Bertia bombardia* (Batsch) Ces. & De Not., su tronchi fracidi di frassino; a S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella; Settembre 1864; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Bombardioidea stercoris (DC.) N. Lundq. [*Bombardiaceae*]

sub: *Sphaeria stercoris* DC., [...]; Austria inf.; 4.8.1857; leg. Heufler.

Botryodiplodia jasmini (Westend.) Petr. [*Incertae Sedis*]

sub: *Diplodia jasmini* Westend., sur les branches mortes du jasminum (*Jasminum officinale*); dans les jardins à Courtrai.

Botryosphaeria berengeriana De Not. [*Botryosphaeriaceae*]

sui rami secchi di pioppo; nei dintorni di Caserta; 1871; Terracciano; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *B. berengeriana* De Not. f. *Juglandis regiae*; Padova; Dec. 1876; P. A. Saccardo; Rabenhorst, Fungi europaei; in ramis aridis *Populi nigrae*; Parmae; Vere; 1872; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Dothidea rosae* Fr., sulla corteccia delle rose selvatiche; a Riva in Valsesia; 1865; Carestia; sub: *Sphaeria dothidea a rosae* Fr.; dans les jardins de St George à Courtrai; printemps.

Botryosphaeria festucae (Lib.) Arx & E. Müll. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria festucae* Lib., sur le feuilles mortes du *Festuca sylvatica*; dans les bois entre Bande et le relais de Champlon, Luxembourg; Mr Crépin; in foliis emortuis *Festucae sylvaticae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Botryosphaeria visci (Kalchbr.) Arx & E. Müll. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: sub: *Macropodia visci* Westend.; sur les feuilles du *Viscum album*; dans les Flandres et le Hainaut; le R. P. Clém. Dumont.

Botrytis brunneola Rabenh. [*Sclerotiniaceae*]

in capitulis humi iacentibus; pr. Doemitz; leg. Fielder; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Botrytis cana Kunze & J. C. Schmidt. [*Sclerotiniaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Chenopodium viride* et autres.

Botrytis cinerea Pers. [Sclerotiniaceae]

sub: *Botrytis vulgaris* (Pers.) Fr., dans un cave, sur des navets pourris; à Courtrai.

Botrytis fallax Desm. [Sclerotiniaceae]

sur les feuilles languissantes du *Solanum tuberosum*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Botrytis tulipae (Lib.) Lind [Sclerotiniaceae]

sub: *Sclerotium tulipae* Lib., ad caules, pericarpium et semina *Tulipae gesnerianae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Botrytis violacea Lév. [Sclerotiniaceae]

sur les pétales du *Matricaria chamomilla* et *Pyrethrum arvense*, etc.; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Bovista plumbea Pers. [Lycoperdaceae]

sub: *B. plumbea* Pers.; dans un pré servant de plaine d'exercice; hors la porte de Bruges à Menin, ainsi que sur la plaine Saint-Denis, près de Gand.

Bovista pusilla (Batsch) Pers. [Lycoperdaceae]

sub: *Bovista pusilla* Pers., sub: *Lycoperdon dermoxanthum* Vittad.; pastura di renco; in Val Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1867; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Bremia lactucae Regel [Peronosporaceae]

sub: *Peronospora gangliiformis* de Bary f. *baceae*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb de Thümen; sub: *Peronospora gangliiformis* Berk. f. *Lactucae sativae*; Bohemia: Tetschen; 10. 1873; Ex herb de Thümen; sub: *Peronospora gangliiformis* de Bary f. *Sonchi oleracei*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb de Thümen; sub: *Peronospora gangliiformis* Berk. f. *lampsanae*; ad Reichenberg in Bohemia; saepius in consortio *Puccinia lampsanae*, leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Peronospora gangliiformis* Berk.; ad *Senecionis vulgaris* L. folia; "Hottingen" pr. Zürich (Helvetiae); frequens; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 184; sub: *Peronospora gangliiformis* Berk.; ad *Picris hieracioides* L. folia; "Oerlikon" prope Zürich; Atigust 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 185.

Breviappendix rostellata (Fr.) Senan. & K.D. Hyde [Sydowiellaceae]

sub: *Sphaeria rostellata* Fr., ad ramos *Ruborum*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. 11 (1832).

Broomeola glauca (Berk. & Broome) Kuntze [Incertae Sedis]

sub: *Endodesmia glauca* Berk. & Broome, Batheaston; March 1874; C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Brunnipila palearum (Desm.) Baral [Lachnaceae]

sub: *Peziza palearum* Desm., sur la paille d'un toit de chaume; aux environs de Courtrai.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. [Phacidiaceae]

sub: *Bulgaria inquinans* Pers., ad *Juglandis regia* L. truncos caesos; in monte "Zürich berg" prope Zürich (Helvetiae); raro; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 163; sub: *B. inquinans* (Pers.) Fr. f. *tetraspora*; ad truncos quercinos corticatos

emortuos; Bosco Montello (Treviso); Sept. 1875; P. A. Saccardo; Rabenhorst, Fungi europaei; sul tronco degli alberi; a Campiglia in Valle d'Andorno, Piemonte; Agosto 1857; Cesati; sur du bois pourri; aux environs de Courtrai.

Byssocladium fenestrale Link [*Incertae sedis*]

sur les vitres dans les endroits humides, telles que serres chaudes, écuries, etc.; à Namur; Mr Bellynck.

Caeoma alliorum Link [*Pucciniaceae*]

in foliis Allii cujusdam mihi ignoti; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Caeoma allii-ursini G. Winter [*Pucciniaceae*]

Zürich, Helvetiae; 1880.

Caeoma bistrortae Lib. [*Pucciniaceae*]

in foliis *Polygoni bistrortae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Caeoma flavum Bonord. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie di frumento; a Persolino, presso Faenza; Giugno 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Caeoma hellebori Lib. [*Pucciniaceae*]

in foliis *Hellebori viridis*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1834).

Caeoma luzulae Lib. [*Pucciniaceae*]

feuilles du *Luzulae verna*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Caeoma minutum Lib. [*Pucciniaceae*]

in foliis *Alchemillae vulgaris*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Caeoma padi Lib. [*Pucciniaceae*]

in foliis *Pruni padi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Caeoma scrophulariatum Link. [*Pucciniaceae*]

in caulibus petiolis et foliis *Scrophulariae nodosae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Chaetosphaeria callimorpha (Mont.) Sacc. [*Chaetosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria callimorpha* Mont., sur des rameaux morts et tombées à terre des ronces; dans les bois des environs de Courtrai.

Calloria urticae (Pers.) J. Schröt. ex Rehm [*Calloriaceae*]

sub: *Dacrymyces urticae* Nees, ad caules exsiccatos *Urtica dioicae* et *Solani tuberosi*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *Fusarium tremelloides* Grev., sur les tiges mortes de l'ortie dioïque; printemps; sub: *Peziza neglecta* Lib., in caulibus *Urticae dioicae* exsiccatis et *Solani tuberosi*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les tiges mortes de l'ortie dioïque; aux environs de Courtrai.

Calocera viscosa (Pers.) Fr. [*Dacrymycetaceae*]

sub: *C. viscosa* Fr.; sui tronchi putridi delle conifere; a Riva in Valsesia; 1870; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *C. viscosa* Fr.; [...]; Paul.

Calonectria ciliata (Alb. & Schwein.) W.C. Snyder & H.N. Hansen [*Nectriaceae*]

sub: *Psilonia stipitata* Lib., in caulibus herbarum putridis; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Calophoma complanata (Tode) Qian Chen & L. Cai [*Didymellaceae*]

sub: *Phoma complanata* (Tode) Desm. var. *acuta* Awd; ad caules *Ballotae foetidae*; Aprii 1861; Lipsiae; leg. Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Sphaeria complanata* Tode, ad caules *Senecionis fuchsii* exsiccatos; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sur les tiges mortes de l'*Heracleum spondylium*; aux environs de Courtrai.

Calosphaeria princeps Tul. & C. Tul. [*Calosphaeriaceae*]

sub: *C. princeps* Tul.; sotto la corteccia e talora il peridermio de' ciliegi languenti o morti; ne' colli del Vicentino, Mason, Marostica, Lugo; Marzo 1870; Trevisan; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Calosphaeria pulchella (Pers.) J. Schröt. [*Calosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria puichella* Pers., var. *minor* Fr.; sous l'épiderme du bouleau; dans la Fiandre occidentale.

Calycella lenticularis (Bull.) Boud. [*Helotiaceae*]

sub: *Helotium lenticulare* Fr., sulla nuda terra e sulle foglie putrescenti; nella pineta più vicina a Bormio in Valtellina; Settembre 1868; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Calycella littorea (Fr.) Quél. [*Heliotaceae*]

sub: *Peziza littorea* Fr., sur les chaumes pourrissantes du *Arundo phragmites*; à l'étang de Zillebeke près d'Ypres.

Calycina herbarum (Pers.) Gray [*Pezizellaceae*]

sub: *Helotium herbarum* Pers.; ad Sambuci ebuli L. caules aridos; "Sihlwald" prope Zürich (Helvetiae); raro; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 172; sub: *Helotium herbarum* Fr.; sugli steli disseccati di piante erbacee, *Phytolacca*, *Eupatorium*, ecc.; al Lago Maggiore (Locarno); Autunno 1862; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Helotium herbarum* Fr.; sugli steli disseccati di piante erbacee, *Phytolacca*, *Eupatorium*, ecc.; Val Intrasca; 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Peziza herbarum* Pers., ad caules herbarum exsiccatos; autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Camarosporidiella elongata (Fr.) Wanas., Wijjayaw. & K.D. Hyde [*Camarosporidiellaceae*]

sub: *Cucurbitaria elongata* Grev.; su rami secchi di *Robinia*; a Persolino, presso Faenza; Febbraio 1861; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. elongata* Grev. f. *coronillae*; su rami disseccati di *Cytisus sessilifolius*; a Stazzano presso Serravalle Scrivia; 1863; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria elongata* Fr. sur les branches mortes du *Robinia pseudoacacia*; à Ledeberg-lez-Gand.

Camarosporidiella laburni (Pers.) Wanas., Bulgakov, Camporesi & K.D. Hyde [*Camarosporidiellaceae*]

sub: *Cucurbitaria laburni* De Not.; sui rami secchi del *Cytisus laburnum*; Erbario Crittogamico

Italiano; sub: *C. laburni* De Not.; sui rami secchi del *Cytisus laburnum*; in Valle Intrasca al Lago Maggiore; 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. laburni* De Not.; sur des rameaux morts du *Cytisus sessilifolia*; vallon de St.

Paris de Gemenas; 1 Febr. 1874; sub: *Hendersonia laburni* Westend., sur les jeunes rameaux morts du *Cytisus laburnum*; au jardin de Madame Veuve Pycke, près de Courtrai; sub: *Hypoxylon laburni* Westend. et Vh., sur les branches mortes du *Cytisus laburnum*; au jardin de M. Vanderplanken, jardinier-fleuristic; à Menin.

Camarosporium lantanae (Fleischh.) Sacc. [*Camarosporiaceae*]

sub: *Hendersonia lantanae* Fleischh., inter tomentum foliorum et ramulorum juvenilium Viburni lantani; primo vere; Arnstadt (Thuringiae); Dr. Fleischhack; Rabenhorst, Fungi europaei.

Camarosporium rosarum (Westend.) Sacc. [*Camarosporiaceae*]

sub: *Staurosphaeria rosarum* Westend.; sur les branches et rameaux des Rosièrs à terre; aux environs de Gand; Mr Demey.

Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer [*Hygrophoraceae*]

sub: *Cantharellus umbonatus* Fr., in gratis uliginosis; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Cantharellus cibarius Fr. [*Hydnaceae*]

né castagneti; presso Pegli, Liguria occidentale; Settembre-Ottobre 1865; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; boschi; Castiglion dei Pepoli; Luglio 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Capnodium citri Berk. & Desm. [*Capnodiaceae*]

sulle foglie e sui rami degli agrumi a San Remo nella Liguria occidentale; specie designata volgarmente col nome di morfea; Gennaio 1860; Panizzi; Erbario Crittogamico Italiano.

Capnodium personii Berk. & Desm. [*Capnodiaceae*]

Bohemia: Teplitz; 9.1872; Ex herb de Thümen.

Caryophylloseptoria silenes (Westend.) Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria silenes* Westend., sur les feuilles du *Silene armeria*; au jardin du palais du roi; au camp de Beverloo.

Caryophylloseptoria spergulae (Westend.) Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria spergulae* Westend., sur les tiges languissantes du *Spergula arvensis*; au camp de Beverloo; Mr Tosquinet;

Cejpia hystrix (De Not.) Baral [*Incertae Sedis*]

sub: *Micropeziza graminis* (Dasm.) Rehm.; auf diiner *Calamagrostis montana*; im Niederwald bei Windsheim in Franken; im October 1872; Dr Rehm; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Peziza graminis* Desm., sur les chaumes de plusieurs espèces de graminées; aux environs d'Ypres.

Cellulariella warnieri (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva [*Polyporaceae*]

sub: *Lenzites faventina* Cald.; sui pioppi; ai sabbioni presso Faenza.

Cenangium ferruginosum Fr. [*Cenangiaceae*]

sur des branches de sapin; dans les bois des environs de Namur; Mr le Prof. Bellynck; sur des

rameaux morts du *Pinus halepensis* Miller; à Tons de Gemenas; [...], 1874; sub: *C. frangulae* Tulasne; sur les branches du *Rhamnus frangula*; aux environs d' Audenarde (Mr Tosquinet) et Louette-Saint-Pierre (Mr Gust. Aubert).

Cenangium fuliginosum Sacc. [*Cenangiaceae*]
sub: *C. fuliginosum* Tul. f. *pycnidifera*; 1870; [...].

Centridium ariae Desm. [*Gymnosporangiaceae*]
sur les feuilles du *Sorbus ariae*; Rochefort, Resteigne, Han, etc.; Mr Crépin.

Cercospora beticola Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]
sub: *Fusarium betae* Rabenh., Bohemia: Tetschen; 10. 1873; Ex herb. de Thümen.

Cercospora capparidis Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]
sur les feuilles vivantes du *Capparis ovata* Desf.; grand ravin su Djebel-Santo, Oran (Algérie); 12 Juillet 1884; O. Debeaux; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccata.

Cercospora mercurialis Pass. [*Mycosphaerellaceae*]
sur les feuilles du *Mercurialis annua*; France-Fontainebleau (Seine-et-Marne); Novembre 1886; Herbarium Feuilleaubo.

Cerioporus squamosus (Huds.) Quéf. [*Polyporaceae*]
sub: *Polyporus squamosus* Fr., sugli olmi; presso Oldenico, nel Verellese; 1857-1860; Malinverni; sub: *P. squamosus* Fr.; nel tronco dei noci; presso Montaldéo, in Monferrato; Doria.

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill [*Cerrenaceae*]
sub: *D. unicolor* Fr.; sul tronco d'alberi annosi; presso Serravalle alla Scrivia; Ottobre 1859; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *D. unicolor* Fr.; sur les troncs d'arbres morts; aux environs d'Ath; M' Tosquinet; sub: *D. variegata* Fr.; sur les troncs d'arbres morts.

Ceuthospora buxi (Fr.) Petr. [*Phacidiaceae*]
sub: *Blennoria buxi* Fr., sur les feuilles mortes du buis; dans un jardin à Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Ceuthospora liriodendri Westend. [*Phacidiaceae*]
sub: *Phoma liriodendri* Westend., a la face extérieure des carpelles du *Liriodendron tulipifera*; dans un jardin à Namur; Mr Bellynck.

Chaetomium elatum Kunze & J. C. Schmidt [*Chaetomiaceae*]
sub: *C. elatum* Kunze; sullo strame infracidato; presso Parma; Aprile 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. elatum* Kunze; sur la paille et les tiges pourrissantes des plantes herbacées qui servent a couvrir le chaumeres; aux environs de Courtrai.

Chaetosphaeria vermicularioides (Sacc. & Roum.) W. Gams & Hol.-Jech. [*Chaetosphaeriaceae*]
sub: *Haplaria viridis* Link; ad folia vinaria in cellis [...] *recondita*; Dresdae; leg. Hantzsch; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Chaetostroma rusci Westend. [*Incertae Sedis*]
sur les feuilles du *Ruscus aculeatus*; dans les jardins, le R. P. Clém. Dumont.

Cheilymenia fimicola (Bagl.) Dennis [*Pyronemataceae*]

sub: *Arrhenia fimicola* De Not. & Bagl., sullo sterco pecorino; presso il laghetto dell'alpe La Bosa, sopra Riva; alto sciogliere delle nevi, in primavera; Erbario Crittogamico Italiano.

Cheirospora botryospora (Mont.) Berk. & Broome [*Mollisiaceae*]

sub: *Myriocephalum botryosporum* Fresen.; sui rami secchi dell'ellera; nei dintorni di Stresa, al Lago Maggiore; Autunno 1860; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Chlorencoelia versiformis (Pers.) J.R. Dixon [*Cenangiaceae*]

sub: *Peziza versiformis* Pers., cette jolie Pezize, nouvelle pour la flore Belge, a été trouvée sur des perches de sapin, servant de cleiture à une prairie; hors la porte d'Ypres a Bruges.

Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seaver [*Chlorociboriaceae*]

sub: *Peziza aeruginosa* Vahl, ad ligna putrida *Betulae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Chlorosplenium cenangium (De Not.) Korf [*Chlorospleniaceae*]

sub: *Peziza cenangium* De Not., su steli disseccati di *Rhododendron ferrugineum*; presso Riva ed Allagna in Valsesia; 1857; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Choiromyces meandriiformis Vittad. [*Tuberaceae*]

nella Sardegna meridionale presso Iglesias; 1864; Gennari, Erbario Crittogamico Italiano; Kálnàs Saros; Jul.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar [*Cyphellaceae*]

sub: *Thelephora purpurea* Fr.; sur les troncs morts et couchés à terre; Hiver, sub: *Stereum purpureum* Pers.; su pali di pioppo; a Tenero, presso Locarno; Ottobre 1859; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Chroolepus sp. [*Cystocoleaceae*]

rocce umide; sopra [...], Napoli; 13.5.1900.

Cladotrichum foliicola (Niessl ex Sacc.) G. Ferraris [*Chaetosphaerellaceae*]

sub: *Myxotrichum foliicolum* Niessl; auf Bombax malabaricum; Calcutta; S. Kurz; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Cryphonectria radicalis (Schwein. ex Fr.) M.E. Barr [*Cryphonectriaceae*]

sub: *Endothia radicalis* (Schwein) Ces. & De Not, sub: *E. radicalis* Fr.; ai cespi dei castagni; presso Locarno al Lago Maggiore; 1862; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Chrysomyxa abietis (Wallr.) Unger [*Coleosporiaceae*]

[...]; Neustadt; 1873; leg. Hartig; Ex herb. de Thümen.

Chrysomyxa pyrolata G. Winter [*Coleosporiaceae*]

ad *Pirolae rotundifoliae* L. folia viva; "Utli" prope Zilrich (Helvetiae); Mai 1881; leg. G. Winter; Johannes Kunze, *Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici* no. 184.

Chrysosporium olivaceum (Link) J.J. Taylor [*Onygenaceae*]

sub: *Sporotrichum olivaceum* Pers.; in fagetis ad folia dejecta, lapides et muscos; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrček [*Incertae Sedis*]

sub: *Helotium acuum* (Alb. et Schw.) Fr.; ad *Pini excelsioris* folia putrida; raro; Vere; prope Oestrich; legit Fuckel; Rabenhorst, Fungi europaei.

Cladobotryum macrosporum (Link) Nees [*Hypocreaceae*]

sub: *Botrytis macrospora* Unger, sur les feuilles du *Chaerophyllum sylvestre*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Cladorrhinum coprophilum (Fr.) Y. Marin, A.N. Mill. & Stchigel [*Podosporaceae*] sub: *Cercophora*

coprophila (Fr.) N. Lundq., sub: *Sordaria coprophila* Ces. & De Not.; su fimo vaccino; nella Selva Pisana; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Cladosporium aecidiicola Thiim. [*Cladosporiaceae*]

Franconia; Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Cladosporium ampelinum Pass. [*Cladosporiaceae*]

su foglie di viti selvatiche; né boschi di Collecchio, presso Parma; Autunno 1868–1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; ad folia *Vitis vinifera*; Parmae; Autumno; G. Passerini.

Cladosporium epiphyllum (Pers.) Nees. [*Cladosporiaceae*]

sub: *C. epiphyllum* Link.; sur les feuilles tombées a terre du peuplier; pendant l' automne.

Cladosporium fumago Link [*Cladosporiaceae*]

[...]; October; Paul; sur les feuilles vivantes du groseillier (*Ribes rubrum*) et du *Viburnum opulus*; sub: *C. fumago* Link f. *Coryli*; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Oxyacanthae*; Krems: Austria inf.; 10. 1873; leg. A. Boller; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Populi albae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Foeniculi*; Franconia: Bayreuth; 4. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Spiraea apicilifoliae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Rosae albae*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Poa pratensis*; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Sambuci*; Bohemia: Teplitz; 10. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Philadelphi*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. fumago* Link f. *Quercus*; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; *C. fumago* Link f. *Ulmi*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Cladosporium fuscum Link [*Cladosporiaceae*]

sur les feuilles de l'*Artemisia vulgaris*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link [*Cladosporiaceae*]

sub: *C. herbarum* Link f. *leguminum pisi*; Bohemia: Ossegg; 9. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *C. herbarum* Link f. *phaseoli*; Bohemia: Tetscher; 10. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *C. herbarum* Link f. *Stenadactis bellidiferae*; Franconia: Bayreuth; 3. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. herbarum* Link; in caulibus *Alcea*; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *C. herbarum* Link; sur les feuilles d'un glayeul; France: Fontainebleau (Seine-et-Marne); Décembre 1884; Herbarium Feuilleaubois.

Cladosporium iridis (Fautrey & Roum.) G.A. de Vries [*Cladosporiaceae*]

sub: *H. gracile* Wallr. f. *iridis*; ad folia arescentia *Iridis cultae*; Parmae; Nov. 1875; G. Passerini; Ex herb. de Thümen.

Cladosporium typharum Desm. [*Cladosporiaceae*]

sur les feuilles mortes du *Typha minor*; aux environs de Gand; sur les feuilles mortes du *Typha latifolia*; Chartres (Eure-et-Loir); September 1885; legit Gabriel; Herbarium Feuilleaubeis.

Clathrus ruber P. Micheli [*Phallaceae*]

sub: *C. ruber* P. Micheli; luoghi coltivati; né dintorni di Oldenico, presso Vercelli; Estate 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Clavaria alutacea Lasch [*Clavariaceae*]

boschi di pini; a Collecchio, presso Parma; Ottobre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Clavaria argillacea Pers. [*Clavariaceae*]

sub: *C. flavipes* Pers.; sui rizomi della *Todea rivularis*; nell'Orto Botanico dell'Università di Genova; 1869-1870; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Clavaria inaequalis O.F. Müll. [*Clavariaceae*]

sub: *C. inaequalis* Müll. a *helveola* Fr.; sur la terre dans les bois; environs de Courtrai; Septembre; sub: *C. inaequalis* Müll. p *aurantiaca* Fr.; sur la terre dans les bois; environs de Courtrai; Septembre.

Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk [*Clavariadelphaceae*]

sub: *Clavaria pistillaris* (L.) Fr., né querceti; in Chianti a Rodda, in Toscana; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; in [...]; ad Ticinum; Aug. 1846.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. [*Clavicipitaceae*]

Sclerozio, sopra spighe di *Anthoxanthum*; Costa di S. Salvatore; boschi; Luglio 1866; F. Delpino; Herb. Delpino; sub: *Sclerotium clavus* b. *lolii-perennis* Desm.; sur les épis du *Lolium perenne*; aux environs de Courtrai; sub: *S. clavus* var. *enodii* West. et Vh.; cette variété remplace les graines de *Enodium coeruleum* dans les bruyères des Flandres e de la Campine; in un bosco di castagni; Costa di S. Mario di Monticelli, propre Chiavari; Ottobre 1888; F. Delpino; Herb. Delpino; sopra semi di *Brachypodium pinnatum*; Costa di S. Salvatore; VII. 1885; F. Delpino; Herb. Delpino; sopra una festuca; Chiavari; VIII. 1888; F. Delpino; Herb. Delpino; collina sopra Chiavari; Ottobre 1887; F. Delpino; Herb. Delpino; sub: *Spermoedia clavus* (DC.) Fr., in glumis *Secalis plurimumque* graminum; Autumn; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. [*Hydnaceae*]

sub: *Clavaria rugosa* Bull., sur la terre, dans le bois de sapins; aux environs de Louvain; Mr l'Abbé Leburton.

Clavulina coralloides (L.) J. Schröt. [*Hydnaceae*]

sub: *Clavaria coralloides* Bull.; sur la terre dans l'allée du ch'âteau de Mr Vergauwen-Goethals; à Heestert, près de Courtrai; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *Clavaria cristata*; nei boschi di pino, fra le foglie; a Collecchio, provincia di Parma; Ottobre 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Clavulinopsis corniculata (Schaeff.) Corner [*Clavariaceae*]

sub: *Clavaria pratensis* Pers.; sur la terre, parmi le gazon; dans le bois des environs de Namur; Mr Bellynck.

Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. [*Incertae Sedis*]

sub: *Agaricus fragrans* Sow.; pinete ed abetaie; Collecchio, provincia di Parma; Ottobre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. [*Incertae Sedis*]

sub: *Agaricus phyllophylus* Fr.; Moravia: Schonberg; 8. 1873; leg. Paul; Ex herb. de Thümen.

Clitopilopsis hirneola (Fr.) Kühner [*Entolomataceae*]

sub: *Agaricus hirneolus* Fr.; sui pendii erbosi aperti; fra le gramigne degli argini e loro contrafforti; lungo la Sesia, presso Vercelli; Novembre 1866; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. [*Entolomataceae*]

sub: *Agaricus orcella* Bull., nei castagneti; Valle della Polcevera presso Genova; Sept 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Coccomyces dentatus (J.C. Schmidt & Kunze) Sacc. [*Rhytismataceae*]

sub: *Lophodermium dentatum* De Not., sulle foglie morte dé roveri; nei dintorni di Faenza; Agosto 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Phacidium dentatum* J. C. Schmidt & Kunze, sur les feuilles mortes et tombées à terre du chêne (*Quercus robur*); ad folia dejecta *Quercus* et *Fagi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Coccomyces leptideus (Fr.) B. Erikss. [*Rhytismataceae*]

sub: *Lophodermium quadratum* Ces. & De Not.; sugli steli secchi del *Vaccinium myrtillus*; nel Monti della Valdobbia in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Coccomyces tumidus (Fr.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *C. tumida* De Not.; foglie morte del castagno; presso Locarno (Lago Maggiore); Autunno 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du hêtre; dans les bois de Dave, près de Namur; M' l'Abbé Bellynck; sub: *Hysterium tumidum* Fr. var b *trigonum* Fr.; sur les feuilles du chêne; dans les bois de Dave, près de Namur; M' l'Abbé Bellynck.

Coleophoma cylindrospora (Desm.) Höhn. [*Dermateaceae*]

sub: *Sphaeropsis cylindrospora* Desm.; sur les feuilles mortes du lierre; environs de Courtrai; Hiver.

Coleosporium jonesii (Peck) Arthur [*Coleosporiaceae*]

sub: *Uredo jonesii* Peck, Grant's; 1 Oct. 1884; collected by Marcus E. Jones A. M.; Marcus E. Jones, Flora of New Mexico.

Coleosporium petasitidis Lév. [*Coleosporiaceae*]

Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen, in [...]; Parmae; Aestate; G. Passerini.

Coleosporium rhinanthacearum Lév. [*Coleosporiaceae*]

sub: *C. rhinanthacearum* Fr. f. *Rhinanthi majoris*; Austria inf.: Krems; 7. 1871; Ex herb. de Thümen; sub: *C. rhinanthacearum* Fr.; sui *Melampyrum*; nelle selve di Bolzano, Tirolo meridionale; 1869; Erbario Crittogamico Italiano, sur les feuilles de l'*Odontites rubra*; bord de l'Huvarne, à la [...]; 28 août 1874; sur les feuilles de l'*Odontites rubra*; sur les bords de [...]; à la [...]; près de Marseille; 11 Juillet 1874.

Coleosporium senecionis (Pers.) Fr. [*Coleosporiaceae*]

sub: *C. senecionis* Fr. f. *Senecio vulgaris*; Italia: Parma; 8. 1874; leg. Passerini; Ex herb. de Thümen;

sub: *C. senecionis* Bellynck.; sur les feuilles du *Senecio sarracenicus*; aux environs de Namur; M' l'Abbé Bellynck.

Coleosporium tussilaginis (Pers.) Lév. [*Coleosporiaceae*]

sub: *C. campanulacearum* Lév.; sulle foglie radicali della *Campanula trachelium*; presso Bolzano nel Tirolo meridionale; Novembre 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. campanulacearum* Fr. f. *Campanulae rapunculoides*; Austria inf.: Krems; 7. 1871; Ex herb. de Thümen; sub: *C. campanulacearum* Fr.; in [...]; Parmae; Aestate; G. Passerini; sub: *C. campanulacearum* Fr.; Botzen: Tirol; C. Kerk; sub: *C. pulsatillae* Strauss; ad *Anemone pulsatillae* L. folia viva; prope Diessenhofen, Thurgan (Helvetiae); frequens; September 1880; leg. H. Wegelin; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 151; sub: *C. pulsatillae* Duby; sur les feuilles de l'*Anemone pulsatilla*; France: Forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne); Octobre 1888; Herbier Feuilleaubeis; sub: *C. tussilaginis* Lév.; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; sub: *C. sonchi* Tul. f. *Sonchi asperis*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. sonchi* Tul.; de Thümen, Fungh. Suph. 4: 348; sub: *C. tussilaginis* Lév.; in *Tussilago fanfara*; Parmae; Aestate; G. Passerini; sub: *C. tussilaginis* Lév.; sulla pagina inferiore della *Tussilago fanfara*; dalla Valle del Serchio; Estate 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. tussilaginis* Lév.; sulla pagina inferiore della *Tussilago fanfara*; dai dintorni di Bolzano; Estate 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. tussilaginis* Lév.; sulla pagina inferiore della *Tussilago fanfara*; da Serravalle alla Scrivia; Estate 1860; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano.

Coleroa alchemillae (Grev.) G. Winter [*Venturiaceae*]

sub: *Asteroma alchemillae* Grev., Reichenberg, in Bohemia; leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Dothidea alchemillae* Fr., in locis humidis ad folia viva *Alchemillae vulgaris*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Coleroa robertiani (Fr.) E. Müll. [*Venturiaceae*]

sub: *Dothidea robertiani* Fr., ad folia viva *Geranii robertiani*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Colletotrichum dematium (Pers.) Grove [*Glomerellaceae*]

sub: *Vermicularia dematium* Fr.; sugli steli secchi del *Peucedanum venetum*; a Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1863; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Vermicularia dematium* Fr.; su steli secchi di *Asclepias tuberosa*; a Locarno, nel proprio giardino; Novembre 1862; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Vermicularia dematium* Fr.; Ungheria; leg. Dietz; ex Herb. Richter, Flora Hungarica; sub: *Exosporium dematium* Link, sur les tiges mortes de la pomme-terre; ainsi que sur les tiges sèches des plantes vivaces; sub: *Vermicularia dianthi* Westend., sur les tiges et les feuilles mortes du *Dianthus barbatus*; au jardin de la station du chemin de fer à Courtrai.

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc. [*Glomerellaceae*]

sub: *Gloeosporium aurantiorum* Westend., sur les feuilles mourantes de l'Oranger; dans l'orangerie de Mr le Comte Alf. De Limminghe, à Namur.

Colletotrichum graminicola (Ces.) G. W. Wilson [*Glomerellaceae*]

sub: *Vermicularia graminum* Lib.; ad folia graminum arida; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *Vermicularia graminicola* Westend.; su foglie secche di una graminacea; al Monterosso, in Valle Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Vermicularia graminum* Lib.; sur la paille d'un toit de chaume; aux environs de Courtrai; sub: *Vermicularia graminicola* Westend.; sur les feuilles du *Poa sudetica*; entre Tellin et les baraques de Transine, Luxembourg; Mr Crépin.

Colletotrichum nymphaeae (Pass.) Aa [*Glomerellaceae*]

sub: *Ascochyta nymphaeae* Pass.; ad folia *Nymphaeae albae*; Parmae, in Horto botanico; per aestatem 1875; Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Colletotrichum trichellum (Fr.) Duke [*Glomerellaceae*]

sub: *Cheilaria helicis* Desm.; sur les feuilles du lierre, mais surtout sur celui qui rampe à terre; aux environs de Courtrai; sub: *Exosporium trichellum* Link, sur les feuilles mortes du lierre (*Hedera helix*).

Collybiopsis ramealis (Bull.) Millsp. [*Omphalotaceae*]

sub: *Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer, sub: *Agaricus ramealis* Bull.; sur des rameaux morts tombés à terre; dans les bois des environs de Courtrai; Novembre.

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. [*Rhytismataceae*]

sub: *Cenangium quercinum* (Pers.) Fr., sur les rameaux morts du chêne; sub: *C. quercinum* Wallr.; su ramoscelli secchi di quercia; in Valle Intrasca al lago Maggiore; 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. quercinum* Wallr.; [...]; Leipzig; Aprile 1872; leg. G. Winter, [...]; Ex herb. de Thümen.

Coltricia perennis (L.) Murrill [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Coltricia perennis* Fr., dai dintorni di Locarno, Lago Maggiore; 1862; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; né boschi; S. Rossore, presso Pisa; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sulle aree ove furono carbonaie; nell'Appennino Pistoiese; 1862; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polyporus perennis* L., sur la terre sablonneuse dans le bois de sapins.

Coniochaeta ligniaria (Grev.) Cooke [*Coniochaetaceae*]

sub: *Sordaria ligniaria* Ces. et De Not., su un tronco di pioppo scortecciato; alla Cabiana presso Cambiasca, in Val Intrasca, Lago maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Coniosporium arnicae Lib. [*Coniosporiaceae*]

ad folia *Arnicae montanae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Coniosporium violae Lib. [*Coniosporiaceae*]

in foliis emortuis *Violae odoratae*; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); feuilles mortes de la violette odorante; à Courtrai.

Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod [*Bolbitiaceae*]

sub: *Agaricus tener* Fr.; nei vasi di *Viola tricolor*; in regina, Genova; Primavera 1872; Remondini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange [*Psathyrellaceae*]

sub: *Agaricus disseminatus* Pers.; sui terricci; nell'Orto botanico della R. Università di Genova; Autunno 1858; Baglietto.

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppole & Jacq. Johnson [*Psathyrellaceae*]

sub: *C. micaceus* Fr.; Bohemia: Teplitz; 5. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *C. micaceus* Pers.; [...]; Heufler; sub: *C. micaceus* Fr.; sui terricci; nell'Orto Botanico dell'Università di Genova; Ottobre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [*Psathyrellaceae*]

sub: *C. atramentarius* (L.) Fr.; auf von Menschenkoth gediingten Baden in Gebtischen, geselling und in Rasen; Salzburg; Dr Sauter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Coprinopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo [*Psathyrellaceae*]

sub: *C. fimetarius* Fr.; Oldenico, presso Vercelli; 1867; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. [*Agaricaceae*]

Octobri 1889; Auctore G. E. Mattei.

Coprotus sexdecimsporus (P. Crouan & H. Crouan) Kimbr. & Korf [*Incertae Sedis*]

sub: *Ascobolus sexdecimsporus* H. Crouan & P. Crouan, in fimo equino; prope Bristol; October; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Coriopsis gallica (Fr.) Ryvarden [*Polyporaceae*]

sub: *Funalia gallica* (Fr.) Bondartserv & Singer, sub: *Trametes hispida* Bagl.; ad un palo; nella campagna di Cambiasca in Val Intrasca, al Lago Maggiore; 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Coronophora gregaria Fuckel [*Coronophoraceae*]

sub: *Sphaeria gregaria* Lib., sub epidermide ramorum exsiccatorem *Pruni cerasi* et *Sorbi aucupariae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Corticium roseum Pers. [*Corticaceae*]

sub: *C. roseum* Fr.; sui pali nei vigneti; nelle adiacenze di Serravalle alla Scrivia; Autunno 1860; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano.

Cortinarius argentatus (Pers.) Fr. [*Cortinariaceae*]

sub: *C. argentatus* Fr.; castagneti; lungo la Zecca in Polcevera, presso Genova; Ottobre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Cortinarius collinitus (Sowerby) Gray [*Cortinariaceae*]

sub: *Cortinarius collinitus* Fr., nei castagneti; sopra Voltri, nella Liguria occidentale; Ottobre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Coryneum lanciforme (Fr.) Voglmayr & Jaklitsch [*Coryneaceae*]

sub: *Pseudovalsa lanciformis* Ces. & De Not.; Bohemia: Teplitz; 5.1872; Ex herb. de Thümen.

Corynelia tropica (Auersw. & Rabenh.) Starbäck [*Coryneliaceae*]

sub: *Endohormidium tropicum* Awd. et Rabenh.; in *Podocarpus chilensis*; prope coloniam "Arique" Valdiviae; leg. W. Lechler; Rabenhorst, Fungi europaei.

Cosmospora flammea (Berk. & Ravenel) Rossman & Samuels [*Nectriaceae*]

sub: *Sphaerostilbe coccophila* Tul. & C. Tul., sull'alloro; nel giardino di Boboli a Firenze; 1866; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Coutourea castagnei Desm. [*Incertae Sedis*]

sulle foglie languenti dell'olivo; alla Cattaiia presso Firenze; Maggio 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. [*Hydnaceae*]

sub: *Cantharellus cornucopiae* Wallr., sur la terre; dans les bois du Brabant et des Flandres; sub: *C. cornucopioides* Fr.; sulla terra, né castagneti; a Serravalle sulla Scrivia; Novembre 1858; Ferrari; sub: *C. cornucopioides* Fr.; boschi della Polcevera, presso Genova; 1871; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Craterellus lutescens (Fr.) Fr. [*Hydnaceae*]

sub: *Cantharellus lutescens* Fr., nelle pinete della Polcevera, presso Genova; Ottobre 1868; Baglietto.

Craterellus tubaeformis (Fr.) Qué. [*Hydnaceae*]

sub: *Cantharellus tubiformis* (Bull.) Fr., sub: *C. infundibuliformis* Scop.; [...]; Jul.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *C. infundibuliformis* Scop.; sur la terre; aux environs de Louvain (Mr E. Martens) et de Mons (M' le R. P. Clém. Dumont).

Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo & Papetti [*Hydnaceae*]

sub: *Cantharellus sinuosus* Fr.; in località ombreggiate, al Sasso presso Locarno, Lago Maggiore; Autunno 1862; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Cantharellus sinuosus* Fr.; Costa di S. Salvatore, presso Chiavari; Ottobre 1866; F. Delpino; Herb. Delpino.

Creosphaeria sassafras (Schwein.) Y.M. Ju, F. San Martín & J.D. Rogers [*Lopadostomataceae*]

sub: *Hypoxylon bifrons* De Not., sulla corteccia dell'Alloro, a Locarno; 1864; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. [*Crepidotaceae*]

sub: *Agaricus cesati* Rabenh.; sui ceppi morti nelle siepi di Robinia; a Vigheffio, presso Parma; Autunno 1863; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude [*Crepidotaceae*]

sub: *Agaricus mollis* Schaeff.; su topi di faggio tratti dall'Appennino con la fluttuazione; Torchiana presso Parma; Novembre, Dicembre 1862; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm. [*Crepidotaceae*]

sub: *Agaricus variabilis* Pers.; ad terram inter folia et ad truncos putridos; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Crinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill [*Marasmiaceae*]

sub: *Agaricus stipitarius* Fr.; nei prati delle Cascine; Pisa; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Cronartium pini (Willd.) Jørst. [*Cronartiaceae*]

sub: *C. asclepiadeum* Fr.; in *Cynanchum vincetoxicum*; Parmae; Aestate; G. Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. asclepiadeum* Fr.; sulle foglie del *Cynanchum vincetoxicum*; dintorni di Bolzano; Estate 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. asclepiadeum* Fr.; sulle foglie del *Cynanchum vincetoxicum*; dintorni di Lucca; Estate 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. asclepiadeum* Fr. b. *paeoniae*; sur les feuilles languissantes de la pivone; ou jardin de Mme Veuve Goethals Vercruysse, à Courtrai; Automne; sur les feuilles du *Paeonia albiflora* Pall.; au jardin botanique de Lyon; Automne 1882; Dr A. Magnin; Ch. Magnier, *Flora Selecta exsiccate*; sur les feuilles du *Paeonia officinalis*; France: Dreuz (Eire-et-Loir); aot 1884; legit Gallet; Herbier

Feuilleaubois; sub: *Peridermium pini* Wallr. f. *acicola* Rabh.; bei Ktinigstein (Sachsen); Rabenhorst; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les feuilles du *Pinus sylvestris*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai [*Cronartiaceae*]

sub: *Uredo quercus* Brond., sur les feuilles du chêne; dans les bois de Saint-Denis-lez-Gand; ètè; sulle foglie delle querce; nella selva di S. Margherita presso Firenze; Agosto 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly [*Incertae Sedis*]

sub: *C. vulgare* Tul.; sulla capanna di Persolino, presso Faenza; 1863; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *C. vulgare* Tul.; su steli morti di *Pteris aquilina*, su culmi di *Phragmites communis*, ecc., ammucchiati in un bosco; a Collecchio, presso Parma; Novembre 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Cyathus crucibulum* Hoffm.; sulla capanna di Persolino, presso Faenza; Nov. 1863; Caldesi; sur un toit de chaume, à la Ferme modèle d'Eghem, d'ou le Directeur M. Ph. Landzweert, protecteur des sciences naturelles et agronome distingué, a bien voulu nous l'envoyer.

Cryptococcus cerevisiae Kütz. [*Cryptococcaceae*]

Hohenacker, Arzn. U. Handelspf. 562.

Cryptococcus vini Kütz. [*Cryptococcaceae*]

in ghrendem Weinmost; Hohenacker, Arzn. U. Handelspf. 563.

Cryptodiaporthe lirella (Moug. & Nestl.) M. Monod [*Gnomoniaceae*]

sub: *Sphaeria lirella* Moug. & Nestl., in caulibus exsiccatos *Spireae ulmariae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Cryptomycina filicina (Fr.) L. Holm & K. Holm [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptostroma filicinum* Fr. f. *osmundae*; sur les tiges sèches de l'*Osmunda regalis*; aux environs des baraques de Transine (Luxembourg); Mr Crépin.

Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel [*Diatrypaceae*]

sub: *Sphaeria corticis* Fr., sur les branches mortes du frane; dans les jardin de St George à Courtrai; printemps.

Cryptospora suffusa (Fr.) L.C. Mejía & Castl. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Cryptospora suffusa* Tul. var. *polyspora* Tul.; Saxonia: Leipzig; 5. 1874; leg. G. Winter; Ex herb. de Thümen.

Cryptosporiopsis coryli (Peck) B. Sutton [*Dermateaceae*]

sub: *Catimula turgida* Desm.; sur les branches d'un Coudrier; aux environs d'Audenarde; M' Tosquinet.

Cryptosporiopsis grisea (Pers.) Petr. [*Dermateaceae*]

sub: *Naemaspora grisea* Pers., ad truncos emortuos; prope Wallendorf, Hungaria; leg. Kalchbrenner; Rabenhorst, Fungi europaei; ad cortices Corylorum; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Cucurbitodithis pityophila (J. C. Schmidt & Kunze) Petr. [*Cucurbitariaceae*]

sub: *Cucurbitaria pityophila* De Not.; al tronco di giovani abeti; nell'abetia della Badia a Coltibuono sui monti del Valdarno in Toscana; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Cucurbitaria pityophila* De Not.; sulla corteccia dell'*Abies excelsa*; presso Seis, provincia di Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1865; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Cucurbitaria berberidis (Pers.) Grev. [*Cucurbitariaceae*]

sub: *C. berberidis* Grev.; sui rami secchi del *Berberis vulgaris*; presso Locarno; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria berberidis* Pers., sur les branches et rameaux de l'épinevinette (*Berberis vulgaris*); à Namur; Mr Bellynck.

Cucurbitaria dianthi Ces. & De Not. [*Cucurbitariaceae*]

su steli secchi del *Dianthus prolifer*; presso Vercelli; sul finire dell'inverno; 1859-60; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Cucurbitaria leptospora De Not. [*Cucurbitariaceae*]

sugli steli secchi del *Dianthus atrorubens*; in Valle Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Cucurbitaria spartii (Nees ex Fr.) Ces. & De Not. [*Cucurbitariaceae*]

sub: *Sphaeria spartii* Nees, sur les branches mortes du *Spartium scoparium*; aux environs de Louvain; Mr l'Abbé Leburton.

Cuphophyllus pratensis (Pers.) Bon [*Hygrophoraceae*]

sub: *Hygrophorus pratensis* (Pers.) Fr., né pascoli; Incisa nella Valle della Polcevera sopra Genova; Ottobre 1862; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. pratensis* Fr. var. *meisneriensis*; Batheaston; Jun 1867; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko [*Hygrophoraceae*]

sub: *Hygrophorus niveus* Fr.; prati; Unchio in Val Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hygrophorus virgineus* Fr.; sui margini dei castagneti; a Collecchio, provincia di Parma; Novembre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hygrophorus virgineus* Fr.; Bohemia: Zinnwald; 8. 1873; Ex herb. de Thümen.

Cyathicula cyathoidea (Bull.) Thüm. [*Helotiaceae*]

sub: *Peziza caulicola* Fr., su steli di piante erbacee ammucchiati e putrescenti; nell'Orto botanico di Cagliari; primavera 1867; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser.; sub: *Peziza cyathoidea* Bull., in Unica; [...]; Jul.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sur les tiges pourrissantes de l'asperge; au jardin de l'hôpital militaire de Bruges; su frammenti di steli di piante erbacee in luoghi molto umidi; al Sasso sopra Locarno; 1860; Daldini.

Cyathus olla (Batsch) Pers. [*Incertae sedis*]

sub: *C. olla* Pers.; Austria inf.: [...]; 1872; leg. F. Wallner; Ex herb. de Thümen; sub: *C. vernicosus* DC.; sul limo; nell'alveo della Sesia, a Vercelli; 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. vernicosus* DC.; né campi; piano di Mogadino, al Lago Maggiore; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. vernicosus* DC.; né campi; presso Serravalle alla Scrivia; 1861; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *C. vernicosus* DC.; sur la terre dans le jardin du pare de St George, à Courtrai, ainsi que sur le bois tendre à demi-pourri.

Cyathus striatus Willd. [*Incertae sedis*]

sub: *C. striatus* Hoffm.; sulla terra, né luoghi selvatici; a Cornigliaro, presso Genova; Autunno 1858; Dufour; sub: *C. striatus* Hoffm.; ad terram in humentibus, prope [...]; in appennino Pistoiese; 21 Aug 1874; legit Arcangeli; J. Arcangeli, *Plantae Italicae exsiccatae*.

Cyclaneusma niveum (Pers.) DiCosmo, Peredo & Minter [*Marthamycetaceae*]

sub: *Schmitzonia nivea* De Not., ad folia pinea dejecta; a [...] di Lugo; G. Caldesi.; Rabenhorst, *Fungi europaei*; sub: *Stictis nivea* Pers., sur les feuilles du *Pinus maritima*; dans les bois de la Campine et Hainaut; R. P. Clém. Dumont.

Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini [*Tubariaceae*] sub: *Agaricus piopparello* Viv.; su ceppaie e su tronchi di pioppo; nell'Agro Pisano; Erbario Crittogamico Italiano.

Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich [*Physalacriaceae*]

sub: *Thelephora laevis* Pers.; ad ramos *Populi tremulae* exsiccatos; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Cylindrosporella juglandis (Rabenh.) Petr. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Leptothyrium juglandis* Lib.; sur les feuilles languissantes du noyer; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832); sub: *L. juglandis* Lib.; in foliis *Juglandis regiae*; Autumno.

Cylindrosporium pseudoplatani (Roberge ex Desm.) Died. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Septoria pseudoplatani* Rob.; sur les feuilles de plusieurs espèces d'*Acer*; dans les plantations du camp de Beverloo.

Cystopus sp. [*Albuginaceae*]

sulle foglie di *Portulaca oleracea*; Chiavari; Agosto 1890; F. Delpino; Herb. Delpino.

Cytospora aesculi Westend. [*Valsaceae*]

sur le tronc mort d'un marronnier d'Irìde; au jardin de Mr Willems, à Courtrai.

Cytospora atronitens Chevall. [*Valsaceae*]

sur les jeunes rameaux morts du saule; aux environs de Menin.

Cytospora aucupariae Lib. [*Valsaceae*]

in ramis exsiccatis *Sorbi aucupariae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Cytospora aurora Mont. & Fr. [*Valsaceae*]

su rami di salice recisi: nei dintorni di Locarno al Lago Maggiore; Giugno 1860; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Cytospora betulina Ehrenb. [*Valsaceae*]

su ramoscelli secchi di Benda alba; in Valle Intrasca al Lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Cytospora carphosperma Fr. [*Valsaceae*]

sur le tronc d'un tilleul mort; au jardin du Collège de Notre-Dame de la Paix, à Namur; par le Rév. Père Bellynck.

Cytospora ceratosperma (Tode) G.C. Adams & Rossman [*Valsaceae*]

sub: *Hypoxylon ceratospermum* (Tode) J. Kichx f., sur les branches mortes de charme; environs de Bruges; sub: *Sphaeria ceratosperma* Tode, ad ramos Quercus; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *Valsaria decorticans* De Not., sul frassino; nei dintorni di Locarno al Lago Maggiore; 1864; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Cytospora chrysosperma (Pers.) Fr. [*Valsaceae*]

sub: *C. chrysosperma* Fr.; in ramis siccis Populi; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Cytospora corni Westend. [*Valsaceae*]

sur les rameaux morts du *Cornus sanguineum*; dans les jardins de Mrs Willems, Pycke et Goethals, à Courtrai.

Cytospora fallax (Nitschke) G.C. Adams & Rossman [*Valsaceae*]

sub: *C. fallax* Fr.: sur les branches mortes des saules.

Cytospora incarnata Fr. [*Valsaceae*]

sur les rameaux morts du *Robinia pseudoacacia*; au part de Saint-George, à Courtrai.

Cytospora leucosperma (Pers.) Fr. [*Valsaceae*]

sub: *C. leucosperma* Lib. f. *Frangulae*; Bohemia; Koningswald; 9. 1871; Ex herb. de Thümen.

Cytospora leucostoma (Pers.) Sacc. [*Valsaceae*]

sub: *Cytospora ferruginea* Desm. in ramis *Pruni padi* et *Sorbi aucupariae* exsiccatis; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834), sur le tronc mort du hêtre (*Fagus sylvatica*); aux environs de Courtrai.

Cytospora pinastri Fr. [*Valsaceae*]

in foliis dejectis *Pini sylvestris*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); a la face supérieure des feuilles du *Taxus baccata*; au jardin de Mme ve Pycke, à Courtrai.

Cytospora pinicola Westend. [*Valsaceae*]

sur le tronc mort d'un cèdre du Liban; au jardin de l'établissement hydrothérapique de M' le Dr Vanderplancke.

Cytospora populina (Pers.) Rabenh. [*Valsaceae*]

sub: *C. foliicola* Lib. f. *Populi pyramidalis*; Franconia; Bayreuth; 4. 1874; Ex herb. de Thümen.; sub: *Hypoxylon ambiens* Westend., sur des troncs du frêne; dans la cour de l'infermerie militaire de Menin.

Cytospora pruinosa (Fr.) Sacc. [*Valsaceae*]

sub: *Sphaeria pruinosa* Fr., sur les branches mortes du frane; à Courtrai.

Cytospora scheidweileri Westend. [*Valsaceae*]

sur le tronc mort d'un *Rhus*; au jardin de Mr Delombaerde, horticulteur, à Courtrai.

Cytospora sphaerosperma Westend. [*Valsaceae*]

sur les racines de terrées d'un vieux chêne mort; aux environs de Mons; le R. P. Clém. Dumont.

Cytospora tumida Lib. [*Valsaceae*]

sur des branches mortes du chêne; dans la propriété de Mr le Vicomte De Rouvroy, près de Mons; le R. P. Dumont; in ramis quercinis; Hieme, Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. H (1832).

Cytosporina rostrata (Westend.) Sacc. [*Incertae Sedis*]

sub: *Dumortiera rostrata* Westend.; sur un tronc mort et presque décomposé de hêtre; dans un bois des environs de Mons; le R. P. Clém. Dumont.

Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Nees [*Dacrymycetaceae*]

sur le piquets de sapin; jardin du Casino à Courtrai.

Dacrymyces poae Lib. [*Dacrymycetaceae*]

ad folia emortua *Poae sudeticae*; Sero Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Dacrymyces stillatus Nees [*Dacrymycetaceae*]

sur du bois de sapin mort à demi pourri.

Dacrymyces tortus (Willd.) Fr. [*Dacrymycetaceae*]

sui ceppi dei faggi; a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese, Piemonte; Autunno 1858; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Daedalea quercina (L.) Pers. [*Fomitopsidaceae*]

sub: *D. quercina* Pers.; su ceppi di alberi diversi; presso Vercelli e Biella, in Piemonte; Autunno 1858; Cesati, Malinverni; sub: *D. quercina* Pers.; sur des veilles souches de chêne; à Lachapelle, près de Saint—Leonard (Haute-Vienne); 20 août 1843; rec. par Lamy; *Flora Galliae et Germaniae exsiccata* de C. B.; sub: *D. quercina* Pers.; Glaggenitz; leg. Heufler; sub: *Xylostoma conium* Rabh.; bei Glaggenitz, Austria inf.; leg. Heufler.

Daedaleopsis nitida (Durieu & Mont.) Zmitr. & Malysheva [*Polyporaceae*]

sub: *Hexagonia marcucciana*; sul tronco delle querce; Sardegna; 1866; Marcucci, Gennari, Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Daedaleopsis tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer [*Polyporaceae*]

sub: *Lenzites tricolor* Fr.; sul tronco del Sorbus aria; presso Riva in Valsesia; Estate 1857.

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & De Not. [*Hypoxylaceae*]

sub: *D. concentrica* Ces. & De Not.; sulle querce annose; nei monti di Carbonara, nella Sardegna meridionale; 1861; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano.

Daldinia vernicosa Ces. & De Not. [*Hypoxylaceae*]

su legno di faggio accatastato; a Cannero (Lago Maggiore); Autunno 1865; Gibelli; Erbario Crittogamico Italiano.

Davidiella disseminata (De Not. & Carestia) Aptroot [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Leptosphaeria disseminata* Carestia et De Not.; ad culmos et folia cujusdam Gramineae; Alagna, prope montem Rosa; 1868; leg. Carestia; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Deconica montana (Pers.) P.D. Orton [*Strophariaceae*]

sub: *Agaricus atrorufus* Schaeff; né tappeti di *Raconitrum canescens*; nel letto della Cabiana in Valle Intrasca, Lago Maggiore; Aprile 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Delastria rosea Tul. & C. Tul. [*Incertae Sedis*]

sub: *D. rosea* Tul.; selva pisana; 1867; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Dendrostoma leiphaemia (Fr.) Senan. & K.D. Hyde [*Incertae Sedis*]

sub: *Valsa leiphaemia* Fr., sui pali di castagno; né dintorni di Voltri, nella Liguria occidentale; 1861; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Depazea castaneicola (DC.) Rabenh. [*Mycosphaerellaceae*]

su foglie secche di castagno; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Erbario Crittogamico Italiano.

Depazea hedericola Klotzsch [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles vivantes et languissantes de l'*Hedera helix*.

Depazea purpurascens Lib. var. *fragariae* Kx. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles vivantes du fraisier (*Fragaria vesca*); à la Campagne de Mr le Bon Guido Van Zuylen Van Neyvelt, à St Croix-lez—Bruges.

Dermatea furfuracea Fuckel [*Dermateaceae*]

su tronchi putrescenti di *Alnus viridis*; nei monti della Valdobbia; Ottobre 1859; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Dermea cerasi (Pers.) Fr. [*Dermateaceae*]

sub: *Cenangium cerasi* Fr., ad ramos exsiccatos *Cerasi*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); sur le tronc des jeunes cerisiers morts; dans le jardin de M. le Lieutenant Wahis à Menin; Automne; sub: *Dermatea cerasi* Fr.; sui rami secchi del ciliegio; presso Ranzano, provincia di Parma; 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Descolea alba (Klotzsch) Kuhar, Nouhra & M.E. Sm. [*Bolbitiaceae*]

sub: *H. klotzschii* Tul.; in hort. Giessens; Sept. 1860; leg. Hofmann; Rabenhorst, Fungi europaei; sub *H. klotzschii* Tul.; Silesia: Breslan; 2. 1873; leg. L. Becker; Ex herb. de Thümen.

Desmazierella acicola Lib. [*Chorioactidaceae*]

ad folia putrescentia *Pini sylvestris*; Hieme, Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae.

Dialonectria episphaeria (Tode) Cooke [*Nectriaceae*]

sub: *Nectria episphaeria* Fr., sull'alloro; nel giardino di Boboli a Firenze; Maggio 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Diaporthe carpini (Pers.) Fuckel [*Diaporthaceae*] sub: *Sphaeria carpini* Pers.

sur les rameaux morts du charme; dans les bois des environs de L_ouette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Diaporthe pardalota (Mont.) Nitschke ex Fuckel [*Diaporthaceae*]

sub: *Sphaeria ceuthosporioides* Berk., sur les feuilles du *Prunus lauro-cerasus*; à Gheluvelt; sub: *S. ceuthosporioides* Berk. a *berberidis* Westend.; sur les feuilles du *Berberis nepalensis* Spr.; dans les jardins; sub: *S. ceuthosporioides* Berk. var. *berberidis* Westend.; *Ilex maderensis* Lamk.; Mr Clém. Dumont.

Diaporthe subordinaria (Desm.) R.R. Gomes, Glienke & Crous [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma subordinaria* Desm., sur les chaumes sèches du *Plantago lanceolata*; à Salzinne-lez-Namur; Mr l'Abbé Belynyck.

Diaporthopsis urticae (Fr.) Arx & E. Müll. [*Diaporthaceae*]

sub: *Xeilaria urticae* Lib.; ad caules exsiccatos *Urticae dioicae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Diatrype aneirina (Sommerf.) Fr. [*Diatrypaceae*]

sulla corteccia del *Populus alba*; presso Seis, nel Tirolo meridionale; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Diatrype bullata (Hoffm.) Fr. [*Diatrypaceae*]

sub: *D. bullata* Fr.; su pali di salice; presso Serravalle alla Scrivia; 1863; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hypoxylon bullatum* (Hoffm.) Westend. & Wallays, sur les branches morts de saule; environs de Bruxelles, Ypres, Courtrai, etc.

Diatrype disciformis (Hoffm.) Fr. [*Diatrypaceae*]

sub: *D. disciformis* Fr.; sui rami secchi dei faggi; a S. Giovanni d'Andomo nel Biellese; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria disciformis* Hoffm., sur branches et rameaux morts de hêtre; dans les bois entre Tellin et les baraques de Transine, Luxembourg; Mr Crépin; sub: *S. disciformis* b. *grisea* Fr.; sur les vieux troncs de hêtre et de Bouleau; dans les bois des environs de Louette-Saint-Pierre; d'où M' Gustave Aubert nous l'a fair par-venie.

Diatrype hypoxyloides De Not. [*Diatrypaceae*]

sul tronco sternato di un noce; presso Bureglio in Val Intrasca al Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Diatrype stigma (Hoffm.) Fr. [*Diatrypaceae*]

sub: *D. stigma* Fr.; su pali nei vigneti; Serravalle alla Scrivia; Autunno 1860; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hypoxylon operculatum* Bull., sur un tronc mort de hêtre; aux environs de Louvain; d'ou le Rév. Père Leburton; Hiver; sur les branches mortes du bouleau et du hêtre; sub: *Hypoxylon stigma* (Hoffm.) J. Kichkx f. sur les branches mortes du charme, du bouleau etc.; sub: *Libertella betulina* Desm., in cortice *Betulae*, *Sorbi*, etc.; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837); sub: *Naemaspora aurea* Fr., su rami tagliati di *Betula pendula*; a Bignasco, nel Canton Ticino; Settembre 1859; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Diatrypella favacea (Fr.) Ces. & De Not. [*Diatrypaceae*]

sub: *Naemaspora crocea* Pers., in cortice Fagi; Aestate; Libert, *Pl. Cryptog. Arduennae*, fasc. III (1834).

Diatrypella quercina (Pers.) Cooke [*Diatrypaceae*]

sub: *Capnodium quercinum* (Pers.) Berk. & Desm., Franconia: Bayreuth; 11.1874.

Dichocladosporium chlorocephalum (Fresen.) K. Schub., U. Braun & Crous [*Davidiellaceae*]

sub: *Cladosporium paeoniae* Pass., ad foliis *Paeoniae albiflorae*; Parmae; Aestate; G. Passerini.

Dicoccum dryophilum Corda [*Incertae Sedis*]

sulle foglie morte delle querce; a Villagrappa presso Forlì; Settembre 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Didymella pisi Chilvers, J.D. Rogers & Peever [*Didymellaceae*]

sub: *Ascochyta pisi* Lib., in leguminibus *Pisi sativi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Didymosphaeria epidermidis (Fr.) Fuckel [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria epidermidis* Fr., var. *microscopica* Desm.; samares du frêne.

Didymosphaeria rubi Fuckel [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *D. rubi* Fuck. f. *pyenidum*; Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Didymosporium carpini Corda [*Incertae Sedis*]

Iglò; July; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Didymosporium elevatum Lib. [*Incertae Sedis*]

in ramis exsiccatis *Betulae albese* et *Alni gutinosae*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Dilophospora alopecuri (Fr.) Fr. [*Incertae Sedis*]

sub: *D. graminis* Desm.; sur les guaines et les épis de l'*Alopecurus agrestis* et du *Poa pratensis*; à Friset-lez-Namur; M' Bellynck.

Diplocarpon alpestre (Ces.) Rossman [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Bostrichonema alpestre* Ces., sulla parte inferiore delle foglie del *Polygonum bistorta*; nei monti della Valle d'Andorno, nel Biellese; sul declinare dell'estate e sul principio d'autunno; 1858; Cesati.

Diplocarpon fragariae (Lib.) Rossman [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Phyllosticta potentillae* Desm.; ad *Potentilla reptantis* folia; Reichenberg (Bohemia); leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Ascochyta fragariae* Lib.; in foliis *Fragariae vescae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); sub: *Leptothyrium fragariae* Lib.; in foliis *Fragariae vescae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1832).

Diplocarpon mespili (Sorauer) B. Sutton [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Morthiera mespili* (DC.) Fuckel; ad folia *Mespili germanicae*; Vigheffio prope Parmam; Majo-Julio 1876; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Diplocarpon rosae (Lib.) F.A. Wolf [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Asteroma rosae* Lib.; in foliis languescentibus *Rosarum*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *Asteroma rosae* Lib.; sur les feuilles de plusieurs espèces de rosiers; Mr Forster de Bruges.

Diplodia corchori (Desm.) J. Kichx f. [*Botryosphaeriaceae*]

sur la *Kerria japonica*; dans les jardins; printemps.

Diplodia crataegi Westend. [*Botryosphaeriaceae*]

sur les branches et rameaux d'un Aubépine (*Crataegus oxyacantha*) mori; à Courtrai.

Diplodia euonymi Westend. [*Botryosphaeriaceae*]

sur les branches de l'*Euonymus europaeus*; France: Fontainebleau (Seine-et-Marne); Février 1886; Herbier Feuilleaubois; sur les feuilles de l'*Euonymus japonicus*; à Courtrai.

Diplodia hederæ Fuckel [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *D. hederæ* Desm.; sur les feuilles mortes et les sarments du lierre (*Hedera helix*); aux l' environs de Courtrai.

Diplodia ilicicola Desm. [*Botryosphaeriaceae*]

sur les branches mortes du houx; aux environs d'Ypres e de Courtrai, sur les branches mortes du Lilas commun; dans les jardins.

Diplodia ischaemi Pass. [*Botryosphaeriaceae*]

sui rizomi dell'*Andropogon ischaemum*; nell'alveo della Baganza, a Vigheffio presso Parma; Autunno 1874; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Diplodia magnoliae Westend. [*Botryosphaeriaceae*]

sur les feuilles d'un Magnolia; à Mons; le R. P. Clém. Dumont.

Diplodia melaena Lév. [*Botryosphaeriaceae*]

sui ramoscelli secchi di alloro; a Boboli in Firenze; Erbario Crittogamico Italiano.

Diplodia opuntiae Sacc. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *D. acerina* Lév.; sur l'écorce d'un Acer; aux environs de Louvain; par le Rev. Pére Leburton.

Diplodia paliuri Becc. [*Botryosphaeriaceae*]

sui ramoscelli secchi del *Paliurus australis*; alla Montagnola di Bologna; Marzo 1864; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Diplodia pseudodiplodia Fuckel [*Botryosphaeriaceae*]

Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Diplodia rubi Fr. [*Botryosphaeriaceae*]

Rubi idaei; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Diplodia scabrosa Westend. [*Botryosphaeriaceae*]

sur un tronc mort d'*Ailanthus glandulosa*; au jardin de Mr Vanhoutte à Gentbrugge-lez-Gand; Mr Scheidweiler.

Diplodia taxi (Sowerby) De Not. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria taxi* Duby, sur les feuilles languissantes du *Taxus baccata*; au jardin de M.me Veuve Pycke, à Courtrai.

Diplodia yuccae Westend. [*Botryosphaeriaceae*]

sulle foglie di una *Yucca*; in un giardino tra Rapallo e S. Margherita, Liguria occidentale; Maggio 1870; Libelli, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Diplodina acerina (Pass.) B. Sutton [*Gnomoniaceae*]

sub: *Gloeosporium acerinum* Westend.; sur les feuilles de l'*Acer campestre*; au parc de St-George; à Courtrai.

Diplodina calamagrostidis Allesch. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Ascochyta calamagrostidis* Lib.; in foliis *Calamagrostis sylvaticae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Diplodina convolvuli Allesch. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Ascochyta convolvuli* Lib.; in foliis languescentibus *Convolvuli sepium*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Diplodina fraxini Allesch. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Ascochyta fraxini* Oudem., in cortice *Fraxini excelsioris*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Diplodina lysimachiae Sacc. & P. Syd. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Ascochyta lysimachiae* Oudem., in foliis *Lysimachiae vulgaris*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Diplonaevia circinata (Lib.) B. Hein [*Calloriaceae*]

sub: *Stictis circinata* Lib., in culmis exsiccatis *Junci acutiflori*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Diplonaevia exigua (Desm.) B. Hein [*Calloriaceae*]

sub: *Stictis exigua* Desm., sur les chaumes morts du *Juncus articulatus*; dans les marais des dunes; entre Ostende et Ravenszyde.

Diplonaevia seriata (Lib.) B. Hein [*Calloriaceae*]

sub: *Naevia seriata* (Lib.) Fuckel; ad foliorum paginam inferiorem *Caricis hirtae*; Dresdae; L. Rabenhorst; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Stictis seriata* Lib., in foliis siccis *Caricum*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. DI (1834).

Dipodascus geotrichum (E.E. Butler & L.J. Petersen) Arx [*Dipodascaceae*]

sub: *Oidium lactis* Fres., in lacte coeruleo.; Glissen; 29 Junii 1862; leg. Hoffmann; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Oidium obtusum* Thiim., Bayreuth; 8. 1873; Ex herb. de Thümen.

Discina ancilis (Pers.) Sacc. [*Discinaceae*]

sub: *Peziza ancilis* Pers., sulla terra; nell'Orto botanico di Genova; primavera 1862; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano.

Discogloeum veronicae (Lib.) Petr. [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptothyrium veronicae* Lib.; ad caules, folla et capsulas *Veronicae officinalis*; Liberi, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Discosia artocreas (Tode) Fr. [*Discosiaceae*]

sub: *Sphaeria artocreas* Tode, hypophylle sur les feuilles tombées et à demi desséchées du hêtre; dans les Flandres.

Discosia faginea Lib. [*Discosiaceae*]

ad folla delapsa *Fagi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sulle foglie secche d'alloro; nel giardino di Boboli, a Firenze; Marzo 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; su foglie di faggio sternate; a Camaldoli nel Casentino, Toscana; 1866; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano.

Discosia strobilina Lib. [*Discosiaceae*]

ad conos dejectos *Pini abietis*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Discosia sp. [*Discosiaceae*]
[...]; 1882.

Discula incarnata (Kunze) Höhn. [*Gnomoniaceae*]
sub: *Naemaspora incarnata* Desm., in cortice *Populorum*; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834); sur les rameaux morts et tombées à terre du *Populus fastigiata*; au Parc de Saint-George, à Courtrai; Octobre.

Ditopella ditopa (Fr.) J. Schröt. [*Gnomoniaceae*]
sub: *Sphaeria ditopa* Fr., sur les branches et rameaux de l'aulne; dans les jardin de St George a Courtrai; printemps.

Doassansia sagittariae (Fuckel) J.C. Fisch. [*Doassansiaceae*]
sub: *Uredo sagittariae* Westend., sur les feuilles du *Sagittaria sagittifolia*; dans les ruisseaux du Parc de Gentinnes, près de Marbaix; M^{re} le Comte Alf. De Limminghe et J. Barbier.

Dothidea appendiculata Lacroix [*Dothideaceae*]
sur le *Chondrilla juncea*; près de Saint-Romain-sur-Vienne (Vienne); Avril 1855; rec. S. De Lacroix; F. Schultz, Herbarium normale ser. II.

Dothidella depazeoides (Desm.) Theiss. & Syd. [*Polystomellaceae*]
sub: *Dothidea depazeoides* Desm., sur les feuilles vivantes du buis; au jardin du collège Notre-Dame, à Namur (M^{re} Bellynck).

Dothidea populina Westend. [*Dothideaceae*]
sur les feuilles mortes et tombées à terre du Peuplier blanc; dans les bois qui entourent la campagne de Meli' Sumont de Volsberghe, à Courtrai; Hiver.

Dothidea sambuci (Pers.) Fr. [*Dothideaceae*]
sub: *D. sambuci* Fr. f. *moricola*; sui rami secchi dei gelsi; presso Locarno al Lago Maggiore; Agosto 1861; Ottobre 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *D. sambuci* Fr. f. *hippohaets*; sui rami secchi dell'*Hippophae rhamnoides* disposti a siepe; a Langhirano, provincia di Parma; Aprile 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *D. sambuci* Fr.; sui rami del *Sambucus racemosa*; nella provincia di Sondrio, Valtellina; Autunno 1862; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Dothidella ulmi (C.-J. Duval) G. Winter [*Polystomellaceae*]
sub: *Dothidea ulmi* (C.-J. Duval) Fr., sub: *D. ulmi* Fr.; [...]; Austria; leg. Haussmann; sub: *D. ulmi* Fr.; sur les feuilles de l'orme (*Ulmus campestris*), sub: *D. ulmi* Fr.; sur les feuilles de l'*Ulmus campestris* L.; Charente inférieure: La Rochelle; 29 Nov 1889; G. Maire; Ch. Magnier, *Flora Selecta exsiccate*; sub: *D. ulmi* Fr.; sulle foglie languenti degli olmi; ad Oldenico nella provincia di Vercelli; Autunno 1859; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Phyllachora ulmi* Fkl.; Leipzig; Oct. 1870; leg. G. Winter; Ex herb. de Thümen; sub: *P. ulmi* Fkl., [...]; leg. Paul.

Dothiora oleae (DC.) Crous [*Botryosphaeriaceae*]
sub: *Diplodia oleae* De Not.; sulle foglie secche dell'olivo; alla Spezia; Autunno 1857; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Dothiora ribesia (Pers.) M.E. Barr [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Dothidea ribesia* Pers., sur les troncs et les branches mortes du groseillier rouge (*Ribes rubrum* L.); dans le jardin de M. Devriesere, jardinier-fleuriste; à Courtrai; Mars.

Drepanopeziza populi (Lib.) Rossman & W.C. Allen [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Leptothyrium populi* Lib.; ad folia populi; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sub: *Leptothyrium populi* Lib.; sur les feuilles des peupliers; aux environs de Gand.

Drepanopeziza ribis (Rehm ex Kleb.) Höhn. [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Leptothyrium ribis* Lib.; ad folia Ribis rubri; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sub: *Leptothyrium ribis* Lib.; sur la face supérieure des feuilles du Groseillier rouge (*Ribes rubrum*); au jardin de militaire de Bruges; sub: *Gloeosporium ribis* Lib.; in *Ribis rubri* L. folia viva; Hottingen prope Zilrich (Helvetiae); frequens; Jun 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 192.

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn [*Sclerotiniaceae*]

sub: *Peziza tuberosa* Bull., sur la terre; dans les bois humides et ombré des environs de Mons; d'ou Mr l'Abbé Clém. Dumont a eu l'obligeance de nous l'envoyer en grand nombre; sul terriccio né boschi cedui; a S. Rocco, presso Napoli; Marzo 1872; Pasquale; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Duplicaria empetri (Pers.) Fuckel [*Rhytismataceae*]

sub: *Rhytisma empetri* Fr.; sulle foglie dell'*Empetrum nigrum*; presso Riva in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Durella carestiae (De Not.) Sacc. [*Helotiaceae*]

sub: *Blitridium carestiae* De Not.; ad ramulos emortuos Rhododendri (in subalpinis); Riva, 1868; leg. Abb. Carestia; Rabenhorst, Fungi europei; sub: *Blitridium carestiae* De Not.; sui rami secchi di *Rhododendron ferrugineum*; Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Durella connivens (Fr.) Rehm [*Helotiaceae*]

sub: *Patellaria connivens* Fr., ad rudimenta ramulorum putrescentium ad huc pendentia in querceto; prope Sugenheim, Frane. Mediae; leg. Dr. Rehm; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Echinoderma asperum (Pers.) Bon [*Agaricaceae*]

sub: *Agaricus acutesquamosus* Weinm.; sul terriccio dé troguoli di Camelia; nel giardino del Marchese Bendinelli Durazzo a Genova; Ottobre-Novembre 1867; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Ectostroma hederæ Desm. [*Incertae Sedis*]

sur la feuille vivante du lierre; [...]; 18 aofrt 1874; à St Pons.

Ectostroma liriodendri (Kunze) Fr. [*Incertae Sedis*]

sur les feuilles tombées du Liriodendron tulipifera; dans le jardin de St George, à Courtrai; Octobre et Novembre; Bohemia: Tetschen; 9. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *Leptostroma liriodendri* Rabenh., [...]; Saxoniae; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ectostroma sedi Fr. [*Incertae Sedis*]

sur les feuilles et les tiges du Sedum telephium; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Elaphomyces granulatus Fr. [*Elaphomycetaceae*]

sud-Deutschland; Hohenacker, Arzn. U. Handelspfl. 850; Fungi, Gasteromycetes Cryptogamia Fungi.

Eleutheromyces subulatus (Tode) Fuckel [*Helicogoniaceae*]

sub: *Sphaeronema subulatum* Fr.; sugli agarici e più comunemente sull'*Agaricus sublateritius*; nei monti d'Oropa e di Campigna, nel Biellese; Agosto-Settembre 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Elsinoe ampelina Shear [*Elsinoaceae*]

sub: *Ramularia ampelophaga* Pass., ad folia *Vitis viniferae* var. *lugliatica*; vidi etiam in aliis var. acinis albis; nempte Moscatello, Trebbiano, Chastellus, folia, ramulos et racemos deformans et destruens; Parmae; Julio 1876; G. Passerini.

Encoeliopsis rhododendri (Ces.) Nannf. [*Incertae Sedis*]

sub: *Peziza rhododendri* Ces., sui frutti secchi del *Rhododendron ferrugineum*; all'Alpe Bietri nel canton Ticino; Autunno 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Endophyllum euphorbiae-sylvaticae (DC.) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium euphorbiae* Pers.; sur les feuilles de l'*Euphorbia cyparissas*; aux environs de Namur; Mr Bellyncq; sub: *A. euphorbiae* Pers.; [...]; Hauszman; sub: *A. euphorbium* DC.; sulle foglie dell'*Euphorbia cyparissas*; nell'Appennino di S. Benedetto in Toscana; Giugno 1858; Caldesi; sub: *A. euphorbiae* Pers. f. *cyparissias*; Franconia: Bayreuth; May 1874; Ex herb. de Thümen.

Endophyllum sedi (DC.) Lév. [*Pucciniaceae*]

an *Sedum biloniense* Loisl.; bei Liegnitz in Schlesien; Mai 1869; Dr Schneider; Rabenhorst, Fungi europaei.

Endophyllum sempervivi (Alb. & Schwein.) de Bary [*Pucciniaceae*]

sub: *E. sempervivi* (Alb. & Schwein) Lév.; an lebenden Blättern von *Sempervivum tectorum* L.; auf Kaiser's Gartenmaner in der Zeisingstrasse in Eisleban (Prov. Sachsen); im Mai 1873; leg. Joh. Kunze; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. sempervivi* Lév.; sul *Sempervivum montanum*; in Valle Lavizzara nel Canton Ticino; 1860; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *E. sempervivi* Lév.; sul *Sempervivum wulfeni*; a Riva in Valsesia; 1860; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Uredo sempervivi* Alb. & Schwein., sur les feuilles du *Sempervivum tectorum*; dans le jardin de Mr Samray, pharmacien, à Namur; M' le Comte Alf. De Limminghe et J. Barbier.

Entodesmium niesslianum (Rabenh.) L. Holm [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Leptosphaeria niessliana* Rabenh, ad *Lathyri sylvestris* L. caulos aridos; in monte "Zürich berg" prope Zürich (Helvetiae); frequens; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 180.

Entyloma calendulae (Oudem.) de Bary [*Entylomataceae*]

sub: *E. calendulae* Oudem.; in *Calendulae officinalis* L. foliis vivis; in hortis prope Ztirich (Helvetiae); October 1879; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 110.

Entyloma fergussonii (Berk. & Broome) Plowr. [*Entylomataceae*]

sub: *E. canescens* Schr.; auf *Myosotis palustris*; Grunewald bei Berlin; im October 1877; leg. Ule; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. canescens* Schr.; auf BIUtern von *Myosotis stricta*; im Mai 1877; liMmmen bei Rastatt in Baden; Dr. Schröter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Entyloma ficariae A.A. Fisch. Waldh. [*Entylomataceae*]

sub: *Fusidium foliorum ranunculi*; feuilles languissantes du *Ranunculus acris* et *R. repens*; sub: *F. ranunculi* Bonord. f. *Ficariae*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Entyloma microsporum (Unger) J. Schröt. [*Entylomataceae*]

sub: *E. microsporum* Unger; in *Ranunculi repentis* L. foliis vivis; prope Zürich (Helvetiae); frequens; October 1879-1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 113; sub: *E. ungerianum* de Bary f. *ficariae*; in *Ficaria ranunculoides*; Parmae; Oct. 1899; G. Passerini; auf *Ranunculus repens*; beim Bade Sulzbach (Schwarzwald); Sept 1873; De Bary; Rabenhorst, Fungi europaei.

Entyloma verruculosum A.A. Fisch. Waldh. [*Entylomataceae*]

sub: *Entyloma verruculosum* Pass., ad folia viva *Ranunculi velutini*; in pratis; Parmae; Majo 1873; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei; in foliis *Ranunculi velutini*; Parmae; Majo; Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Epichloe typhina (Pers.) Brockm. [*Clavicipitaceae*]

sub: *Dothidea typhina* (Pers.) Fr., sur les chaumes des graminées; principalement des *Dactylis* et *Holcus*; aux environs de Courtrai; sub: *E. typhina* Fr.; praterie; Castagnolo presso Pisa; Giugno 1863; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *E. typhina* Fr.; sul *Triticum repens*; a Parma; Maggio 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *E. typhina* Fr.; su graminacee diverse, *Lolium*, *Dactylis*, ecc.; negli arboreti dell'Orto botanico di Genova; Giugno 1869; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *Sphaeria typhina* Pers., sur le *Brachypodium sylvaticum*; Fontainebleau (Seine et Marne); Juillet 1889.

Epicoccum dispersum Ces. & Mont. [*Didymellaceae*]

in foliis *Salicum dejectis*; Vercellis; Nov. 1860; leg. Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Epicoccum duriaeanum Mont. [*Didymellaceae*]

ad folia Mori albese; prope Oldenico (Vercelli); 1861; leg. Malinverni; Rabenhorst, Fungi europaei.

Epicoccum malinvernianum Ces. & De Not. [*Didymellaceae*]

sulle foglie morte dei gelsi; ad Oldenico, provincia di Vercelli; autunno 1861; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Epicoccum menispermi Pass. [*Didymellaceae*]

ad folia languida elabentiva *Menispermi canadensis* L.; Parmae in horto boe Novembre 1877; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Epicoccum neglectum Desm. [*Didymellaceae*]

in foliis *Zea maydis*; horti botanici Dresdensis; Posharsky; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les feuilles mortes du *Zea mays*; aux environs de Courtrai; Automne.

Epicoccum nigrum Link [*Didymellaceae*]

sub: *Epicoccum purpurascens* Ehrenb., sur les chaumes et gaines pourrissantes du *Zea mays*; au jardin de la station du chemin de fer, à Courtrai.

Epicymatia commutata Niessl [*Mycosphaerellaceae*]

in lamina sporigera *Lecanorae subfuscae*, ad truncos *Populi tremulae*; silvarum elatiorum ad Olazium Scepusii (Centra-Karpaten); Julio; leg. C. Kalchbrenner; Rabenhorst, Fungi europaei.

Epidochium maertensii Westend. [Tremellaceae]

sur les rameaux morts et tombés à terre du tilleul; au part de St. George, à Courtrai.

Epidochium virens Westd. [Tremellaceae]

sur les tronc mort d'un frêne; dans le cour de l'infermerie de Menin.

Epitea euphorbiae-helioscopiae W. Hausm. [Phragmidiaceae]

sub: *E. euphorbiae* f. *helioscopiae*; sull'*Euphorbia helioscopia*; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Epitea gyrosa Fr. [Phragmidiaceae]

feuilles du *Rubus idaeus*; Riva in Valsesia; 1865; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Epilethe typhae (Pers.) Pat. [Polyporaceae]

sub: *Corticium typhae* Fuckel, alla base delle foglie putrescenti delle carici palustri maggiori; presso Vercelli; Novembre 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Eriopezia caesia (Pers.) Rehm [Arachnopezizaceae]

sub: *Peziza chavetiae* Lib., in cryptis ad ligna dejecte quercina; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Eriosporella calami (Neissl) Höhn. [Incertae Sedis]

sub: *Cryptosporium calami* Kunze f. *Hymenula calami*; in foliis *Calami* sp.; Calcutta; S. Kurz.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Erysibe lenticularis Rabenh. [Incertae Sedis]

auf *Fraxinus ornus*; Heufler.

Erysiphe astragali DC. [Erysiphaceae]

— sur les feuilles de l'*Astragalus glycyphyllos*; aux environs de Bruxelles et de Resteigne-Namur; Mr Mathieu, Mr Crépin; sulle foglie e sui frutti dell'*Astragalus glycyphyllos*, né faggeti alle falde del Monte Matto presso i bagni di Valdieri in Piemonte; Agosto 1862; Manuel di S. Giovanni; Erbario Crittogamico Italiano.

Erysiphe berberidis DC. [Erysiphaceae]

sub: *Erysibe penicillata* Link, in foliis *Alni glutinosae* et *Viburni opuli*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les feuilles du *Berberis vulgaris*, dans les jardins à Namur; Mr l'Abbé Bellyneck; sub: *Microsphaera berberidis* (DC.) Lév., ad folia *Berberidis*; leg. Lasch; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Calocladia berberidis* Lév.; Silesia; Breslan; 9. 1874; Ex herb de Thümen.

Erysiphe clandestina Biv. [Erysiphaceae]

sub: *E. clandestina* Fr.; sur les feuilles du l'Aubépine (*Crataegus oxyacantha* L.)

Erysiphe communis (Wallr.) Schldtl. f. *calendulae* Jacz. [Erysiphaceae]

sub: *E. communis* Lév. h. *calendulae* Westend.; sur les feuilles du *Calendula officinalis*, dans un jardin à Namur; d'ou Mr J. Barbier a eu l'obligeance de nous la faire connaître;

Erysiphe communis. (Wallr.) Schldtl. f. *hyoscyami* Jacz. [Erysiphaceae]

sub: *E. communis* Link f. *hyoscyami*; ad Dresdam, Saxoniam; leg. Rabenhorst; Rabenhorst, Fungi europaei;

Erysiphe communis (Wallr.) Schltdl. f. *thalictri* Hammarl. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. communis* Link e. *thalictri* Nob.

E. communis (Wallr.) Schltdl. var. *cichoracearum* Fr. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. communis* (Wallr.) Schltdl. var. *cichoracearum* Fr.; sur les feuilles vivantes du *Scorzonera hispanica*; au jardin de l'hôpital militaire de Bruges.

Erysiphe communis (Wallr.) Schltdl. var. *labiatarum* Link [*Erysiphaceae*]

sub: *E. communis* Link d. *labiatarum* Link; sur les feuilles du *Stachys sylvatica*; aux environs de Courtrai.

Erysiphe compositarum Duby [*Erysiphaceae*]

sub: *E. compositarum* a. *lappae* Duby; *E. compositarum* b. *artemisiae*; la variété a. croit sur les feuilles de l'*Arctium lappa*; aux environs de Courtrai et la variété b. sur celles de l'*Artemisia vulgaris*.

Erysiphe corni Duby [*Erysiphaceae*]

sub: *E. corni* Wallr.; ad *Corni sanguineae* L. folia viva; prope Zürich (Helvetiae); frequens; October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 177.

Erysiphe detonsa Fr. [*Erysiphaceae*]

cette plante, qui forme le passage du genre *Erysiphe* ou genre *Pysomyxa* de Corda, a été trouvée sur les deux faces des feuilles d'un *Apargia*; dans les dunes de Furnes; Octobre; nouvelle pour la Flora Belge.

Erysiphe divaricata (Wallr.) Schltdl. [*Erysiphaceae*]

sub: *Microspahera divaricata* Lév.; sur les feuilles du *Rhamnus frangula*; aux environs d'Ath; Mr Tosquinet.

Erysiphe ehrenbergii (Lév.) U. Braun, M. Bradshaw & S. Takam. [*Erysiphaceae*]

sub: *Microsphaera ehrenbergii* Lév., sur les feuilles du *Lonicera tartarica*; dans un jardin à Bovinnes-lez-Namur; M' J. Barbier.

Erysiphe friesii (Lév.) U. Braun & S. Takam. [*Erysiphaceae*]

Microsphaera friesii Lév. f. *Betulae pubescentis*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb de Thümen.

Erysiphe hedwigii (Lév.) U. Braun & S. Takam. [*Erysiphaceae*]

sub: *Microsphaera hedwigii* Lév., Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb de Thümen.

Erysiphe heraclei DC. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. communis* Link f. *umbelliferarum* Link; sul finocchio; ad Albissola marina, Liguria occidentale; Ottobre 1868; Gibelli, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Erysiphe linkii Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. linkii* Lév. f. *Artemisiae vulgaris*; Anglia: Derbyshire; 7. 1873; leg. F. Brittain; Ex herb. de Thümen; sub: *E. linkii* Lév. f. *harniae*; Bohemia: Kinigswald; 10.1873; Austria inf.: Krens.; sur les feuilles de l'*Artemisia vulgaris*; France: Fontainebleau, Seine-et-Marne; Juillet 1885; Herbarium Feuilleauboiss; sub: *E. linkii* Lév.; parasitica in foliis *Stachydis germanicae*; prope pagum Sziget lejfalú; legit 3 Julio 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher.

Erysiphe loniceare DC. [*Erysiphaceae*]

sulla *Lonicera coerulea*; S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Settembre 1886; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Erysiphe necator Schwein. [*Erysiphaceae*]

sub: *Oidium tuckeri* Berk., sur les fruits, ainsi que sur les deux faces des feuilles de la vigne; au jardin de Mr le lieutenant-colonel d'artillerie Baron de Ryckholt, à Gand., Passerini.

Erysiphe tortilis (Wallr.) Link [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe tortilis* Lév.; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Erysiphe tortilis* Fr.; sur les feuilles du *Cornus sanguinea*; au parc de Saint George à Courtrai; Décembre.

Erysiphe trifolii Grev. [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe martii* Lév., sul *Peucedanum oreoselinum*; in Valle Intrasca al Lago Maggiore; 1863; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sul trifoglio; né campi del Monte Balletto sopra Brunate, Lago di Como; 1864; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *E. martii* Lév. f. *aparines*; Bohemia: Aussig; 8. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *E. martii* Lév. var. *urticearum*; Ponickan pr. Grossenhain (Saxoniae); ad folia *Urticae*; Sept.; leg. Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. martii* (Lév.) Fuckel f. *rubiaceraum* Rabenh.; in *Rubia peregrina* var. *latifolia*; Castelseras in Hispania; (Spagna); 1869; Loscos; Rabenhorst, Fungi europaei.

Erysiphe montagnei Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. montagnei* Lév. f. *Lappae minoris*; Anglia: Derbyshire; 8. 1873; leg. F. Brittain; Ex herb. de Thümen; sul *Kentrophyllum lanatum*; né dintorni di Portoferraio all'Isola d'Elba; luglio 1870; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *E. montagnei* Link f. *Lappae minoris*; Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Erysiphe myrtillina Fr. [*Erysiphaceae*]

sur les feuilles du *Vaccinium uliginosum*; dans les marais des environs des baraques de Transine, Luxembourg; Mr Crépin.

Erysiphe nervisequia Westend. [*Erysiphaceae*]

sur les nerveures des deux cotés des feuilles du *Stachys palustris*; ella a été trouvée par M' l'Abbé Bellynck; à Salzinne, près de Namur.

Erysiphe penicillata (Wallr.) Fr. [*Erysiphaceae*]

sub: *E. penicillata* a. *loniceare* Fr., var. b. *viburni* Nob.; la variété a. croit sur les feuilles de la Chèvrefeuille et la b. sur celles de *Viburnum opulus*, aux environs de Tournay; d'ou notre ami M. V. Marissal, nous l'a communiqué; sub: *E. penicillata* c. *mespili* Nob.; sur les feuilles du *Mespilus germanica*; aux environs de Louvain; par le Rev. Péré Leburton.

Erysiphe polygoni DC. [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe communis* Lév. f. *polygoni*; ad *Polygoni aviculari* folia; prope Zürich, Helvetiae; Octb. 1879; G. Winter, sub: *E. communis* Lév. g. *polygonorum* Link; sur les feuilles du *Polygonum avicularia*; aux Grands-Malades près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Erysiphe prunastri DC. [*Erysiphaceae*]

sur les feuilles du *Prunus spinosa*; aux environs de Namur; d'ou Mr J. Barbier.

Erysiphe salicis DC. [*Erysiphaceae*]

sur les feuilles de plusieurs especes de saule.

Erysiphe sp. [*Erysiphaceae*]

sopra piante di *Scandix pecten-veneris*; Castiglion dei Pepoli; Luglio 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Euantennaria pinophila (Nees) Sugiy. & Hosoya [*Euantennariaceae*]

sub: *Antennatula pityophyla* Fr., sui rami dell'*Abies pectinata* e del *Taxus baccata*; al monte Colmanicchio presso Locarno; ottobre 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Eustilbum rehmanium Rabenh. [*Typanidaceae*]

[...], Bavariae; leg. Dr Rhem; Rabenhorst, Fungi europaei.

Eutypa flavovirens (Pers.) Tul. & C. Tul. [*Diatrypaceae*]

sub: *Hypoxyton flavovirens* (Pers.) J. Kichx f., sur des branches mortes du bouleau (*Betula alba*); aux environs de Courtrai; assez rare.

Eutypa maura (Fr.) Fuckel [*Diatrypaceae*]

sub: *Eutypa acharii* Tul.; auf *Acer pseudoplatanus*; bei King's Linn, England; im May 1874; leg. Charles B. Plowright; Rabenhorst, Fungi europaei.

Eutypa scabrosa (Bull.) Auersw. [*Diatrypaceae*]

sub: *E. scabrosa* (Bull.) Awd.; ad truncos caesos *Populi tremulae*, in silvis coniferarum; agri Bormienses (Bosco di Cerasina); Julio 1866; leg. M. Anzi; Rabenhorst, Fungi europaei.

Eutypa spinosa (Pers.) Tul. & C. Tul. [*Diatrypaceae*]

sub: *E. spinosa* Tul.; in Fagi trunco emertuo; ad Salem; 1863; leg. J. B. Jack.

Eutypa velutina (Westend. & Wallays) Sacc. [*Diatrypaceae*]

sub: *Hypoxyton velutinum* (Wallr.) Westend. & Wallays, sur un fond de cuvelle; conservé dans une cave humide; à Menin.

Eutypella cerviculata (Fr.) Sacc. [*Diatrypaceae*]

sub: *Valsa cerviculata* Fr., sui tronchi di carpino; né dintorni di Biella; Settembre 1857; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; su pali; nell'Orto botanico di Genova; Marzo 1872; Baglietto, Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Eutypella quaternata (Pers.) Rappaz [*Diatrypaceae*]

sub: *Sphaeria quaternata* Pers., sur les tronc et les branches du hatre; aux environs de Courtrai; sub: *Valsa quaternata* Fr., sui rami secchi dei faggi; a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Eutypella sorbi (Alb. & Schwein.) Sacc. [*Diatrypaceae*]

sub: *Sphaeria sorbi* Alb. & Schwein., ad ramos siccus *Pruni padi*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Excipula eryngii Corda [*Ploettnerulaceae*]

su steli secchi di *Eryngium campestre*; nell'alveo della Baganza, presso Parma; Dicembre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Excipula hysteriiformis De Not. [*Ploettnerulaceae*]

su pertiche secche; a Parma; 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr. [*Auriculariaceae*]

sub: *E. glandulosa* Fr.; ad ramos exsiccates; Hieme; Libert, Pl. Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Exidia recisa (Ditmar) Fr. [*Auriculariaceae*]

sub: *Exidia recisa* Fr., ad ramos putrescentes *Salicum* et *Populorum*; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Exidiopsis calcea (Pers.) K. Wells [*Auriculariaceae*]

sub: *Corticium calceum* (Pers.) Fr., sulla corteccia di annosi lecci; nella Selva Pisana; 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Exoascus populi Thüm. [*Taphrinaceae*]

sub: *E. populi* Thiim. f. *Populi nigrae* Tul.; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb. de Thümen.

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [*Exobasidiaceae*]

sub: *E. vaccinii* Woron. f. *Vaccini uliginosi*; Bohemia: Zinnwald; 8. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *E. vaccinii* Woron.; ad *Vaccini myrtilli* folia; Zürich, Helvetiae; 9. 1880; G. Winter.

Exosporium maculans Link [*Incertae Sedis*]

sur les fanes de la pomme-de-terre.

Exosporium rubi Nees & T. Nees [*Incertae Sedis*]

in foliis *Rubi idaei*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Exosporium tiliae Link [*Incertae Sedis*]

ad *Tiliae* ramos emortuos; Dresdae; Rabenhorst; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II; sui rami secchi dei tigli; nelle boscaglie presso Locarno, al Lago Maggiore; Novembre 1862; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto [*Fibroporiaceae*]

sub: *Polyporus vaillantii* (DC.) Fr., ad radices arborum; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto [*Fibroporiaceae*]

sub: *Polyporus vaillantii* (DC.) Fr., ad radices arborum; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Fistulina hepatica (Schaeff.) With. [*Incertae Sedis*]

sub: *F. hepatica* Fr.; sui ceppi di annosi castagni; nelle Selve di Varenna, presso Pegli, Liguria occidentale; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *F. hepatica* Fr.; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *F. hepatica* Fr.; sui fusti di castagno; Castiglione dei Pepoli; Agosto 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Flagelloscypha faginea (Lib.) W.B. Cooke [*Niaceae*]

sub: *Cyphella faginea* Lib., in fagetis ad folia dejecta; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Flammulina velutipes (Curtis) Singer [*Physalacriaceae*]

sub: *Agaricus velutipes* Curtis; al piede delle Robinie; presso Vercelli; Novembre 1857; Malinverni;
sub: *Agaricus velutipes* Curtis; alla Costa presso Chiavari, nelle colline; Ottobre 1886; F. Delpino;
Herb. Delpino.

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai [*Fomitopsidaceae*]

sub: *Polyporus betulinus* (Bull.) Fr., sul tronco della *Betula alba*; presso Riva in Valsesia; Autunno
1858; Carestia.

Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev & Singer [*Fomitopsidaceae*]

sub: *Polyporus officinalis* (Vili.) Fr., sul tronco dei larici; nei dintorni di Riva in Valsesia; 1858;
Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; [...]; leg. Heufler.

Fouragea filicina (Mont.) Trevis. [*Opegraphaceae*]

sub: *Aylographum filicinum* Lib.; ad stipites *Aspidii filicis maxis*; per annum; Libert, *Plantae
Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Foveostroma drupacearum (Lév.) Di Cosmo [*Incertae Sedis*]

sub: *Micropora drupacearum* Lév.; sur l'écorce des jeunes troncs morts du cerisier; dans les jardin
de M. le Lieutenant Wahis; à Menin.

Fomes fomentarius (L.) Fr. [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus fomentarius* Fr.; Bohemia: Zinnwald; 10. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *Polyporus
inzengae* Ces. & De Not., su pioppi annosi; nelle vicinanze di Palermo; 1860-61; G. Inzenga.

Frommeella tormentillae (Fuckel) Cummins & Y. Hirats. [*Phragmidiaceae*]

sub: *Phragmidium tormentillae* Corda; Bohemia: Teplitz; 10. 1873; Ex herb. de Thümen.

Fumago salicina Tul. & C. Tul. [*Incertae Sedis*]

ad *Salicis albae* folia ramulosque; Chedes in Chamonnix; Helvetiae; G. Winter.

Fumago vagans Pers. [*Incertae Sedis*]

sub: *Fumago vagans* Pers. f. *armeniaca* West.; sur les feuilles d'un abricotier; à Saint-Nicolas; sub:
Fumago vagans Pers. a *alni* Pers.; sur les feuilles de l'Aulne glutineux; sub: *Fumago vagans* Pers.
13 populi Pers.; sur les feuilles des peupliers.

Fusarium buxi Sacc. [*Nectriaceae*]

sub: *Fusisporium buxi* Desm.; sur les feuilles du buis.

Fusarium equisetorum (Lib.) Desm. [*Nectriaceae*]

sub: *F. equisetorum* Desm.; sur les tiges de l'*Equisetum limosum*; Courtrai.

Fusarium heterosporum Nees & T. Nees [*Nectriaceae*]

sub: *F. heterosporum* Nees; à la base des épillets du *Lolium perenne*; le long du chemin de fer de
Courtrai, à Bruges; Septembre 1849.

Fusarium lateritium Nees [*Nectriaceae*]

sub: *Botryosphaeria moricola* Ces. & De Not., sui rami secchi dei gelsi; nei dintorni di Locarno al
Lago Maggiore; Novembre 1860; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sur des branches mortes

du *Robinia pseudoacacia*; au jardin de M' Delombaerde, horticulteur à Courtrai; *Morus* sp.; Bohemia: Badenleah; Mar 1873; Ex herb. de Thümen.

Fusarium oxysporum Schltdl. [Nectriaceae]

sub: *Fusarium lagenariae* (Schwein.) Sacc., sul frutto di una lagenaria; all'Orto botanico di Parma; Novembre 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Fusarium pallidum Berk & M. A. Curtis [Nectriaceae]

sub: *Fusisporium pallidum* Niessl; sur les feuilles du *Juglans regia* L.; Monte "Kreurberg" prope Friegans; Aug 1877; Schumann.

Fusarium peltigerae Westend. [Nectriaceae]

sur et sous les veilles folioles du thalle de *Peltigera rufescens*; aux environs de Courtrai; Octobre.

Fusarium pezizoides Desm. [Nectriaceae]

sur les feuilles de l'*Hedera helix*; aux environs de Courtrai.

Fusarium roseum Link [Nectriaceae]

sur les tiges mortes de plantes herbacées; sub: *Gibberella pulicaris* Fr.; *Sambucus* sp.; Jul.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Sphaeria cyanogena* Desm., sur les vieux trognons pourris de choux; dans le jardin de Madame Veuve Goethals-Vercreusse, près de Cotirtrai. Nouvelle pour la Flore Belge.

Fusarium sarcochroum (Desm.) Sacc. [Nectriaceae]

sub: *Selenosporium sarcochroum* Desm.; sur les rameaux morts du *Cytisus laburnum*; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Fusarium solani (Mart.) Sacc. [Nectriaceae]

sub: *Fusisporium solani* Mart.; bei der kartoffel; Wiirttemberg; Hohenacker Arzn. u. Handelspf. n° 720; Fungi, Gasteromycetes - Cryptogamia Fungi; sub: *Fusisporium solani* Mart.; Bohemia: Teplitz; 1. 1872; Ex herb. de Thümen.

Fusarium stillatum De Not. [Nectriaceae]

su steli secchi di *Genista tinctoria*; al ponte di Possaccio in Val Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. [Hymenochaetaceae]

sub: *Polyporus cellaris*; in locis humidis domesticis; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Fusidium hysteriiforme Westend. [Nectriaceae]

sur l'ecorce du fruit du Melon.

Fusidium parasiticum Westend. [Nectriaceae]

sur le strome du *Xylaria cornuta*; au jardin du parc de Saint-George, à Courtrai.

Fusisporium urticae Desm [Nectriaceae]

sur la face inferieure des feuilles de l'Ortie dioique; environs de Bruges; L. Matthys.

Fusisporium zae Westend [*Nectriaceae*]

sur les chaumes du maïs; dans la station du chemin de fer, à Courtrai; pendant l'hiver.

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus lucidus* Fr.; sul tronco dei salici; nella Valle del Serchio; alle falde del monte Pisano; Autunno 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. [*Geastraceae*]

sub: *Geastrum multifidum* DC., ad terram nudam; 10. 1869; J. Scriba; Flora von Darmstad. [...]; Flora hassiara.

Geastrum minimum Schwein [*Geastraceae*]

sub: *Geaster cesatii* Rabenh.; né luoghi arenosi e scarsi d'erbe; lungo gli argini del fiume Sesia, presso Vercelli; Dicembre 1859-1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Geastrum tunicatum Vittad. var. *melichianum* Sacc. [*Geastraceae*]

su terriccio di castagni; in un truogolo di camellie; ad Albissola marina, Liguria occidentale; Ottobre 1869; Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; nell'Orto botanico di Genova; Autunno 1862; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; dalla Selva Pisana; Autunno 1862; Beccari, Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano.

Geohypha terrestris (Fr.) Hennebert [*Incertae Sedis*]

sub: *Hyphelia terrestris* Fr., ad vias sylvarum; prope Doemitz; leg. Fiedler; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed II.

Gibbera vaccinii (Sowerby) Fr. [*Venturiaceae*]

sub: *Sphaeria vaccinii* Sowerby, in ramis *Vaccini vitis*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les rameaux du *Vaccinium vitis-idaea*; dans les bruyères qui avoisirant les baraques de Fraiture, Luxembourg; Mr Crépin.

Gloiothela lactescens (Berk.) Hjortstam [*Peniophoraceae*]

sub: *Corticium lactescens* Berk.; sui pali delle viti; presso Parma; Dicembre, Marzo, Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Glonium incrustans De Not. [*Gloniaceae*]

ad un palo scortecciato nella campagna di Cambiasca, in Val Intrasca, lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Gnomonia fimbriata (Pers.) Fuckel [*Gnomoniaceae*]

sub: *Asteroma carpini* (Liberta) B. Sutton, sub: *Leptothyrium betulae* Lib.; in foliis *Betulae albese*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1832), sub: *Leptothyrium carpini* Lib.; ad folia *Carpini betuli*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834), sub: *Gloeosporium carpini* Desm.; sur la face inferieure des feuilles languissantes du charme; aux environs de Courtrai; Novembre; sub: *Gloeosporium carpini* Desm.; Austria inf.: Krems; 7. 1870; Ex herb. de Thümen; sub: *Dothidea fimbriata* Kx., sur les feuilles mortes du charme (*Carpinus betulus* L.); au bois de la Cambre lez Bruxelles; d'ou M. V. Marissal nous l'a envoyé; Mars; sub: *Mamiana fimbriata* De Not.; sulle foglie del carpino; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. fimbriata* Ces. & De Not.; sulle foglie de carpini; a Cossilla presso Piemonte; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Gnomonia fimbriata* De Not.; Sept, Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon

viranyabol; sub: *Sphaeria fimbriata* Pers., in foliis *Carpini betuli*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1834).

Gnomonia gnomon (Tode) J. Schröt. [*Gnomoniaceae*]

sub: *G. vulgaris* Ces. & De Not.; sulle foglie sternate del tiglio; nelle colline di Bologna; Aprile 1864; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Godronia ribis (Fr.) Seaver [*Godroniaceae*]

sub: *Cenangium ribis* Fr., [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; su rami secchi del *Ribes petraeum*; a Riva in Valsesia; 1865; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; in ramis exsiccatis *Ribis rubri*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Golovinomyces biocellatus (Ehrenb.) V.P. Heluta [*Erysiphaceae*]

sub: *Oidium erysiphoides* Fr., sur les feuilles du cocombre (*Cucumis sativus*); sub: *O. erysiphoides* Fr. f. *rapae*; Bohemia: Keinigswalt; 10. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *O. erysiphoides* Fr. f. *Myosotidis strictae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen.

Golovinomyces cichoracearum (DC.) V.P. Heluta [*Erysiphaceae*]

sub: *E. communis* Link. f. *leguminosarum*; in sylvis monti; Austria inferioris; Heufler; sub: *E. communis* Link. f. *umbeliferarum*; Glaggenitz; Heufler.

Golovinomyces cynoglossi (Wallr.) V.P. Heluta [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe horridula* Lév. f. *Lithospermi arvensis*; Bohemia: Teplitz; 7. 1873; Ex herb. de Thümen.

Graphiola phoenicis (Moug. ex Fr.) Poit. [*Graphiolaceae*]

sub: *G. phoenicis* Poit.; sulle foglie della *Phoenix dactylifera*; presso San Remo, nella Liguria occidentale; Autunno 1858; Panizzi; sub: *G. phoenicis* Poit.; in tepidariis; [...], Florentiae; Nov. 1877; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae; sub: *G. phoenicis* Poit.; sur le *Phoenix dactylifera*; Seine: Paris, au Muséum; 18 Juillet 1866; C. Duval; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccatae; sub: *G. phoenicis* Poit.; sur les feuilles languissantes du *Phoenix dactylifera*; dans les serres du part de la Tête d'or et du Jardin Botanique de Lyon; toute l'année 1882; Dr A. Magnin; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccatae; sub: *G. phoenicis* Poit.; sur les feuilles du *Phoenix dactylifera*; 12 jun 1884; Oran.

Guignardia perpusilla (Desm.) Verpl. [*Phyllostictaceae*]

sub: *Sphaeria perpusilla* Desm., sur les feuilles des graminées; aux environs de Rochefort; Mr Crépin.

Guignardia reticulata (DC.) Aa [*Phyllostictaceae*]

sub: *Asteroma reticulatum* Chev.; sur les feuilles du *Mayanthemum bifolium*; aux environs de Louvain; Mr l'Abbé Leburton.

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton [*Hymenogastraceae*]

sub: *Pholiota spectabilis* (Fr.) Gillet, supra travem; Octobre 1889; G. E. Mattei; G. E. Mattei, Fungi Bononienses.

Gymnopus impudicus (Fr.) Antonín, Halling & Noordel. [*Omphalotaceae*]

sub: *Marasmius impudicus* Fr., Hahnam ad Bristol; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC. [*Gymnosporangiaceae*]

sub: *Roestelia lacerata* Mérat, sur le *Crategus ruscionensis* Gren. et Blanc; 16 Jun. 1874, in foliis *Pyrus mali*; Parmae; Sept 1873; G. Passerini; sur les feuilles de l'*Amelanchier turgaris*; Vallon de St Pons de Gemenas; 1 Jul 1874; sur les feuilles de l'aubépine; à la campagne de M' Willems à Courtrai; ètè.

Gymnosporangium cornutum (Pers.) Arthur [*Gymnosporangiaceae*]

sub: *Roestelia cornuta* Fr.

sulle foglie del *Sorbus*; nelle selve al Lago Maggiore; Estate 1859; Franzoni, De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; ad folia *Sorbi aucupariae*; [...]; Aug. 1876; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae; sur les feuilles du *Sorbus aucuparia*; aux environs de Namur; M' l'Abbé Bellyneck; sub: *Ceratitium cornutum* Rbh. f. *aucupariae*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [*Gymnosporangiaceae*]

sub: *Roestelia cancellata* Rebent., in foliis *Pyri communi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); Austria inf.: Krems; 10. 1873; leg. Boller; Ex herb. de Thümen; ad folia; prope Florentiam; Oct. 1877; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae; ad folia *Pyri domesticate*.

Gymnosporangium sorbi (Arthur) F. Kern. [*Gymnosporangiaceae*]

sub: *Aecidium sorbi* Arthur, *Sorbi aucupariae*; Iglo (Ungaria); Aug 1878; Dick.

Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. [*Discinaceae*]

sub: *Helvella infula* Schaeff., pinete; nella valle del Serchio in Toscana; Autunno 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. [*Gyroporaceae*]

sub: *Boletus castaneus* Bull. f. *minor* Bres.; boschi; Castiglion dei Pepoli; Agosto 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Habrostictis elegans Rabenh. [*Orbiliaceae*]

Auf feuchtem Holze bei Salem (Baden); von Herrn Ap. Jack gesammelt; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hainesia rubi (Westend.) Sacc. [*Chaetomellaceae*]

sub: *Gloeosporium rubi* Westend., sur les feuilles du *Rubus corylifolius*; au bois de Mr Vandenpeereboom-Delacroix; à Courtrai; Novembre.

Halothia posidoniae (Durieu & Mont.) Kohlm. [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *A. posidoniae* De Not.; rizomi della *Kerneria oceanica*; alla spiaggia di Spotorno, Liguria occidentale; 1869; Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Sphaeria posidoniae* Durieu & Mont., sui rizomi della *Posidonia*; alla spiaggia di Livorno; 1861; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Haplocystis kickxii (Westend.) Voglmayr [*Sydowelliaceae*]

sub: *Hypoxylon kickxii* Westend, sur les branches et rameaux morts du *Platane orientai*; au parc de Saint George, à Courtrai.

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. [*Hymenogastraceae*]

sub: *Agaricus crustuliniformis* Bull.; nei castagneti della Polcevera, presso Genova; Settembre, Ottobre 1861; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Helicobasidium purpureum (Tul.) Pat. [*Helicobasidiaceae*]

sub: *Rhizoctonia violacea* Tul. f. *dauci* Kuhn.; Schwusen prope Gr. Glogan; 1858; Autunno; Kiihn.; Rabenhorst, Fungi europaei, sub: *Tubercularia persicina* Ditmar, Austria inferiore; 6. 1837; leg. Heufler.

Helminthosporium flexuosum Corda [*Massarinaceae*]

sub: *H. flexuosum* Corda f. *Phalaris*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Helminthosporium vesiculosum Thüm. [*Massarinaceae*]

Franconia: Bayreuth; Aug 1874; Ex herb. de Thümen.

Helotium grenseri Auersw. [*Tricladaceae*]

— Reichenberg, Bohemiae; legit Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei.

Helvella crispa (Scop.) Fr. [*Helvellaceae*]

nelle adiacenze di Serravalle Scrivia; Ottobre; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; nei dintorni di Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Helvella elastica Bull. [*Helvellaceae*]

sulla terra lavorata, ad una siepe di nocciuoli; presso Serravalle di Scrivia; Autunno 1858; Ferrari; sub: *Helvella klotzschiana* Corda, sulla terra; nell'Orto botanico di Pisa; Settembre 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Helvella ephippium Lév. [*Helvellaceae*]

bei der Seltenheit des Pilzes sind vielleicht auch die spärlichen, aber himsichtlich ihrer Grosse ganz normalen exemplare nich unwillkommen; G. U. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Helvella lacunosa Afzel [*Helvellaceae*]

nelle selve; dintorni di Locarno; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; in Laub wäldern in der Nähe der Bäume, auch an alten abgestorbenen Baumstocken ziemlich selten. Die meisten Exemplare sind leider noch sehr jung und klein. Vergeiftet; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *H. lacunosa* f. *minor* Fr.; sur la terre; dans les bois des environs de Mons; Mr Clem. Dumont; sous les liètres; France: Forest de Fontainebleau (Seine-et-Marne); Nov. 1885; Herbarium Feuilleaubois.

Helvella macropus (Pers.) P. Karst [*Helvellaceae*]

sub: *Peziza macropus* Pers., sur la terre; dans les bois des environs de Mons; Mr Clém. Dumont.

Hendersonia conorum Lacroix [*Phaeosphaeriaceae*]

ad squamas strobilinas Abietis excelsae; St. Romani ad Viginnam; leg. De Lacroix; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hendersonia graminicola Lév. [*Phaeosphaeriaceae*]

sur la [...] sèche du *Phragmites communis*; à [...]; 13 Août 1874.

Hendersonia holoschoeni (Mont.) Petr. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Ascospora holoschoeni* Cast.; sur les *Scirpus holoschoenus*; à Marignon; 13 août 1874.

Hendersonia mespili Westend. [*Phaeosphaeriaceae*]

sur les feuilles mortes du nêflier commun (*Mespilus germanica*); dans les jardins; le R. P. Clém. Dumont.

Hendersonia philadelphi Westend. [*Phaeosphaeriaceae*]

sur les branches et rameaux du *Philadelphus coronarius*; au jardin de Mine Van Landeghem-Anne, à Termonde.

Hendersonia pyricola Sacc. [*Phaeosphaeriaceae*]

ad folia viva *Pyri communis*; Collecchio prope Parmam; Sept. 1875; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hendersonia sarmentorum Westend. [*Phaeosphaeriaceae*]

ad sarmentia vitis; Sti Romani an Vigennam in agro pictav.; mense martio; leg. De Lacroix, pater; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les jeunes sarments de la vigne; dans les jardins; ainsi que sur ceux de la ronce dans les bois; Hiver.

Hercospora tiliae (Pers.) Tul. & C. Tul. [*Lamproconiaceae*]

sub: *Sphaeria tiliae* Pers., sur un tilleul more aux environs de Courtrai.

Heridium coralloides (Scop.) Pers. [*Hericiaceae*]

sub: *Hydnum coralloides* Scop.; ad truncos Fagi; in sylvis montosis, prope Salzburg; leg. Sauter; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II; sub: *Hydnum coralloides* Scop.; sur le tronc carié du hêtre; France: Foret de Fontainebleau (Seine-et-Marne); Septembre 1888; *Heridium alpestre* Pers.; sui tronchi di abete; sopra Riva in Valsesia; Estate 1858; Carestia.

Herpotrichia callimorpha (Auersw.) G. Winter [*Melanommataceae*]

sub: *Enchnoa callimorpha* Auersw., sub: *E. callimorpha* (Montagne) Awd.; ad sarmenta Ruborum; Wffidchen bei Leipzig; Aug. 1866; leg. Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei.

Herpotrichia pinetorum (Fuckel) G. Winter [*Melanommataceae*]

sub: *Lasiosphaeria scabra* (Curr.) Awd.; Sugenheim in Franconia; leg. Dr. Rehm; Rabenhorst, Fungi europaei.

Heterosphaeria patella (Tode) Grev. [*Heterosphaeriaceae*]

sub: *H. patella* Grev.; su steli secchi di *Molopospermum* sp.; all'alpe del Sasso in Valsassina, Como; Luglio 1864; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. patella* Grev.; su steli secchi di *Daucus carota*; nel greto della Baganza, a Vigheffio presso Parma; estate 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *H. patella* Grev.; steli secchi di ombrellifere; Vercelli; 1863; Cesati; sub: *Sphaeria patella* Pers., sur les tiges de l'*Anthirrhinum linaria*; au camp de Beverloo; par Mr Tosquinet, Medicin de bataillon au 2e de ligne.

Heterosphaeria plinthis Fr. [*Heterosphaeriaceae*]

in consortio *Hysterii scirpini*; ad culmos emortuos *Scirpi lacustris*; pr. Sonnewalde (Lus. inf.); leg. Kretschmar; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Heterosporicola chenopodii (Westend.) Crous [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Phyllosticta chenopodii* Thiim.; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Phyllosticta chenopodii* Westend.; à la face supérieure des feuilles du *Chenopodium viride* et *C. urbicum*; au camp de Beverloo.

Heyderia abietis (Fr.) Link [*Cenangiaceae*]

sub: *Mitrula abietis* Fr.; né boschi di abeti; a Collecchio, provincia di Parma; Dicembre 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Mitrula cucullata* b. *pini* Fr.; ad acus Pini; pr. Lipsiam; Novembr.; leg. Dr. Otto Delitsch.; Rabenhorst, Fungi Europaei.

Humaria carestiae (Ces. ex Cooke) Boud. [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza carestiae* Ces., su piante erbacee putrescenti sotto una balza in terreno torboso molto umido; al limite delle conifere nella Valdobbia; sopra Riva in Valsesia; luglio 1857; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sulla nuda terra; a Riva di Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza hemisphaeria* Wiggers.

Hyaloperonospora parasitica (Pers.) Constant. [*Peronosporaceae*]

sub: *Peronospora parasitica* de Bary f. *capsellae*; Franconia; Bayreuth; 6. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Hyalopeziza millepunctata (Lib.) Raitv. [*Hyaloscyphaceae*]

sub: *Peziza millepunctata* Lib., ad caules putrescentes *Senecionis fuchsii*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. 11 (1832).

Hydnellum concrescens (Pers.) Banker [*Bankeraceae*]

sub: *Hydnum zonatum* Batsch; pié dei castagni, né castagneti; Collecchio, provincia di Parma; Agosto 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Hydnum zonatum* Batsch; sur la terre dans les bois; aux environs de Mons; Mr Clem. Dumont.

Hydnellum ferrugineum (Fr.) P. Karst. [*Bankeraceae*]

sub: *Hydnum velutinum* Fr.; nelle pinete; Villa Elena a Pegli; Novembre 1859; Dufour; Erbario Crittogamico Italiano.

Hydnellum scrobiculatum (Fr.) P. Karst. [*Bankeraceae*]

sub: *Hydnum scrobiculatum* Fr., pineta dell'Olmately, presso Faenza; Dicembre 1863; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; in sylvis; prope [...] Liburno (Livorno), Toscana; Nov. 1874; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Hydnoporia tabacina (Sowerby) Spirin, Miettinen & K.H. Larss. [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Thelephora tabacina* Pers., ad ramos *Coryli* et *Pruni padi*; Aestate, Autunno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); sub: *Stereum tabacinum* Fr.; sur des branches et rameaux morts et presque décomposés; dans les bois des environs de Louette-Saint-Pierre; M' Gust. Aubert.

Hydnum repandum L. [*Hydnaceae*]

presso Oldenico, nel Vercellese; presso Serravalle di Scrivia.

Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. [*Hygrophoraceae*]

sub: *Hygrophorus coccineus* Fr.; nei boschi di castagni; lungo la Polcevera, sopra Genova; Ottobre 1865; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire [*Hygrophoropsidaceae*]

sub: *Cantharellus aurantiacus* Fr.; pinete; alla Polcevera sopra Genova; Ottobre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Hygrophorus fuscoalbus Fr. [*Hygrophoraceae*]

sub: *H. fusco-albus* Fr.; boschi d'abete; Ferlaro, presso Parma; Ottobre-Novembre 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Hygrophorus hypothejus Fr. [*Hygrophoraceae*]

nelle pinete; Collecchio, presso Parma; Novembre-Dicembre 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr. [*Hygrophoraceae*]

in graminosis lucorum; prope Wallendorf Scepusii (Hungar. superior.); Aug.-Sept.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Corticium velutinum* Fr.; on logs; Batheaston; March 1873; C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Thelephora cinnamomea* Pers.; ad ramos *Pruni padi* et *Coryli*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Hymenogaster olivaceus Vittad. [*Hymenogastraceae*]

sub: *H. decorus* Tul.; Batheaston; October 1869; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hymenogaster tener Berk. [*Hymenogastraceae*]

sub: *H. tener* Berk.; Batheaston near Bath; Oct. 1869; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) S. F. Gray [*Helotiaceae*]

sub: *Peziza fructigena* var. herbarum Westend.; sur les glandes du ch'ène pourrissants à terre; dans les bois des environs de Courtrai; la var. se trouve à la base des tiges mortes de la tanaise et de l'estragon, dans un jardin légumes a Courtrai.

Hymenoscyphus humuli (Lasch) Dennis [*Helotiaceae*]

sub: *Peziza humuli* Lasch, sui fusti antichi dell'*Humulus lupulus*; nei dintorni di Riva in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Hymenoscyphus infarciens (Ces.) Denni [*Helotiaceae*]

sub: *Peziza infarciens* Ces., sui rami e ramoscelli del *Cytisus alpinus*; a S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.
Peziza julacea Pers.; sugli amenti femminei dell'*Alnus glutinosa*; a Vercelli; Ottobre 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Hymenula equiseti Lib. [*Incertae Sedis*]

in equiseto limoso; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); in equiseto limoso; prope [...], Saxoniae; leg. Delpino; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hymenula rubella Fr. [*Incertae Sedis*]

ad folia exsiccata *Airae cespitosae* et *Junci effusi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); in vaginis *Typhae latifoliae*; in agro pictaviensi, St. Romani ad Vigenam; leg. De Lacroix, pater; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hymenula spartii Lasch [*Incertae Sedis*]

in ramulis emortuis *Spartii scoparii*; prope Driesen; Lasch; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Hymenula vulgaris Fr. [*Incertae Sedis*]

ad caules *Urticae dioicae* exsiccatos; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Hyphelia aurantiaca Lib. [*Incertae Sedis*]

in caldariis ad parietes calce inductos; Hieme; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss. [*Hyphodontiaceae*]

sub: *Odontia barba-jovis* (Bull.) Fr.; ad ramos quercus deciduos putrescentes; in sylva prope Sugenheim (Franconiae mediae); Oct 1866; leg. Dr. Rehm; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. [*Strophariaceae*]

sub: *Agaricus fascicularis* Huds.; sopra un legno putrido; presso Faenza; Nov. 1863; Caldesi; sub: *Agaricus fascicularis* Huds.; nei prati; nei dintorni di Voltri, nella Liguria occidentale; Autunno 1858; Baglietto.

Hypocrea luteovirens Fr. [*Hypocreaceae*]

[...]; Broome.

Hypoderma commune (Fr.) Duby [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium commune* Fr., in caulibus emortuis *Vincetoxici*; bei Botzen; leg. Hausmann; sur les sarments de l'*Humulus lupulus*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquin; sub: *Leptostroma vulgare* Fr., ad caules herbarum quam plurimarum; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. H (1832); in caulibus emortuis *Solidaginis virgaureae*; Riva di Valsesia, Piemonte; G. Carestia; Rabenhorst, *Fungi europaei*; sub: *L. vulgare* a *verbena* Rabenh.; sur les tiges mortes du *Verbena officinalis*; à Hansur-Lesse, Namur; Mr Crépin; sur *Eupatorium cannabinum*; aux environs de Mons; le R. P. Dumont.

Hypoderma hederæ (T. Nees ex Mart.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium hederæ* Mart.; sur les pétioles de la feuille du Lierre; à St. Pons; 1874; sub: *H. hederæ* Mart.; sur les feuilles mourantes du lierre; aux environs de Namur; Mr le Comte A. De Limminghe et J. Barbier; sub: *H. hederæ* Mart.; ad folia *Hederæ*; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830), sub: *Phoma hederæ* Desm., sur les tiges mortes du lierre (*Hedera helix*); sub: *Sphaeria hederæ* Moug., sur les feuilles mortes du Lierre (*Hedera helix*), *Ruscus*; Botzen; leg. Haussman.

Hypoderma rubi (Pers.) DC. [*Rhytismataceae*]

sub: *H. virgultorum* DC.; su sarmenti secchi di *Rubus caesius*; in Val Intrasca al Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. virgultorum vincetoxici* Duby; sugli steli secchi del *Cynanchum vincetoxicum*; in Val Intrasca al Lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *H. virgultorum* DC.; su sarmenti secchi di *Rubus fruticosus*; presso Bolzano nel Tirolo meridionale; 1869; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Hysterium rubi* Pers., ad ramos emortuos *Ruborum* et *Rosae caninae*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832); sur les sarments des ronces, dans les plantations du camp de Beverloo, ainsi qu'aux environs de Namur (M' l'Abbé Belynyck) et de Courtrai; sub: *Hysterium virgultorum* Westend. *H. virgultorum* f. *quercinum* Westend.; sur les pétioles des feuilles du chêne; dans les bois des environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Hypohelion scirpinum (DC.) P.R. Johnst [*Rhytismataceae*]

sub: *Hypoderma scirpinum* DC.; su steli marcescenti di *Scirpus lacustris*; all'estremità del Lago di Mergozzo al Lago Maggiore; Agosto 1864; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; sugli steli dello *Scirpus lacustris*; al laghetto di Seis nel Tirolo meridionale; 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; in culmis *Scirpi lacustris* emortuis; Dresdae; Junio 1855; L. Rabenhorst; sur les chaumes du *Scirpus lacustris*, souvent mêlé ou *Leptostroma scirpinum* Fr. a *L. scirpi* Rabenh.; aux environs de Louette-Saint-Pierre (M' Gust. Aubert.).

Hypomontagnella monticulosa (Mont.) Sir, L. Wendt & C. Lamb. [*Hypoxylaceae*]

sub: *Hypoxylon glomeratum* Cooke, sub: *H. glomeratum* Bull.; sur les branches mortes du hêtre, de l'aune, du coudrier, etc.

Hypomyces chrysospermus Tul. & C. Tul. [*Hypocreaceae*]

sub: *Sepedonium mycophilum* (Pers.) Link, recouvre entièrement les boletes dans nos bois.

Hypomyces lateritius (Fr.) Tul. & C. Tul. [*Hypocreaceae*]

sub: *Hypocrea lateritia* Fr., in pinetis ad *Lactarium deliciosum*; Sti Romani ad Vigennam in agro pivctaviens; legebat mense Octobri 1860; T. de Lacroix Pter.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hyponectria buxi (Alb. & Schwein.) Sacc. [*Hyponectriaceae*]

sub: *Sphaeria buxi* Desm., croît sur les feuilles mortes du buis.

Hypospilina pustula (Pers.) M. Monod [*Valsaceae*]

sub: *Sphaeria pustula* Pers., sur les branches mortes de l' *Acer pseudoplatanus*; à Louette-St.-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Hypoxylon cinnabarinum (Henn.) Henn. [*Hypoxylaceae*]

sur des troncs morts du frêne; dans la cour de l'infermerie militaire de Menin.

Hypoxylon fragiforme (Scop.) J. Kickx f. [*Hypoxylaceae*]

sub: *H. coccineum* Kx.; le long du chemin de fer de Courtrai, à Mouscron; sub: *H. coccineum* Kx.; sur les racines de terrées et mortes du frêne, dans la cour de l'infermerie militaire de Menin; sub: *H. coccineum* Bull.; su legno di faggio accatatasto; presso Cannero al Lago Maggiore; Autunno 1865; Gibelli, Erbario Crittogamico Italiano; sur des vieux troncs de hêtre; aux environs de Mons; M' l'Abbé Michot.

Hypoxylon fraxinophilum Pouzar [*Hypoxylaceae*]

sub: *H. argillaceum* Kx.; sur le tronc d'un charme mori; hors la porte de Lille, à Courtrai; sub: *H. argillaceum* Kx.; sur des jeunes troncs de charme morts; au parc de Saint-George, à Courtrai; Janvier; sub: *H. argillaceum* Fr.; sul frassino; in Valle Fregère, presso Locarno, Cantone Ticino; 1864; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. [*Hypoxylaceae*]

sub: *H. fuscum* Fr.; su pali secchi di ontano; presso Serravalle alla Scrivia; Autunno 1858; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. fuscum* Fr.; [...]; Haussman.

Hypoxylon irregulare Cooke [*Hypoxylaceae*]

sub: *H. irregulare* Westend. et Vh.; sur les branches mortes du *Robinia pseudoacacia*; dans le jardin de Mme Veuve Pycke; à Courtrai.

Hysterium aquilinum Schumach. [*Hysteriaceae*]

Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Hysterium pulicare Pers. [*Hysteriaceae*]

sulla corteccia dei pioppi; nei dintorni di Locarno; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; ad *Quercus corticum*; Zürich, Helvetiae; per totum anno; leg. G. Winter; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae; ad corticem et ligna *Quercus*; per annum; sub: *Hysterographium acerinum* Westend., sur l'écorce d'un *Acer*; au parc de Saint George à Courtrai.

Hysterium rugosum Fr. [*Hysteriaceae*]

sub: *H. rugosum* Fr. var. *faginea* Fr.; sur les troncs du hêtre dans les bois; sub: *H. rugosum* Fr. var. *quercinum* Fr.; sur les jeunes troncs et les branches du chêne dans les bois.

Hysterographium conigenum Moug. & Nestl. ex P. Karst. [*Incertae Sedis*]

sur les squames des cônes du *Pinus sylvestris*; dans les plantations du camp de Beverloo.

Hysterographium eupatorii Lasch [*Incertae Sedis*]

in caulis emortuis *Eupatorium*; prope Dresdam; G. Lasch; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hysterographium fraxini (Pers.) De Not. [*Incertae Sedis*]

sub: *Hysterium fraxini* Pers., sur les rameaux secs; S. Pons; 31 Août 1874; sur les branches mortes du frêne; aux environs de Tournay et de Courtrai; sub: *H. fraxini* De Not.; sui rami secchi del frassino; Arcego presso Locarno; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Hysterographium grammodes (De Not.) Sacc. [*Incertae Sedis*]

sub: *Hysterium grammodes* De Not., sul legno scortecciato e secco dei tronchi d'olivo; a Monte Rinaldi presso Firenze; Marzo 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; in ligno denudato *Oleae europaea*; in collibus; Felino prope Parmam; Majo 1873; G. Passserini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hysteronaevia holoschoeni (De Not.) Nannf. [*Incertae Sedis*]

sub: *Propolis holoschoeni* De Not., sui culmi secchi di *Scirpus holoschoenus*; nell'alveo del torrente Baganza presso Parma; Autunno 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Hysteropatella prostii (Duby) Rehm [*Hysteriaceae*]

sub: *Hysterium prostii* Duby, 6.5.1865; Ex herb. de Thümen; ad faciem interiore corticis soluti *Pyri mali*; Nigheffio prope Parmam; leg. G. Passerini, Rabenhorst, Fungi europaei.

Hysteropezizella pusilla (Lib.) Nannf. [*Incertae Sedis*]

sub: *Phacidium pusillum* Lib., ad ramos siccos nigrefactos *Rubi fruticosi*; autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Hysteropezizella subvelata (Rehm) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Micropeziza subvelata* Rehm, ad *Caricis curvulae* All. folia sicca; in Monte "Cresta Mora" ad "Albula-Pass", Rhaetiae; non raro; alt. ca. 2500 meter; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 184.

Hysterostegiella lauri (Caldesi) B. Hein [*Incertae Sedis*]

sub: *Naevia lauri* Caldesi, sulle foglie secche dell'alloro; nel giardino di Boboli a Firenze; autunno 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie secche di alloro a Boboli; giugno 1862;

Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; in foliis *Lauri* dejecti; Florentiae; legit Caldesi; Rabenhorst, Fungi europaei.

Hysterostegiella valvata (Mont.) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Stictis valvata* Mont., sur les feuilles sèches de l'*Ammophila arundinacea* Host. (*Arundo arenaria* L.) dans nos dunes. Nouvelle pour la Flore belge.

Illosporium coccineum Fr. [*Incertae Sedis*]

in *Lichenibus arboreis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Illosporium fagineum Lib. [*Incertae Sedis*]

inter folia putrescentia *Fagi sylvaticae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Illosporium puniceum Lib. [*Incertae Sedis*]

in muscis; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Illosporium roseum Mart. [*Incertae Sedis*]

sub: *Illosporium carneum* Fr., ad Olaszinum Scepusii; Junio 1860; leg. Kalchbrenner; Rabenhorst, Fungi europaei; in *Peltigera carnea*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *I. roseum* Fr.; in *Lichenibus arboreis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Incrupila aspidii (Lib.) Raitv. [*Hyaloscyphaceae*]

sub: *Peziza aspidii* Lib., sulle fronde marcite dell'*Aspidium filix-mas*; nei monti dell' Oropa, provincia di Biella in Piemonte; Agosto 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; ad folia *Aspidii aculeati*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Inocutis rheades (Pers.) Fiasson & Niemelä [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Inonotus rheades* (Pers.) Bondartsev & Singer, sub: *Polyporus fulvus* Scop.; [...]; Heufler.

Inocybe auricoma (Batsch) Sacc. [*Inocybaceae*]

sub: *Agaricus auricomus* Batsch.; boschi di pino; Collecchio, provincia di Parma; Novembre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Inocybe fuscidula Velen. [*Inocybaceae*]

sub: *Inocybe virgatula* Kiihner, castagneti; presso Voltri, Liguria occidentale; Settembre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Inocybe geophylla P. Kumm. [*Inocybaceae*]

sub: *Agaricus geophyllus* Fr.; boschi di pini, tra le foglie; a Collecchio, presso Parma; Ottobre 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Polyporus hispidus* Fr.; Wlittenberg; Hohenack. Arzn. U. Handelspfl. n° 849; Fungi discophori-Cryptogamia fungi; sub: *Polyporus hispidus* Fr.; sul tronco dei gelsi; ad Oldenico, presso Vercelli; Autunno 1857; Malinverni.

Isariopsis pusilla Fresen. [*Mycosphaerellaceae*]

Leipzig; im Januar 1878; Dr B. Frank; Rabenhorst, Fungi europaei; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen.

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. [*Ischnodermataceae*]

sub: *Polyporus resinosus* Fr.; Bohemia: Ossegg; 7. 1873; Ex herb. de Thümen.

Isothea rhytismoides Fr. [*Phyllachoraceae*]

sub: *Sphaerella rhytismoides* (Fr.) De Not., sulle foglie della *Dryas octopetala*; nelle Alpi di Riva e di Alagna; 1869; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. H.

Jackrogersella cohaerens (Pers.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler [*Hypoxylaceae*]

sub: *Hypoxylon cohaerens* Westend.; sur des branches de hêtre; aux environs d'Ypres.

Jackrogersella multiformis (Fr.) L. Wendt, Kuhnert & M. Stadler [*Hypoxylaceae*]

sub: *Hypoxylon multiforme* Westend.; sur un tronc coupé et carié de bouleau blanc; à Cipy, près de Mons; Mr Michot.

Juglanconis juglandina (Kunze) Voglmayr & Jaklitsch [*Juglanconidaceae*]

sub: *M. juglandinum* Rabenh.; sur l'écorce du tronc et des branches d'un noyer more dans un jardin à Mons; le R. P. Dumont.

Kabatia periclymeni (Desm.) M. Morelet [*Dothioraceae*]

sub: *Leptothyrium pictum* Berk. & Br.; ad *Lonicerae xylostei* L. folia viva; in valle "Sagitobel" prope Ztirich (Helvetiae); October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 191; sub: *Leptothyrium pictum* Berk. & Br.; ad *Lonicerae coeruleae* L. folia viva; "Crestamora" ad "Albula-Pass", Rhaetiae; Altitud. ca. 2500 m; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 178.

Kalmusia passerinii Rabenh. [*Didymosphaeriaceae*]

in lignis vetustis *Quercus*; Parmae in suburbio; leg. G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Labrella potentillae Fuckel [*Incertae Sedis*]

An welken B15.ttem und Stengeln von *Potentilla argentea*; an den Bergen zwisdhen dem Bahnhof und Teutschenthal und Langenbogen (prov. Sachsen); den 14 Juni 1873; leg. Johannes Kunze; Rabenhorst, Fungi europaei; Bohemia: [...]; 5. 1873; Ex herb. de Thümen.

Laccaria laccata (Scop.) Cooke [*Hydnangiaceae*]

sub: *Agaricus laccatus* Fr.; nelle selve frondose; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Autunno; Hausmann; Erbario Crittogamico

Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.) Fr. [*Niaceae*]

sub: *Peziza alboviolascens* Alb. & Schwein., ad ramos exsiccatos supra corticem arborum fructicumque; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Lachnella villosa (Pers.) Donk [*Niaceae*] *Peziza villosa* Pers.

sur les tiges mortes du *Serratula arvensis*; dans les endroits cultivées du camp de Beverloo; nouvelle pour notre Flore.

Lachnellula pulverulenta (Lib.) Sasagawa & Hosoya [*Lachnaceae*]

sub: *Helotium pulverulentum* (Lib.) Awd., Arnstadiæ; leg. Fleischhack; Rabenhorst, Fungi europæi;

sub: *Peziza pulverulenta* Lib., ad folia dejecta *Pini silvestris*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamæ Arduennæ, fasc. H (1832).

Lachnum bicolor (Bull.) P. Karst. [*Lachnaceae*]

sub: *Peziza bicolor* Bull., sur les rameaux morts et tombés a terre du chêne, du noisetier (*Corylus avellana*) et de l'Aube-épine (*Crataegus oxyacantha*); sugli steli dei rovi; a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Agosto 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Lachnum corticale (Pers.) Nannf. [*Lachnaceae*]

sub: *Lachnella corticalis* Pers.; ad *Populi tremulæ* L. corticem; in monte "Zürich berg" prope Zürich (Helvetiæ); frequens; October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 162.

Lachnum fuscescens (Pers.) P. Karst. [*Lachnaceae*]

sub: *Lachnella fuscescens* De Not., su steli secchi di *Phytolacca*; presso Locarno al Lago Maggiore; 1863; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Lachnum nudipes (Fuckel) Nannf. [*Lachnaceae*]

sub: *Peziza nudipes* Fuckel, ad *Spirææ ulmariae* L. caules putridos; "Sihlwald" prope Zürich (Helvetiæ); raro; Juli 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 170.

Lachnum patulum (Pers.) Rehm [*Lachnaceae*]

sub: *Peziza patula* Pers., ad folia dejecta quercina; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamæ Arduennæ, fasc. III (1834); sur les feuilles mortes du chêne; rare seulement à cause de sa petitesse.

Lactarius controversus Pers. [*Russulaceae*]

prope Hereford (England); October 1871; leg. Dr Brell; Rabenhorst, Fungi europæi.

Lactarius deliciosus (L.) Gray [*Russulaceae*]

sub: *Agaricus deliciosus* L.; Faventia; leg. Caldesi.

Lactarius fuliginosus (Fr.) Fr. [*Russulaceae*]

nei boschi di castagno; presso Voltri; Settembre-Ottobre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Lactarius stephensii (Berk.) Verbeken & Walleyne [*Russulaceae*]

sub: *Octaviania stephensi* Tul.; Leighwood, Bristol; Oct. 1869; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europæi.

Lactarius subdulcis (Pers.) Gray [*Russulaceae*]

sub: *L. subdulcis* (L.) Fr.; in pratis, sylvis; prope Dresdam.

Lactarius violascens (J. Otto) Fr. [*Russulaceae*]

sub: *L. violascens* Fr.; né castagneti; Polcevera presso Torrassa sopra Genova; Erbario Crittogamico Italiano.

Lactifluus piperatus (L.) Roussel [*Russulaceae*]

sub: *Lactarius piperatus* Fr.; nelle selve dei colli; lungo la Polcevera, presso Genova; Giugno 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Lactifluus volemus (Fr.) Kuntze [*Russulaceae*]

Sub: *Lactarius volemus* Fr., nelle selve e pinete; nei colli presso Genova; Giugno 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Laeticutis cristata (Schaeff.) Audet. [*Incertae Sedis*]

sub: *Albatrellus cristatus* (Schaeff.) Kotl. & Pouzar, nei faggeti; Camaldoli (Toscana); Oct 1866; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polyporus cristatus* (Pers.) Fr., né faggeti; a Camaldoli, nel Casentino, Toscana; Ottobre 1866; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano.

Laetinaevia adonis (Fuckel) Nannf. [*Caloriaceae*]

sub: *Naevia adonis* Fuckel, ad folia caulisque aridos *Adonis vernalis*; in collibus prope Gerbstaedt (Sax. bor.); Junio 1873; leg. Zopf; Rabenhorst, Fungi europaei.

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill [*Laetiporaceae*]

sub: *Polyporus sulphureum* Fr.; sul tronco delle robinie; nei dintorni di Vercelli; estate 1858; Cesati; sub: *Polyporus sulphureum* Fr.; sul tronco di un ciliegio; Riva in Valsesia; 1869; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Polyporus sulphureum* Fr.; Glagenitz (Austria inf.); leg. Heufler.

Lasiobelonium nidulus (J.C. Schmidt & Kunze) Spooner [*Solenopeziaceae*]

sub: *Peziza nidulus* J. C. Schmidt & Kunze, in caulibus siccis *Convallariae multiflorae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les tiges mortes du *Convallaria multiflora*; aux environs de Namur (M' l'Abbé Belynck) et dans les bois des environs de Courtrai.

Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc. [*Ascodesmidaceae*]

sub: *Ascophanus pilosus* Boud., ad stercum vaccinum; in monte "Cresta mora" ad "Albula-Pass", Rhaetiae; frequens; altitud. ca. 2400 met.; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 164.

Lasiobotrys lonicerae (Fr.) Kunze [*Venturiaceae*]

sub: *L. lonicerae* Kunze & Schmidt; ad *Lonicerae coeruleae* L. folia viva; prope St. Moriz, Ober-Engadin (Rhaetiae); raro; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 173; sulle foglie della *Lonicera coerulea*; al Moncenizio, 1857, Cesati e Malinverni; sub: *L. lonicerae* Kunze & Schmidt; Haussmann.

Lasiosphaeria racodium (Pers.) Ces. & De Not. [*Lasiosphaeriaceae*]

sub: *Hyphasma racodium* Westend., sur des branches mortes et tombées a terre; dans les bois de Zillebecke et de Wyttschaete, près d'Ypres.

Leccinum scabrum (Bull.) Gray [*Boletaceae*]

sub: *Boletus scaber* Bull., [...]; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Lembosia juncinum (Lib.) Höhn. [*Asterinaceae*]

sub: *Aulographum juncinum* Lib., ad culmos exsiccatos *Junci conglomerati*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Lembosia luzulae (Lib.) Höhn. [*Asterinaceae*]

sub: *Aulographum luzulae* (Lib.) De Not., ad folia sicca *Luzulae maximae*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Lenzites abietina (Bull.) Fr. [*Gloeophyllaceae*]

sub: *L. abietina* Fr.; in cella umida; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Lenzites albus Beeli [*Gloeophyllaceae*]

sub: *L. alba* Fr.; in *Fagi sylvaticae* L. trunco putrido; Gallia: Toulouse; Jan 1882; leg. Angéle Roumeguere; de Thümen, Mycotheca universalis.

Lenzites betulinus (L.) Fr. [*Gloeophyllaceae*]

sub: *L. betulina* Fr.; su ceppi morti di quercia; a Parma; Autunno 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. flaccida* Fr.; su tappi di faggio fluitati; a Torchiara, nel Parmigiano; Autunno 18,63; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. betulina* Fr.; ad truncos *Betulae*; Dresdae; L. Rabenhorst; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II; sub: *L. betulina* Fr.; ad trabes; prope Altopascio, Florentiam inter at Luccam; 2 Nov. 1875; legit J. Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Lenzites sepiarius (Wulfen) Fr. [*Gloeophyllaceae*]

sub: *L. sepiaria* Fr.; sugli abeti; a Camaldoli, nel Casentino in Toscana; Ottobre 1866; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. hirsuta*; in trunculus marcescentibus *Cupressus sempervirens*; ad Therifore; Dr A. Baldacci; A. Baldacci, Iter Creticum 1893; sub: *L. sepiaria* Fr.; in *Picea vulgaris* Lk. truncis; Saxoniam: KiThigstein; Sept. 1882; leg. W. Krieger; de Thümen, Mycotheca universalis.

Leotia lubrica (Scop.) Pers. [*Leotiaceae*]

sub: *L. lubrica* Pers.; pineta di S. Rossore, presso Pisa; Ottobre 1862; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. lubrica* Pers.; ad terram; Buchwald-Niederbronn im Elsass; leg. Hofmann; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *L. lubrica* Pers.; sur la terre; dans le bois des environs de Namur (M' 1' Abbé Bellyneck), d'Ypres, de Courtrai et de Bruges.

Lepiota cristata (Bolton) P. Kumm. [*Agaricaceae*]

sub: *Agaricus cristatus* Bolt.; in cultis; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria doliolum* Pers. f. *conoidea* De Not.; sui fusti secchi della *Phytolacca decandra*; nella valletta della Ramogna a Locarno, Lago Maggiore; Ottobre 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Leptosphaeria haematites (Roberge ex Desm.) Niessl [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria haematites* Rob.; sur les rameaux morts du *Clematis vitalba*; à Namur; Mr Bellyneck.

Leptosphaeria maculans Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria maculans* Desm., sur les vieux pieds du colza (*Brassica campestris*); aux environs de Louvain; d' ou le Rèv. Père Leburton, a eu l'obligeance de nous l'envoyer; Hiver.

Leptotrochila cerastiorum (Wallr. ex Fr.) Schüepp [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Peziza cerastiorum* Wallr., sui *Cerastium* in deperimento; nel Locarnese; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; in foliis vivis *Cerastiorum*; Autumno; Belgio; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les feuilles languissantes du *Cerastium vulgare*.

Leucocoprinus straminellus (Bagl.) Narducci & Caroti [*Agaricaceae*]

sub: *Agaricus straminellus* Bagl.; nei letti caldi e nei vasi di serra calda; all'Orto botanico di Genova; Giugno 1865; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Lepista nuda (Bull.) Cooke [*Incertae Sedis*]

sub: *Agaricus nudus* Bull.; nel boschetto di conifere; nella pubblica passeggiata di Genova; Giugno 1862; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Leptomitius lacteus (Roth) C. Agardh [*Leptomitaceae*]

sub: *Leptomitius lacteus* Ag.; Vire (France); sub: *Leptomitius libertiae* Agardh, ad fontinalem et folia graminum in rivalis; aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Leptopeltis litigiosa (Desm.) L. Holm & K. Holm [*Leptopeltidaceae*]

Sub: *Leptostroma litigiosum* Desm., sur les stipes morts du *Pteris aquilina*.

Leptosphaeria acuta (Fuckel) P. Karst. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria acuta* Moug., a la base des tiges mortes de l'ortie dioïque; au printemps; sub: *Sphaeria coniformis* Fr., ortie dioïque.

Leptosphaeria albopunctata (Westend.) Sacc. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria albopunctata* Westend., sur les gaines des chaumes de l'*Arundo phragmites*; aux environs de Courtrai.

Leptosphaeria artemisiae (Fuckel) Auersw. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. artemisiae* Auersw. f. *stylosporifera*; in caulibus emortuis Artemisiae; Stralsund; leg. E. Fischer; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria avenaria G.F. Weber [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Leptosphaeria tritici* Passerini; ad folia straminis *Triticis eretti*; in campis ad Vigheffio, prope Parmam; Aug. 1876; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria brachypodii Pass. [*Leptosphaeriaceae*]

ad *Brachypodii selvatici* Rom. et Sch.; folia languida; in monte "Zürich berg" prope Zürich (Helvetiae); frequens; October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 178.

Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. doliolum* Ces. & De Not. f. *Dipsaci pilosi*; Saxonia, Eisleban; leg. Kunze; Ex herb. de Thümen.

Leptosphaeria errabunda (Desm.) Gruyter, Aveskamp & Verkley [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *Phoma errabunda* Desm., sur les tiges mortes du *Verbascum thapsus* et *V nigrum*; dans le jardin de W Samray, pharmacien, à Namur; Mr J. Barbier.

Leptosphaeria eustoma (Fr.) Sacc. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. eustoma* Fuckel; in foliis aridis *Phragmites australis*; Parma; G, Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria helminthospora (Ces.) De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

au trockenan, vorPhrigen Stenglen von *Artemisia campestris*; bei Demmin; im Jun-Aug; 1876; leg. E. Fischer; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria millefolii (Fuckel) Niessl [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. millefolii* Fuck.; in caulibus siccis *Achilleae millefolii*; pr. Briinn; Junio; G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria modesta (Desm.) P. Karst. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. modesta* Auersw. & Delit.; steli secchi di *Scabiosa columbaria*; lungo la Boganza a Vigheffio, presso Parma; Estate 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Leptosphaeria ogilviensis (Berk. & Broome) Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. ogilviensis* Berk. & Br.; ad *Stenactidis bellidiflorae* Braun caules aridos; "Oerlikon" prope Zürich (Helvetiae); frequens; Juni 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi helvetici no. 180.

Leptosphaeria planiuscula (Riess) Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

in *Solidaginis virgaureae* caulis emortuis; Dresdae; leg. P. Rabenhorst Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria pleosporioides Auersw. [*Leptosphaeriaceae*]

auf *Clematis vitalba*; Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria rousseliana (Desm.) Ces. & De Not. [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. rousselliana* Ces. & De Not.; ad *Phleum boehmeri*; bei Brtinn; Mai; G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptosphaeria suffulta (Nees) Niessl [*Leptosphaeriaceae*]

sub: *L. suffulta* Nees; in caulibus siccis *Melampyri pratensis*; prope Graz; Aestate; G. de Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *L. suffulta* Ces. & De Not. f. *Melampyri cristati*; Bohemia; Teplitz; leg. Kirchner; Ex herb. de Thümen.

Leptosphaeria umbrosa Niessl [*Leptosphaeriaceae*]

G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Leptospora rubella (Pers.) Rabenh. [*Incertae Sedis*]

sub: *Sphaeria rubella* Pers., sur les tiges mortes de la pomme de terrés; aux environs de Bruges.

Leptostroma luzulae Lib. [*Rhytismataceae*]

in foliis *Luzulae maximae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sur les feuilles mourantes du *Luzula maxima*; aux environs de Nassogne, Luxembourg; Mr Crépin.

Leptostroma pteridis Ehrenb. [*Rhytismataceae*]

sur les tiges sèches du *Pteris aquilina*; dans les terrains sablonneux.

Leptostromella hysterioides (Fr.) Sacc. [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptostroma hysterioides* Fr., *Veratrum album*; 8. 1837; leg. Heufler; ad caules herbarum; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Leptostromella juncina (Fr.) Sacc. [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptostroma juncinum* Fr., ad culmos exsiccatos *Junci effusi* et *J. conglomerati*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); Bohemia: Osseg; 5. 1872; Ex herb. de Thümen; in *Junco*; Driesen; leg. Lasch; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les chaumes du *Juncus conglomeratus*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Leptostromella maculans (Lib.) Verpl. & R. Broecke [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptostroma maculans* Lib., in cunhis *Secalis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Leptothyrium alneum (Pers. ex Lév.) Sacc. [*Incertae Sedis*]

sub: *Melasmia alnea* Lév., Austria inf: Krems; 9. 1870; Ex herb. de Thümen.

Leptotrochila lugubris (De Not.) Schüepp [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Peziza lugubris* De Not., ai nodi degli steli dell'*Euphorbia officinalis*; presso Riva in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Leptotrochila ranunculi (Fr.) Schüepp [*Depranopezizaceae*]

sub: *Phacidium ranunculi* Lib., croit sur les feuilles de la *Renoncule acre et rampante*; le long du chemin de fer de Courtrai à Heule; in foliis languescensibus *Ranunculi acris*; sero autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat. [*Agaricaceae*]

sub: *Agaricus cepaestipes* Sow.; in cultis; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Sclerotium mycetospora* Nees; in cortice coriario sub dio coacervato; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Leucostoma translucens (De Not.) Höhn. [*Valsaceae*]

sub: *Sphaeria translucens* De Not., sui ramellini del salice piangente; a Bellaria nel territorio di Lugo; Marzo 1861; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Leucotelium cerasi (Castagne) Tranzschel [*Uropyxidaceae*]

sub: *P. cerasi* Corda; sulle foglie del *Prunus padus* scosse al suolo; a Biella in Piemonte; Novembre 1858; Cesati.

Libertella acerina Westend. [*Diatrypaceae*]

sur l'écorce d'un *Acer* mort; dans un jardin à Louvain; Mr l'Abbé Leburton.

Libertella alba Lib. [*Diatrypaceae*]

sub: *L. alba* Lib.; in cortice *Alni glutinosae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *L. alba* Lib.; sur l'écorce de l'aulne; aux environs d'Audenarde; M' Tosquinet. sub: *L. alba* Lib.; sur les branches mortes de l' *Alnus glutinosus*; au bois de Mr Vandenpeereboom-Delacroix; à Courtrai.

Libertella punicea Hoffm. ex Rabenh. [*Diatrypaceae*]

in quercibus americanis horti botanci; Giepen: Saxiae sup.; Hoffmann; Rabenhorst, Fungi europaei.

Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys [*Erysiphaceae*]

sub: *Agaricus umbelliferus* L.; su terriccio subtorboso; in Renco in Val Intrasca al Lago Maggiore; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Linodochium hyalinum (Lib.) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Dacrymyces hyalinus* Lib., ad folia exsiccata *Pini sylvestris*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Linospora ceuthocarpa (Fr.) Lind. [*Gnomoniaceae*]

sub: *L. populina* Pers.; auf alten Blättern von *Populus tremula* L.; Ottersdorfer Wald bei Rastatt in Baden; ende Aprii und Anfang Mai 1878; Dr. Schröter; sub: *Hypospila populina* (Pers.) Fr.; ad folia *Populi tremulae*; Lipsiae; Vere; 1857; Auerswald; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II; sub: *Sphaeria ceuthocarpa* Fr., sur les feuilles de plusieurs espèces de peupliers; Hiver.

Linospora saligna (Ehrh. ex Pers.) Traverso [*Gnomoniaceae*]

sub: *Dothidea saligna* Kx., sur les feuilles mourantes du saule marceau; communiqué par le Rév. Père Leburton; environs de Louvain; Hiver; sub: *Sphaeria capreae* DC., in foliis emortuis *Salicum*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Lirula macrospora (R. Hartig) Darker [*Rhytismataceae*]

sub: *Hypoderma macrospora* R. Hartig, Bohemia; Niickenberg; Jun 1873; Ex herb. de Thümen.

Lirula nervisequa (DC.) Darker [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium nervisequum* Fr.; in foliis *Pini piceae*; prope Giessen; Mart et April 1757; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Lizonia emperigonia (Ces. & De Not.) De Not. [*Lizoniaceae*]

sub: *Cucurbitaria emperigonia* Ces. & De Not.; fra le foglie periantriche dei maggiori *Polytrichum*; all'Oropa, provincia di Biella; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Lophodermium caricinum (Roberge ex Desm.) Duby [*Rhytismataceae*]

sub: *Leptostroma cariam* Fr. var. *eriophosi*; ad folia culmosque *Eriophisi*; prope Driescu; G. Lasch; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Lophodermium punctiforme (Fr.) Fuckel [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium punctiforme* Fr., in petiolis nerviseque foliorum *Quercus*; Boeckhorst prope Lochem; Vere; leg. Dr. Th. Sprée; Rabenhorst, Fungi europaei; in petiolis foliorum *Quercus*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Lophiostoma appendiculatum Niessl. [*Lophiostomataceae*]

Au diirren Stengeln von *Oenothera biennis*, aber nur an solchen, die bereits ffinger als einen Winter gelegen hatten, in Gesellschaft von *Schizoxylum (Stictis) berkeleyanum*, bei Westend unweit Charlottenburg; Juli 1874; leg. Zopf; Rabenhorst, Fungi europaei.

Lophiostoma macrostomum (Tode) Ces. & De Not. [*Lophiostomataceae*]

sub: *Lophiostoma praemorsum* Awd.; ad caules *Rubi idaei*; Lipsiae; leg. Auerswald; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Sphaeria macrostoma* Tode, sur l'écorce des *Acer*; au parc de Saint-George, à Courtrai; sur l'écorce d'un *Acer*; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Lophiostoma semiliberum (Desm.) Ces. & De Not. [*Lophiostomataceae*]

sub: *L. semilibera* Sctim.; sui culmi disseccati di *Molinia coerulea*; nell'alveo della Baganza, a S. Ruffino presso Parma; Autunno 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Lophodermium apiculatum (Wormsk. ex Fr.) Duby [*Rhytismataceae*]

a la base des chaumes des graminees dessechees; dans les bois; ad folia graminum; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); alla base dei culmi e sulle guaine della *Molinia coerulea* disseccata; nelle pasture di Val Intrasca; Aprile 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico

Italiano; sub: *Hysterium apiculatum* Fr.; in foliis siccis *Arundinis* epigei; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830); in culmis *Moliniae*; pr. Dresdam; L. Rabenhorst; Rabenhorst, *Herb. mycologicum* ed.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium arundinaceum* Schrad., sur les chaumes de l'*Arundo phragmites*; dans les bois de Zillebeke près d'Ypres; assez rare; sub: *L. arundinaceum* Chev.; sulle guaine della *Phragmites communis*; a Bolzano nel Tirolo meridionale; 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *L. arundinaceum* Duby.; sulle stoppie; nelle colline di Langhirano, provincia di Parma; Aprile 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Lophodermium culmigenum (Fr.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *H. culmigenum* f. *abbreviatum* Rob.; sur les veuilles feuilles de l'*Arundo arenaria*; dans les dunes d'Ostende.

Lophodermium foliicola (Fr.) P.F. Cannon & Minter [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium foliicolum* Fr., ad folia sicca *Crataegi oxyacanthae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*; sub: *H. foliicolum* Fr.; sur les feuilles mortes de l'aubépine (*Crataegus oxyacantha*); à Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *L. xylomoides* Chev.; sulle foglie sternate del *Sorbus aucuparia*; a Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. xylomoides* Chev.; sulle foglie del *Berberis vulgaris*; in Pustaria nel Tirolo meridionale; 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Lophodermium gramineum (Fr.) Chevall. [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium gramineum* Pers., sur les chaumes des *Poa*; aux environs de Namur (Mr J. Barbier et le Comte Alf. De Limminghe).

Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium juniperinum* Grev.; sur les feuilles mortes de la sabine (*Juniperus sabina*); à la campagne de Mr Willems près de Courtrai.

Lophodermium lauri (Fr.) Rehm [*Rhytismataceae*]

sub: *Hypoderma lauri* Duby; in foliis dejecti *Lauri*; a Boboli in Firenze, Italiae; leg. Caldesi; Rabenhorst, *Fungi europaei*; sub: *H. lauri* Duby; sulle foglie secche dell'alloro; a Boboli, Firenze; 1868; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; in lauretis; Fiume; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Hysterium lauri* Fr., sulle foglie secche del *Laurus nobilis*; nel giardino di Boboli a Firenze; Marzo 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Lophodermium laricinum Duby [*Rhytismataceae*]

ad folia sicca decolorata *Laricis*; prope Courmayeur, ad radices australes Mont-Blanc; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Lophodermium maculare (Fr.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium maculare* Fr., sd folia sicca *Vaccini uliginosi*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Lophodermium melaleucum (Fr.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium melaleucum* Fr., in foliis emortuis *Vaccini vitis-idaeae*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832); sur les feuilles et rameaux secs du *Vaccinium vitis-idaea*; aux environs des baraques de Fraiture-Luxembourg; Mr Crépin.

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. [*Rhytismataceae*]

sur les feuilles mortes et tombées à terre du pin maritime et commun (*Pinus maritimus* et *P. sylvestris*); sub: *Hysterium pinastri* f. *major* Westend.; sur les feuilles du *Pinus maritima*; dans le Campine; sub: *H. pinastri* f. *minor* Westend.; sur les feuilles du *Pinus cembra*; dans le aprc du palais au camp de Beverloo; sur les feuilles mortes et tombées à terre du pin maritime et commun (*Pinus maritimus* et *P. sylvestris*); sub: *H. pinastri* f. *major* Westend.; sur les feuilles du *Pinus maritima*; dans le Campine; sub: *H. pinastri* f. *minor* Westend.; sur les feuilles du *Pinus cembra*; dans le aprc du palais au camp de Beverloo; sulle foglie sternate di *Pinus cembra*; presso Riva in Valsesia; 1860; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; su foglie sternate di pino; in Valtellina; 1869; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *L. pinastri* Chev. f. *Pini sylvestris*; Bohemia: Teplitz; 6. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *L. pinastri* Chev. f. *piceae*; Bohemia: Teplitz; 5. 1873; sub: *Lophiostoma pinastri* Niessl, in palis quercinis; Parmae; Majo; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Lophodermium seriatum (Lib.) De Not. [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium seriatum* Lib., ad folia *Festucae sylvaticae* semi viva; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sur les feuilles du *Festuca sylvatica*; aux environs de Merwart (Luxembourg); ainsi que dans les bois montueux des bords de la Lesse entre Neupont et Daverdisse; M' Crépin.

Lycoperdon excipuliforme (Scop.) Pers. [*Lycoperdaceae*]

dans un petit bois de Sapins; au chfiteau de Mr Goethals-Delevigne; à la Hooghe, près de Courtrai; nei pascoli di S. Maria in Val Vegezzo, nell'alto Novarese; 1863; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Lycoperdon molle Pers. [*Lycoperdaceae*]

sub: *L. turbinatum* Pers. b. *lividum*; dans les dunes; Nieuport, entre le gazon; sub: *L. turbinatum* Pers.; Castiglioni dei Pepoli; Settembre 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Lycoperdon perlatum Pers. [*Lycoperdaceae*]

sub: *L. gemmatum* Fr.; dans un petit bois de Sapins; au ch'âteau de Mr Goethals-Delevigne; à Courtrai; sub: *L. perlatum* Pers.; pasture; lungo la Polcevera, sopra Genova; Ottobre 1862; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Lyomyces pruni (Lasch) Riebesehl & Langer [*Schizoporaceae*]

sub: *Odontia bugellensis* Ces.; su legno nudo e durissimo d'antico castagno; presso Biella; Settembre 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Odontia bugellensis* Ces.; Brixiae; Cesati.

Macrolepiota procera (Scop.) Singer [*Agaricaceae*]

sub: *Agaricus procerus* Scop.; nei castagneti; dietro il forte Sperone, sopra Genova; Ottobre 1862; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Agaricus procerus* Scop.; [...]; Austria; C. Kerk.

Macrosporium heteronemum (Desm.) Sacc. [*Pleosporaceae*]

sub: *M. heteronemum* Desm.; sur les feuilles languissantes du *Sagittaria sagittifolia*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Macrotiophula phacorrhiza (Reichard) Olariaga, Huhtinen, Læssøe, J.H. Petersen & K. Hansen [*Typhulaceae*]

sub: *Sclerotium complanatum* Tode, parmi les feuilles d'aulne en décomposition; dans les fossés des fructifications de la ville de Menin et dans les bois de Zillebeke près d'Ypres; nouvelle pour la Flore Belge.

Mamianiella coryli (Batsch) Höhn. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Sphaeria coryli* Batsch, ad folia *Coryli*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); sulle foglie languenti di *Corylus*; Oropa, provincia di Biella; estate 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie languenti di *Corylus*; dintorni di Locarno; estate 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. [*Marasmiaceae*]

sub: *Agaricus epiphyllus* Pers.; sur les feuilles mortes du lierre (*Hedera helix*); aux environs de Courtrai; Décembre.

Marasmius graminum (Lib.) Berk. [*Marasmiaceae*]

sub: *Agaricus graminum*; in foliis putrescentibus graminum; Sero Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Marasmius oreades (Bolton) Fr. [*Marasmiaceae*]

sub: *M. oreades* Fr.; nei dintorni di Serravalle alla Scrivia; Autunno 1860; Franzoni, Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. oreades* Fr.; Cimalmotto, nel Canton Ticino; Autunno 1860; Franzoni, Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. oreades* Bolton; in campis; Sodertelje (Sueciae); Jun 1860; C. P. Laestadius; Rabenhorst, Fungi europaei.

Marasmius rotula (Scop.) Fr. [*Marasmiaceae*]

sub: *Agaricus rotula* Scop.; au pied d'un Cornonillier; dans un bosquet du Parc de Saint-George, à Courtrai; sub: *M. rotula* Fr.; sulle foglie secche di quercia e di castagno; né boschi di Sala e di Collecchio, nel territorio Parmense; Autunno 1863; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Marasmius splachnoides (Hornem.) Fr. [*Marasmiaceae*]

in sylvis acerosis; prope Salzburg; leg. Dr Sauter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Marssonina mezerei (Lib.) Sacc. & D. Sacc. [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Leptothyrium mezerei* Lib., ad folia *Daphnes mezerei*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Marssonina andurnensis (Ces.) Magnus [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Gloeosporium andurnense* Ces., sulle foglie tuttora vegete della *Daphne mezereum*; nei monti dell'Oropa, Biellese; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Marssonina rhois (Westend.) Arx [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Leptothyrium rhois* Fuckel, sur les feuilles d'un *Rhus* inédit; au Jardin Botanique de Gand; fin de l'ètè.

Massaria anomia (Fr.) Petr. [*Massariaceae*]

sub: *Aglaospora profusa* (Fr.) De Not.; sub: *A. profusa* De Not.; su pali di robinia; a Serravalle Scrivia; Autunno 1858; Ferrari.

Massaria inquinans (Tode) De Not. [*Massariaceae*]

sub: *Sphaeria inquinans* Tode, Belgio; Libert.

Mazzantia napelli (Ces.) Sacc. [*Diaporthaceae*]

sub: *M. napelli* (Ces.) Passerini; in caulibus et petiolis aridis *Aconiti*; in Appennino parmense prope la Cisa; Julio; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melampsora abietis-capraearum Tubeuf [Melampsoraceae]

sub: *M. epitea* (Kunze et Schumach.) Thum.; ad *Salicis purpurea* folia; prope Zürich; Aug. 1878; G. Winter.

Melampsora aegirina Kicks [Melampsoraceae]

feuilles tombées du *Populus alba*; Seine-et-Marne: Fontainebleau; Octobre 11381; Feuillebois; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccata.

Melampsora balsamiferae Thum. [Melampsoraceae]

Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Melampsora caprearum (DC.) Thüm. [Melampsoraceae]

sub: *Uredo caprearum* DC., sur les feuilles du *Salix caprea*; dans les bois du château de Mr D'Ahère de Modave, près de Namur (Mr l'Abbé Bellynck), ainsi qu' aux environs de Courtrai.

Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne [Melampsoraceae]

sub: *M. euphorbiae* f. *helioscopiae*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.; sur l'*Euphorbia peplus*; [...], près de Marseille; 28 août 1874; sub: *M. euphorbiae* Tul.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 720; sub: *M. euphorbiae* Cast.; sull'*Euphorbia dendroides*; coltivata nell'Orto botanico di Genova; 1870; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les feuilles languissantes de l'*Euphorbia helioscopia*; dans un champ de bettevares, près de Courtrai; Oct. sub: *M. ricini* (Biv.) Castagne; in foliis *Ricini communis*; San Remo; Aprile; G. Passerini.

Melampsora lini (Ehrenb.) Lév. [Melampsoraceae]

sub: *M. lini* Desm.; in *Linum cathartica*; in montibus Parmensibus; Julio; G. Passerini; sub: *M. lini* Desm. f. *Lini cathartici*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; sub: *M. lini* Desm.; sur les tiges mortes du lin cultivé; aux environs de Courtrai; sub: *Uredo lini* DC., Botzen, Tirol; C. Kerk.; sur les feuilles et les tiges du *Linum catharticum*; aux environs de Bruxelles; M Mathieu.

Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. [Melampsoraceae]

sub: *Melampsora populina* Lév., in *Populus nigra*; Parmae; Aut.; G. Passerini; sub: *M. populina* Fuck. f. *stylosporifera*; in *Populo balsamifera* Fr.; Lipòcz; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *M. populina* Fuckel; sulle foglie vegete di *Populus nigra*; presso Cannero al Lago Maggiore; 1865; Gibelli; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. populina* Lév.; sulle foglie del *Populus tremula*; presso Bormio e presso Mondanizza, nella provincia di Sondrio; Ottobre 1862; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. populina* Lév.; sulle foglie del *Populus nigra*; nei dintorni di Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1867; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *M. populina* Lév.; sulle foglie del *Populus nigra*; dai dintorni di Parma; 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; *Melampsora tremulae* Tul., Anglia: Kings Lynn; 7. 1873; leg. Plowright; Ex herb. de Thümen.; ad *Populi tremulae* folia; Zürich, Helvetiae; Oct 1879; G. Winter; sur et sous les feuilles du *Populus alba* L.; 28 Août 1874; de Thümen, Fungh. Suph. n. 360; sur les feuilles du *Populus fastigiata*; aux [...]; près de Marseille; 23 août 1874; in *Populo tremulae*; Parmae; Dec.; Passerini.

Melampsora salicina Desm. [Melampsoraceae]

sub: *M. salicina* Lév.; sulla pagina superiore delle foglie del *Salix cinerea*; presso Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. salicina* Lév.; in *Salix nigricante*; Parmae; October; G. Passerini; sub: *M. salicina* Lév. f. *capraeae*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. salicina* Lév. f. *Salicis nigricantis*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub:

M. salicina Lév. f. *Salicis viminalis*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. salicina* Lév. f. *Salicis albae*; Austria inf.: Krems; 5. 1871; Ex herb. de Thümen; sub: *M. salicina* Lév. f. *Salicis auritae*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. salicina* Lév. f. *Salicis acutifoliae*; Neustadt; Hartig; Ex herb. de Thümen; sub: *M. salicina* Lév.; in *Salix viminalis*; Parmae; Aut.; G. Passerini; sub: *M. salicina* Lév.; sur les feuilles du *Salix capraea*; dans les bois des environs de Courtrai et d' Ypres.

Melampsora vernalis Niessl [Melampsoraceae]

sub: *Uredo saxifragarum* (DC.) Schldtl., auf Saxifraga; [...], 4. 1878; C. Müller & W. Retzdorff, Flora der Provinz Brandenburg.

Melamporella caryophyllacearum (DC.) J. Schröt. [Pucciniastraceae]

ad *Abietis pectinatae* DC. folia viva; “Sihwald” prope Zurich (Helvetiae); non frequens; Jun 1880; G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 155; [...]; Tirol; Heufler; sur les feuilles du *Stellaria media* et *S. graminea*, etc.; dans les bois des environs de Courtrai; Herbarium R. Horti Bot. Panormitani Plantae Siculae; sub: *Peridermium elatinum* Kunze & J. C. Schmidt, in abietibus; Carpatorum centralium ad Olaszinum Scepusii; C. Kalchbrenner; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melamporidium betulinum (Pers.) Kleb. [Pucciniastraceae]

sub: *Melampsora betulina* Pers.; ad *Betula albae* L. folia viva; in monte “Zürich berg”, prope Zürich (Helvetiae); October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 147.

Melamporidium carpini (Nees) Dietel [Pucciniastraceae]

sub: *Melampsora carpini* Fuckel f. *stylosporifera*; [...]; Borkut; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Melanconis stilbostoma (Fr.) Tul. & C. Tul. [Melanconidaceae]

sub: *Melanconium elevatum* Corda, in *Alni ramis*; Frankfurt ad M.; leg. Bagge; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Valsa stilbostoma* Kx.; sur les branches mortes du bouleau; au borde de Mr Vandenpeereboom; près de Courtrai; Delacroix.

Melanconium apiocarpum Link [Melanconidaceae]

sub: *M. apiocarpum* Link, ad *Alni* ramos; Reichenberg in Bohemia; leg. W. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melanconium betulinum J. C. Schmidt & Kunze [Melanconidaceae]

sur le tronc et branches mortes du bouleau.

Melanconium bicolor Nees [Melanconidaceae]

ad *Betulae* ramos; Frankfurt ad M.; leg. Bagge; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melanconium microsporum Link [Melanconidaceae]

sur des branches mortes; aux environs de Courtrai, ainsi que sur la Charmille, à Nieuport; Mr le Professeur Kickx.

Melanconium oleae Tham. [Melanconidaceae]

auf der Rinde und den jüngeren Zweigen von *Olea europaea sativa*; Griechenland: Kephyssos in Attica; leg. de Heldreich; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melanconium stromaticum Corda [*Melanconidaceae*]

in ramulis *Carpini betuli*; prope Dresdam; leg. Rabenhorst; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melampsora epitea Thüm. [*Melampsoraceae*]

sub: *Uredo epitea* Kunze, sur les feuilles du *Salix cinerea*; aux environs de Charleroi; Mr Tosquinet.

Melampsora euphorbiae (Ficinus & C. Schub.) Castagne [*Melampsoraceae*]

sub: *Uredo euphorbiae* Rebent., sur les feuilles des euphorbes.

Melampsora hypericorum (DC.) J. Schröt. [*Melampsoraceae*]

sub: *Uredo hypericorum* DC., sur les feuilles de l'*Hypericurn pulchrum*; au mont d'Avelghem; été.

Melampsora populnea (Pers.) P. Karst. [*Melampsoraceae*]

sub: *Uredo confluens* DC., sur les feuilles du *Mercurialis perennis*; dans les bois montueux de Marche-les-Dames, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Melampsora salicis-albae Kleb. [*Melampsoraceae*]

sub: *Uredo vitellina* DC., sur les feullies de *Salix laurifolia*; environs d'Ypres.

Melanops advena (Ces.) Weese [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Dothidea advena* Ces., sui fusti morti dell'*Ampelopsis hederacea*; nel giardino del Conte della Trinità a Caluso, provincia di Ivrea, Piemonte; 2 Agosto 1860; Cesati, Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Meliola abjecta J. Schröt. [*Meliolaceae*]

sub: *M. abjecta* Wallroth; Gesammelt im December 1877; Hirschgrund bei Rastatt in Baden; Dr. Schröter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melogramma asperum Ces. & De Not. [*Melogrammataceae*]

sub: *M. aspera* Ces. et De Not.; sulla corteccia di faggi; a S. Giovanni d'Andorno, nei monti del Biellese, Piemonte; Autunno 1858; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Melogramma campylosporium Fr. [*Melogrammataceae*]

sub: *M. vagans* De Not.; in ramis exsiccatis *Carpini betuli*; Parmae; Dec. 1873; leg. G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Melogramma spiniferum (Wallr.) De Not. [*Melogrammataceae*]

sub: *Melogramma spiniferum* De Not.; sulle radici putride dei faggi; nell'Appennino Pistoiese; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Memnonium effusum Corda [*Piedraiaceae*]

in charta [...] putrescente; Wallendorf (Hungariae); Kalchbrenner; Rabenhorst, Fungi europaei.

Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. [*Meripilaceae*]

sub: *Polyporus frondosus* Fr.; nell'agro vercellese; Autunno 1857; Malinverni.

Merismodes anomala (Pers.) Singer [*Niaceae*]

sub: *Peziza anomala* Pers., su rami secchi di *Salix caprea*; al Sasso presso Locarno; 1863; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; ad ramos exsiccatos et ligna putrida; per annum; Libert, Plantae

Cryptogainae Arduennae, fasc. III (1834); sur un tronc mort de cerisier; dans le jardin de M. Lieutenant Wahis, faubourg de Bruges à Menin.

Metadiplodia pustulosa (Lév.) Zambett. [*Incertae Sedis*]

sub: *Diplodia pustulosa* Lév., sur l'écorce d'un tilleul mort; au jardin de l'établissement hydrothérapique de Mr le Docteur Vanderplancke, à Courtrai.

Metasphaeria helicicola (Desm.) Sacc. [*Sacotheciaceae*]

sub: *Sphaeria helicicola* Desm., sur les feuilles mortes du *Hedera helix*; aux environs de Courtrai.

Microbotryum bistortarum (DC.) Vánky [*Microbotryaceae*]

sub: *Caeoma bistortarum* Link, in foliis *Polygoni bistortae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *Uredo bistortarum* DC., né prati alpestri di Val Fusio, nel Canton Ticino; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Ustilago candollei* Tal. & C. Tul., sul *Polygonum mite*; a Bolzano, nel Tirolo meridionale; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Microbotryum marginale (DC.) Vánky [*Microbotryaceae*]

sub: *Uredo marginalis* Rabenh., sulle foglie del *Polygonum bistorta*; al Moncenisio; 1857; Cesati, Malinverni.

Microcera coccophila Desm. [*Nectriaceae*]

sull'alloro; nel giardino di Boboli, a Firenze; Aprile 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallett [*Amphisphaeriaceae*]

sub: *Fusarium nivale* Ces., dintorni di Vercelli; Marzo 1857; Cesati.

Microglossum viride (Schrud. ex J.F. Gmel.) Gillet [*Leotiaceae*]

sub: *Geoglossum viride* Pers., sur la terre; dans les bois des environs de Namur (W I' Abbé Bellynck); né faggeti; S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Agosto 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; ad terram in fagetis; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Microsphaera duby Lév. [*Erysiphaceae*]

ad *Lonicera periclymeni* folia; Zürich, Helvetiae; G. Winter.

Microsphaera holosericea (Wallr.) Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *M. holosericea* Lév.; sull'*Astragalus glycyphyllos*; presso Locarno, Cantone Ticino; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. holosericea* Lév.; sur les feuilles de l'*Astragalus glycyphyllos*; France: Forêt de Fontainebleau (Seine-et Marne); Juillet 1887; Herbarium Feuilleaubeis.

Microsticta vagans Desm. [*Schizothyriaceae*]

sub: *M. vagans* Desm. a *ornithogali* Westend.; la var. a se développe sur les scapes de l'*Ornithogalum pyrenaicum*; aux environs de Bure, Namur; M' Crépin; sub: *M. vagans* Desm. p *antherici* Westend.; la var. sur les feuilles de l'*Anthericum ossifragum*; aux environs de Gheluvelt, près de Ypres.

Microstroma album (Desm.) Sacc. [*Microstromataceae*]

sub: *Microstroma quercinum* (Opiz) Niessl, Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; in *Quercus foliis vivis*; prope Gratz; Autumno; G. de Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Microthyrium ilicinum De Not [*Microthyriaceae*]

sulla pagina inferiore delle foglie sternate del *Quercus ilex* presso Siena; estate 1862; A. Tassi; Erbario Crittogamico Italiano.

Microthyrium microscopicum Desm. [*Microthyriaceae*]

ad folia humistrata consumata arborum exoticam sempervirentium, *Acaciae longifolia* imprimis; Hort. Botanici Neapolitani; hyemis tempore; leg. Cesati; sur les feuilles mortes et tombées à terre du *Ilex aquifolia*, péle-mêle avec l'*Aylographum vagum*, l'*Eustegia ilicis*, le *Phacidium multivalve* etc.; environs d'Ypres; Mr Desmazières l'indique sur les feuilles du Chataignier, du Hêtre et du Chêne.

Mitrula paludosa Fr. [*Cenangiaceae*]

Franconia; Bayreuth; 6. 1874; Ex herb de Thümen.

Mollisia vincae (Lib.) Dennis [*Mollisiaceae*]

sub: *Peziza vincae* Lib., ad folia *Vincae minoris* exsiccata; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Monochaetia monochaeta (Desm.) Allesch. [*Amphisphaeriaceae*]

sub: *Pestalozzia monochaeta* Desm. f. *Quercus pedunculatae*; in ejusdem foliis languescentibus; Bosco Montello (Treviso); Sept 1875; Saccardo; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Pestalozzia monochaeta* Desm.; sulle foglie dei lecci; alle Cascine di Firenze; Maggio 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Monostichella robergei (Desm.) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Gloeosporium robergei* Desm.; sur les deux faces des feuilles languissantes du charme; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Monostichella salicis (Westend.) Arx [*Incertae Sedis*]

sub: *Gloeosporium salicis* Westend.; sur les feuilles d'un saule-marceau; au bord d'un petit fossè, à Menin.

Montagnula opulenta (De Not.) Aptroot [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *Amphisphaeria opulenta* De Not., sulle opunzie morte; nelle siepi ai dintorni di Cagliari; 1867; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Montagnula perforans (Roberge ex Desm.) Aptroot [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria perforans* Roberge, sur les feuilles mortes de l'*Ammophila arundinacea* De Not.

Morchella esculenta (L.) Pers. [*Morchellaceae*]

sub: *Helvella esculenta* Pers., Getrocknet, wie die gewOhuliche Morchel, Gegenstand des Handels; Nord-Deutschland; Hohenack. Arzn. u. Handelspf. no. 716; Fungi discophori-Cryptogamia fungi; sub: *M. esculenta* Pers.; macchie di S. Rossore in Toscana; primavera 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. esculenta* Pers.; populeti e pascoli; Quinto Vercellese; Aprile 1868; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *M. esculenta* Pers.; Getrocknet Gegenstand des Handels. Schlesien; Hohenacker; Arzn. u. Handelspf. n° 715; Fungi discophori-Cryptogamia fungi.

Morchella semilibera DC. [*Morchellaceae*]

sub: *Morchella rimosipes* DC., in sylvis; ad Vercellim; leg. Malinverni; Rabenhorst, Fungi europaei; né populeti; a Quinto Vercellese; Aprile 1869; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sui

margini dei campi e presso le siepi; nei dintorni di Parma; Aprile 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Morenoina epilobii (Lib.) E. Müll. & Arx [*Asterinaceae*]

sub: *Aulographum epilobii* Lib., ad caules exsiccatos *Epilobii angustifolii*; per annum; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Morenoina festucae (Lib.) J. P. Ellis [*Asterinaceae*]

sub: *Aylographum festucae* Lib.; ad vaginas *Festuca sylvaticae* siccas; per annum; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Multiclavula vernalis (Schwein.) R.H. Petersen [*Hydnaceae*]

sub: *Clavaria paludicola*; in paludosis apricis; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Muyocopron smilacis (De Not.) Sacc. [*Muyocopronaceae*]

sub: *Microthyrium smilacis* De Not., sugli steli disseccati della *Smilax aspera*; nei dintorni di Spezia; estate 1857; Caldesi.

Mycena aurantiomarginata (Fr.) Quél. [*Mycenaceae*]

sub: *Mycena elegans* Pers., nei boschi di *Pinus sylvestris*; al Ferlaro presso Parma; Novembre 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Mycena epipterygia (Scop.) Gray [*Mycenaceae*]

sub: *Agaricus epipterygius* Scop.; né boschi di pini, tra le foglie ed i muschi; a Collecchio, provincia di Parma; Ottobre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm. [*Mycenaceae*]

sub: *Agaricus vulgaris* Pers.; fra le foglie fracide degli abeti; in un bosco al Ferlaro, provincia di Parma; Novembre 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Mycetinis prasioemus (Fr.) R.H. Petersen [*Omphalotaceae*]

Marasmius prasioemus (Fr.) Fr., sulle foglie secche di quercia; nei boschi di Sala e Collecchio, nella provincia di Parma; Novembre 1863; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Mycetinis scorodoni (Fr.) A.W. Wilson & Desjardin [*Omphalotaceae*]

sub: *Marasmius scorodoni* Fr.; sulle foglie sternate degli abeti; né boschi di Sala e Collecchio, nel territorio Parmense; Autunno 1863; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. scorodoni* Fr.; sugli strobili e foglie putrescenti delle conifere; presso Seis, nel Tirolo meridionale; 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *M. scorodoni* Fr.; bei Duisburg; leg. Heufler; sub: *M. scorodoni* Fr.; Bohemia; Ossegg; 9. 1873; Ex herb. de Thümen.

Mycosphaerella atomus (Cooke) Johanson ex Oudem. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria atomus* Desm., commune sur la face supérieure des feuilles mourantes ou presque dessechées du hêtre.

Mycosphaerella berberidis (Auersw.) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Phyllosticta berberidis* Westend.; sur les feuilles du *Berberis vulgaris*; à la campagne de Mr Vanderpeereboom-Delacroix, près de Courtrai.

Mycosphaerella brassicicola (Duby) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaerella brassicicola* De Not., sur les feuilles languissantes du *Brassica oleracea* L.; Seine-et-Marne: Chailly; Hiver; 1883; Feuillebois; Ch. Magnier, Flora selecta exsiccata.

Mycosphaerella conglomerata (Wallr.) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria conglomerata* Wallr., sur les feuilles tombées à terre du *Cercis siliquastrum*; au parc de Saint-George (Courtrai).

Mycosphaerella cruciferarum (Fr.) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria cruciferarum* Fr., sur les tiges et les siliques de l'*Erysimum officinale*; aux environs de Namur; Mr le Professeur Bellynck.

Mycosphaerella eryngii (Fr. ex Duby) Johanson ex Oudem. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria eryngii* Fr., sur les feuilles mortes de l'*Eryngium maritimum*; dans les dunes de notre littoral.

Mycosphaerella isariphora (Desm.) Johanson [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria isariphora* Desm., sur les feuilles sèches ou morantes du *Stellaria holostea*; au mont de Fraises, près d'Ypres; Automne.

Mycosphaerella millepunctata (Desm.) M.E. Barr [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Dothidea millepunctata* Desm., sur les feuilles mortes du *Rhododendron arboreum*; dans les jardins; printemps; nouvelle pour la Flore Belge.

Mycosphaerella mori (Fuckel) F.A. Wolf [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Cheilaria mori* Desm., sur les feuilles des mfiries; dans les plantations du camp de Beverloo.

Mycosphaerella podagrariae (Roth) Petr. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria aegopodi* Desm.; sur les feuilles languissantes de l'*Aegopodium podagraria*.

Mycosphaerella populi (Auersw.) J. Schröt. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria populi* Desm., sur les feuilles tombées du peuplier noir et d'Italie; Automne.

Mycosphaerella punctiformis (Pers.) Starbäck [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria punctiformis* Pers., sur les feuilles mortes et tombées; a terre, du chêne.

Mycosphaerella ribis (Sacc.) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria ribis* (Lib.) Desm. sur les feuilles languissantes du groseilliers; environs de Courtrai et au jardin de militaire de Bruges.

Mycosphaerella septorioides (Desm.) Lindau [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria septorioides* Desm.; sur les feuilles mourantes de l' *Acer campestre*; pendant l' automne.

Mycosphaerella superflua (Fuckel) Petr. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaerella superflua* Auersw., f. *sysimbri* Auerw.; sugli steli secchi del *Sisymbrium strictissimum*; nei dintorni di Bormio, in Valtellina; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Mycosphaerella tassiana (De Not.) Johanson [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Cladosporium graminum* Corda, [...], Istria; 12.8.1850; Heufler; sub: *Dematium graminum* Lib., ad folla Graminum arida; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Mycosphaerella tirolensis (Auersw.) Magnus [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaerella tirolensis* Auersw., sulle frondi morte dell'*Allosorus crispus*; a Riva in Valsesia; 1870; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Mycosphaerella ulmi Kleb. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta ulmi* Lib., in foliis languescensibus *Ulmi campestris*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *Septoria ulmi* Fr.; sur la face inférieure des feuilles de l'Orme cultivée (*Ulmus campestris*).

Mycosticta ovalis (Pass.) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Sphaeria ovalis* Pass., steli secchi di *Daucus carota*; insieme a *Heterosphaeria patella*; nell'alveo della Baganza, a Vigheffio presso Parma; Settembre 1874; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser.

Mycovellosiella bellynckii (Westend.) Constant. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles vivantes du *Cynanchum vincetoxicum*; dans le bois de Dave, près de Namur; Mr le Professeur Bellynck.

Myrothecium inundatum Tode [*Incertae Sedis*]

in agaricis putrescentibus; prope Graz; Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Myxonema assimile Corda [*Incertae Sedis*]

Eperpes Mart; leg. Hazslinszky; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Myxotrichum chartarum Kunze [*Myxotrichaceae*]

in charta locis udis; Dresdae; Rabenhorst.

Myxotrichum deflexum Berk. [*Myxotrichaceae*]

Batheaston; December 1874; C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Myxotrichum ochraceum Berk. & Broome [*Myxotrichaceae*]

in lignis mucidis; Batheaston; March 1874; C. E. Broome; Rabenhorst, Fungi europaei.

Naemaspora microspora Corda [*Lasiosphaeriaceae*]

ad cortices *Quercus*, *Pyri*, *Sorbi* etc.; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sur l'écorce du charme et du hêtre; assez rare.

Naohidemycus vaccinii (Jørst.) S. Sato, Katsuya & Y. Hirats. ex Vanderweyen & Fraiture [*Pucciniastraceae*]

sub: *Melampsora vaccini* Westd. f. *Myrtilli*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. vaccini* Westd. f. *Vaccini uliginosi*; Bohemia: Zinnwald; 7. 1872; Ex herb. de Thümen; sub: *M. vaccini* Alb. & Schwein.; ad *Vaccini myrtilli* L. folia viva; "Sihlwald" prope Ztirich (Helvetiae); October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 149; sub: *M. vaccini* Alb. & Schwein.; ad *Vaccini myrtilli* L. folia viva; "Leistkamm" prope Wesen, St Gallen (Helvetiae); Alt. ca. 1500 met.; October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsic-

cati, Fungi helvetici no. 149; sub: *M. vaccini* West.; sur les feuilles vivantes du *Vaccinum uiliginosum*; dans le Luxembourg; Mr Crépin; sub: *Podosporium vaccini* Fr.; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Uredo vacciniorum* DC.; Hausmman.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. [*Nectriaceae*]

sub: *Hypoxylon ribis* (Tode) J. Kichx f., sur les troncs et rameaux morts du groseiller rouge; dans le jardin de M. d'Honolt, jardinier-fleuriste à Courtrai; Février; sub: *N. cinnabarina* Fr.; sui rami di noce; presso Locarno, cantone Ticino; 1864; Daldini, Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Tubercularia vulgaris* Tode, sur les branches mortes; pendant tout l'anné.

Nectria citrinoaurantia Desm. [*Nectriaceae*]

sub: *N. citrino-aurantia* Delacr.; ad ramulos salicinos; Februario 1859; St Roman ad Viggenam, in agro pictav.; leg. T. De Lacroix Pter.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Nectria daldiniana Ces. & De Not. [*Nectriaceae*]

su rami secchi di *Sarothamnus scoparius*; nelle selve di Orsellina, presso Locarno; 1861; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Nectria petruciana (Caldesi & De Not.) Höhn. [*Nectriaceae*]

sub: *Sphaeria petruciana* Caldesi, sulla corteccia dé cipressi; alla Certosa presso Firenze; 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Nectriopsis lecanodes (Ces.) Diederich & Schroers [*Bionectriaceae*]

sub: *Nectria lecanodes* Ces., prope Doemitz; leg. Fiedler; Rabenhorst, Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Nemania confluens (Tode) Læssøe & Spooner [*Xylariaceae*]

sub: *Hypoxylon confluens* Westend.; dans les saules creux; dans les Flandres.

Neofabraea vagabunda (Desm.) Rossman [*Dermateaceae*]

sub: *Phlyctema vagabunda* Desm., sur les tiges séches du *Tamus communis*; dans les bois de St.-Servais, aux environs de Namur; Mr le Professeur Bellynyck.

Neohendersonia kickxii (Westend.) B. Sutton & Pollack [*Incertae Sedis*]

sub: *Stilbospora kickxii* Westend.; sur des branches mortes et tombées à terre du Bouleau; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Neolentinus cyathiformis (Schaeff.) Della Magg. & Trassin. [*Gloeophyllaceae*]

sub: *P. cyathiformis* Schaeff.; auf Lindenwurzel bei Salzburg; im Sommer; 1875; Dr. Sauter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead & Ginns [*Gloeophyllaceae*]

sub: *Lentinus lepideus* Fr., bei Glaggenitz; leg. Heufler.

Neonectria coccinea (Pers.) Rossman & Samuels [*Nectriaceae*]

sub: *Sphaeria coccinea* Pers. ad ramos arborum exsiccatos; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Neonectria punicea (J.C. Schmidt) Castl. & Rossman [*Nectriaceae*]

sub: *Fusisporium album* Desm.; sur les feuilles vivantes du chêne; dans les bois des environs de Courtrai; sub: *Sphaeria punicea* Kunze & J. C. Schmidt.; sur les branches et rameaux du *Rhamnus frangula*; dans un bois des environs d'Audenarde; d'ou notre ami Mr le Médecin de bataillon Tosquinet nous l'a fait connaître.

Neottiospora caricina (Desm.) Höhn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Neottiospora caricum* Desm.; sulle carici palustri; Vercelli; in primavera; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hendersonia atramentaria* J. Schröt.; auf *Glyceria fluitans* L. und *Gl. aquatica* L.; bei Rastatt in Baden; Aprii 1878; Dr Schröter, Rabenhorst, Fungi europaei.

Niesslia exosporioides (Desm.) G. Winter [*Niessliaceae*]

sub: *Sphaeria chaetomium* Corda, ad culmos et folia graminum; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Niesslia luzulae (Westend.) W. Gams [*Niessliaceae*]

sub: *Vermicularia luzulae* Westend., sur les feuilles du *Luzula maxima*; aux environs de [...], Luxembourg; Mr Crépin.

Niptera lacustris (Fr.) Fr. [*Mollisiaceae*]

sub: *Peziza lacustris* Fr., sur les chaumes sèches du *Scirpus lacustris*; aux étangs de Dickebiisch et de Zillebeke près d'Ypres.

Niptera melatephra (Lasch) Rehm [*Mollisiaceae*]

sub: *Peziza melatephra* Lasch et Rabenh.; sur les chaumes morts du *Juncus conglomeratus*; aux environs d'Ypres.

Niptera tephromelas (Pass.) Nannf. [*Mollisiaceae*]

sub: *Peziza tephromelas* Pass., su foglie morte di *Typha* e sul *Juncus conglomeratus*; né laghetti di Collecchio, provincia di Parma; 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Nitschkia cupularis (Pers.) P. Karst. [*Nitschkiaceae*]

sub: *Hypoxylon cupulare* (Pers.) J. Kichx f., sur des piquets de peuplier; au jardin de Mme Veuve Pycke, à Courtrai; Décembre.

Ochropsora ariae (Fuckel) Ramsb. [*Ochropsoraceae*]

sub: *Aecidium leucospermum* DC., Franconia: Bayreuth; 5. 1874; sur les feuilles de l'*Anemone nemorosa*; au bois du chateau de Namur; ou l'a recueilli Mr A. Vanstraelen (Mr l'Abbé Bellynck); in *Anemone nemorosa*; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Octaviania mollis De Not. [*Boletaceae*]

né vasi con terriccio di castagno e di brughiera e particolarmente né vasi contenenti piante della famiglia delle *Myrtaceae* e delle *Rhamnaceae*; nell'Orto botanico di Genova; 1862; Baglietto, Canepa; Erbario Crittogamico Italiano.

Octaviania asterosperma Vittad. [*Boletaceae*]

sub: *Octaviana asterosperma* Vitt.; Lyndhurst, Hampshire; leg. C. E. Broome.

Oidium aurantium Cooke [Erysiphaceae]

on spent hops; Burton-on-Trent (England); Cooke; Rabenhorst, Fungi europaei.

Oidium chartarum Link. [Erysiphaceae]

sur le papier gris ou roux conservé dans les caves et lieux humides.

Oidium euphorbiae-hirtae J. M. Yen. [Erysiphaceae]

sub: *O. euphorbiae* Thiim. f. *Euphorbiae dulcis*; Austria inf.: Krems; 7. 1871; Ex herb. de Thümen.

Oidium fructigenum Link [Erysiphaceae]

in *Prunus putrescentibus*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Oidium fusisporioides Fr. [Erysiphaceae]

sub: *O. fusisporioides* Fr. a violae Desm.; sur les feuilles de la violette odorante; aux environs d'Ath; Mr Tosquinet.

Oidium monilioides (Nees) Link [Erysiphaceae]

sub: *O. monilioides* Link f. *secales*; Austria inf.: Krems; 6. 1870; Ex herb. de Thümen; sub: *O. monilioides* Link f. *Agropyri repentis*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *O. monilioides* Link; sur les feuilles languissantes des graminées; aux environs de Bruges.

Oidium tritici (Corda) Sacc. & Voglino [Erysiphaceae]

sub: *O. tritici* Lib.; ad folia viva *Tritici repentis*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *O. tritici* Lib.; ad *Agropyri* folia; Reichenberg in Bohemia; leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei.

Omphalina grisea (Fr.) Quél. [Incertae Sedis]

sub: *Agaricus griseus* Fr., nei prati, sui rizomi delle graminacee; Vigheffio, presso Parma; Autunno 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Omphalospora melaena (Fr.) Höhn. [Dothideaceae]

sub: *Phoma melaena* Mont. et Dur.; sur les tiges mortes du tréflé; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Omphalospora stellariae (Lib.) Theiss. & Syd. [Dothideaceae]

sub: *Dothidea ambiens* Lib., ad caules *Stellariae nemorum*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *Dothidea stellariae* Lib., in foliis *Stellariae nemorum*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. (1832).

Omphalotus olearius (DC.) Singer [Omphalotaceae]

sub: *Agaricus olearius* DC.; a pié degli ulivi; presso S. Giuliano, in Toscana; Novembre 1866; Arcangeli; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Agaricus olearius* DC.; ad radices *Phyllireae latifolia*; Boboli (Florentiae); Oct. 1875; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Oomyces carneoalbus (Lib.) Berk. & Broome [Acrospermaceae]

sub: *Sphaeria carneoalba* Lib., ad folia exsiccata *Airae caespitosae*; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Ophiobolus acuminatus (Sowerby) Duby [*Phaeosporiaceae*]

sub: *Rhaphidophora acuminata* Sow.; Reichenberg in Bohemia; legit Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei.

Ophiobolus fruticum (Roberge ex Desm.) Sacc. [*Phaeosporiaceae*]

sub: *Rhaphidophora fruticum* Schem.; steli vecchi di *Ononis spinosa*; nell'alveo della Baganza, a Vigheffio, presso Parma; Estate 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Sphaeria fruticum* Rob.; sur les rameaux et les aiguillons de l' *Ononis spinosa*; aux environs de Namur; Mx Bellynck.

Ophiognomonia intermedia (Rehm) Sogonov [*Gnomoniaceae*]

sub: *Gloeosporium betuli* Westend., sur les feuilles du bouleau blanc; au bois de Mr Vandenpeereboom-Delacroix, à Courtrai; Novembre.

Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov [*Gnomoniaceae*]

sub: *M. juglandis* (Lib.) Sacc.; sous les feuilles du *Juglans nigra* L.; France, Fontainebleau: Seine-et-Marne; août 1885; Herbarium Feuilleaubois.

Ophiognomonia melanostyla (DC.) Sacc. [*Gnomoniaceae*]

sub: *Gnomonia melanostyla* Ces. et De Not.; Bohemia: Teplitz; 5.1872; Ex herb. de Thümen.

Ophiognomonia padicola (Lib.) M. Monod [*Gnomoniaceae*]

sub: *Sphaeria padicola* Lib., ad folia delapsa *Pruni padi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Ophiognomonia setacea (Pers.) Sogonov [*Gnomoniaceae*]

sub: *Sphaeria setacea* Pers., sur les petioles de l' *Acer campestre*; Hiver.

Orbilia rubella (Pers.) P. Karst. [*Orbiliaceae*]

sub: *Peziza rubella* Pers., cette pezize, nouvelle pour notre flore, à été trouvé sur l'écorce d'un frêne mort; dans le cour de l'infermeire militaire de Menin; Printemps.

Ostropa barbara (Fr.) Nannf. [*Stictidaceae*]

sub: *O. cinerea* Fr.; in cortice *Cupressus pyramidalis*; in collibus supra Sestri di Ponente prope Genuam; toto anno; 1856; leg. De Notaris; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II; sub: *O. cinerea* Fr.; sulla corteccia dei cipressi; nei dintorni di Genova; 1857; Dufour. Otthia pteleae Rabenh; Auf abgestorbenen Aesten von *Ptelea trifoliata* im Schlossgarten zu Salem (Baden); im December 1873; leg. J. B. Jack; Rabenhorst, Fungi europaei.

Otidea leporina (Batsch) Fuckel [*Otideaceae*]

sub: *Peziza leporina* Batsch, ad terram in pinetis; "Zürich berg" prope Ztirich (Helvetiae); raro; September 1880, leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 171.

Ozonium auricomum Link [*Psathyrellaceae*]

sur les bois en décomposition; dans les lieux humides.

Ozonium muscorum Roum. & Pat. [*Psathyrellaceae*]

tiges de *Leucobtyum* et dans l'humus; Seine-et-Marne; 5 Juin 1882; Feuilleubois; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccata.

Palawania grandis (Niessl) Syd. & P. Syd. [*Palawaniaceae*]

sub: *Microthyrium grande* Niessl., ad *Calami* species; Calcutta; S. Kurz; Rabenhorst, Fungi europaei.

Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. [*Mycenaceae*]

sub: *Panus stipticus* Fr., su ceppi di Quercia, Ontano ecc.; dintorni di Riva in Valsesia; Autunno 1858; Carestia; sub: *P. stipticus* Fr.; Serravalle alla Scrivia; Autunno 1858; Ferrari; sub: *P. stipticus* Bull.; ad truncos exsiccatos; Autunno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Panus conchatus (Bull.) Fr. [*Panaceae*]

Heufler.

Panus rudis Fr. [*Panaceae*]

sub: *P. rudis* Secr.; su ceppi dei faggi; al Santuario d'Oropa, nella provincia di Biella, in Piemonte; Agosto 1858; Cesati; ad truncos vetustos arbor. frond.; Salzburg; Sept. 1868; leg. Dr Sauter; Rabenhorst, Fungi europaei; am Rosskopfe bei Wien; legit J. Juratzka; Rabenhorst, Fungi europaei.

Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira [*Omphalotaceae*]

sub: *Marasmius perforans* (Hoffm.) Fr., [...]; Heufler; sub: *M. perforans* Fr.; in acerosis muscosis; pr. Schlucken in Bohemia; leg. Karl; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini [*Incertae Sedis*]

sub: *Agaricus flaccidus* Sow.; nelle pinete ed abetaie; al Feloro tra Sala e Collecchio, provincia di Parma; Settembre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Paranectria oropensis (Ces.) D. Hawksw. & Piroz. [*Bionectriaceae*]

sub: *Nectria oropensis* Ces., sul tallo di una *Biatora*; al ciglio di un muro di sostegno presso il Santuario dell'Oropa nella provincia di Biella; rarissima; Agosto 1859; Agosto e Settembre 1860; Erbario Crittogamico Italiano.

Paraphaeosphaeria michotii (Westend.) O.E. Erikss. [*Didymosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria michotii* Westend., sur le chaumes morts du *Juncus squarrosus*; dans les marais et les bruyères des environs de Beverloo.

Passalora bacilligera (Mont. & Fr.) Mont. & Fr. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Cladosporium bacilligerum* Montagne, sulle foglie dell'*Alnus glutinosa*; ad Oggebbio, Lago Maggiore; Settembre 1871; Gibelli; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. bacilligera* Fr.; in *Alni glutinosae* foliorum vivorum pagina infer.; prope Graz, Styriae; Sept; leg. G. de Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Passalora dissiliens (Duby) U. Braun & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Torula dissiliens* Duby, sulle foglie languenti di vite; a Vigheffio, presso Parma; Autunno 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Patellaria atrata (Hedw.) Fr. [*Patellariaceae*]

sub: *L. atratum* Rabenh.; in chorda vetusta et diu intemperici autumnali exposita; in horto botanico Neapolis; V. de Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Paxillus involutus (Batsch) Fr. [*Paxillaceae*]

sub: *P. involutus* Fr.; lungo i rigagnoli nei castagneti; Voltri e Polcevera; Settembre-Ottobre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Penicillium crustaceum Link [*Aspergillaceae*]

sub: *P. crustaceum* Fr., sterile sclerotien! Leipzig; auf ungesuertem Brode cultivirt und eingesandt von Dr. Georg. Winter, Rabenhorst, Fungi europaei.

Penicillium glaucum Link [*Aspergillaceae*]

Austria; Heufler.

Peniophora cinerea (Pers.) Cooke [*Peniophoraceae*]

sub: *Thelephora cinerea* Pers., sur les branches et rameaux de l'*Acer platanoides* et *A. pseudoplatanus*; à Rochefort et lande; M' Crépin.

Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. [*Peniophoraceae*]

sub: *Corticium incarnatum* Fr. f. *Alni viridis*; Tirolia: Kiihtey (Oetz); 8. 1874; leg. Ernst Rehm; Ex herb. de Thümen; sub: *Corticium incarnatum* Fr.; Lindeberg; leg. Heufler.

Peniophora laeta (Fr.) Donk [*Peniophoraceae*]

sub: *Radulum laetum* Fr., sur des branches mortes et tombées a terre du Condrier; dans le pare du ch'ateau de Hassonville, Luxembourg; Mr Gust. Aubert.

Peniophora nuda (Fr.) Bres. [*Peniophoraceae*]

sub: *Corticium nudum* (Fr.) Fr., sui pali; nel giardino di Boboli, a Firenze; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Peniophora quercina (Pers.) Cooke [*Peniophoraceae*]

sub: *Thelephora quercina* Pers., ad ramos *Quercus*, *Coryli*, etc.; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Periconia byssoides Pers. [*Incertae Sedis*]

sur les tiges pourrissantes de la pivoine; dans les jardins.

Peridermium oblongisporium Fuckel [*Cronartiaceae*]

sulle foglie del *Pinus halepensis*; tra Peschici e Vieste al Gargano; Aprile 1874; Pasquale; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Periola tomentosa (Fr.) Fr. [*Incertae Sedis*]

sur les pommes de terre pourries; dans les caves; pendant l'hiver.

Perisporium arundinis Desm. [*Incertae Sedis*]

nos échantillons out été trouvés dans les bois et étangs de Zillebake; nouvelle pour la Flore belge.

Perisporium brassicae Lib. [*Incertae Sedis*]

ad caules *Brassicae oleraceae* putrescentes; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Peristemma pseudosphaeria (Mont.) Jørst. [*Pucciniaceae*]

sub: *Miyagia pseudosphaeria* (Mont.) Jorst., Dània: ins. Fiorriae; 8. 1874; leg. Rostrup; Ex herb. de Thümen.

Peroneutypa alsophila (Durieu & Mont.) Carmarán & A.I. Romero [*Diatrypaceae*]

sub: *Rhabdospora alsines* Mont., ad *Alsinem tenuifoliam*; Vercellis; Jun 1857; leg. Cesati; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Peronospora alchemillae G. H. Otth [*Peronosporaceae*]

sub: *P. alchemillae* Niessl.; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb de Thümen.

Peronospora alsinearum Casp. [*Peronosporaceae*]

sub: *P. alsinearum* Duby f. *Cerastii trivialis*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb de Thümen; sur la *Stellaria media*; France-Fontainebleau (Seine-et-Marne); Mars 1885; Herbier Feuilleaubois.

Peronospora anagallidis J. Schrift. [*Peronosporaceae*]

Ander untern Flche lebender Blater der *Anagallis coerulea* Schreb. am Fusse der Weinberge hinter Unterrissdorf bei Eisleben (Prov. Sachsen); August 1873; leg. Johannes Kunze; Rabenhorst, Fungi europaei.

Peronospora arenariae (Berk.) Tul. [*Peronosporaceae*]

sub: *Botrytris arenariae* Berk.; sur les feuilles et les tiges de l'*Arenaria rubra*; aux environs du camp de Beverloo; Mr Tosquinet.

Peronospora calotheca de Bary [*Peronosporaceae*]

Berlin; ad *Galium aparine* in horto botanico; 5 Juni 1871; leg. P. Magnus; Rabenhorst, Fungi europaei; ad *Asperulae odoratae* folia; Zarich, Helvetiae; 6. 1886; leg. G. Winter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Peronospora chlorae de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. chlorae* de Bary f. *erythraeae*; in *Erythraea pulchella*; non raro; in agris prope Halam Saxon; autumno 1871; legit Julius Kiihner; Rabenhorst, Fungi europaei.

Peronospora corydalis de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. corydalis* de Bary f. *Corydalis cavae*; Borussia rhen: Bonn; 7. 1874; leg. Kornike; Ex herb. de Thümen; auf *Corydalis solida*; im Botanischer Garten zu Berlin gesammelt; Ende April 1869 und 1870; von Dr P. Magnus; Rabenhorst, Fungi europaei.

Peronospora dianthii de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. dianthii* de Bary f. *githaginis*; Franconia: Bayreuth; 4. 1874; Ex herb de Thümen; sub: *P. dianthii* de Bary f. *Agrostemmatidis githaginis*; Berlin: Friedrichshain; auf der unter Seite der Blater von *Agrostemma githago*; leg. d. 24 August 1877; Uhle; Rabenhorst, Fungi europaei.

Peronospora farinosa (Fr.) Fr. [*Peronosporaceae*]

sub: *P. effusa* de Bary f. *ciconiae*; sulle foglie di *Erodium ciconium*; Bologna; Marzo 1864; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. effusa* de Bary f. *spinariae*; Bohemia: Tetschen; 10. 1873; Ex herb de Thümen.

Peronospora ficariae Tul. [*Peronosporaceae*]

sulle foglie della *Ficaria ranunculoides*; nei dintorni di Parma; Marzo 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. ficariae* de Bary; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex Herb. de Thümen; sub: *P. ficariae* de Bary f. *Ranunculi auricomis*; Franconia: Bayreuth; 5. 1879; Ex Herb. de Thümen; sub: *P. ficariae* de Bary f. *Ranunculi reptentis*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora grisea Unger [*Peronosporaceae*]

sub: *P. grisea* de Bary f. *Veronicae buxbaumii*; Franconia: Bayreuth; 6. 1874; Ex Herb. de Thümen;
 sub: *P. grisea* de Bary f. *Veronicae serpyllifoliae*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora lamii A. Braun [*Peronosporaceae*]

sub: *P. lamii* de Bary f. *Lamii amplexicaulis*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora myosotidis de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. myosotidis* de Bary f. *Lithospermi arvensis*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex Herb. de Thümen; in *Myosotidis intermediae* foliis; Friburgi Brigavorum; Aprili 1862; leg. De Bary; Rabenhorst, Fungi Europaei.

Peronospora obovata Bonord. [*Peronosporaceae*]

sub: *P. obovata* Bon. f. *Spergulae arvensis*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora potentillae de Bary [*Peronosporaceae*]

ad *Potentillae fragariastris* Ehrh. folia viva; Zurichberg pr. Zürich; Mai-October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 188.

Peronospora radii de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. radii* de Bary f. *tripleurospermi*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; leg. Dr. Walther; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora scleranthi Rabenh. [*Peronosporaceae*]

sub: *P. scleranthi* Fuckel f. *Scleranthi annui*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora viciae (Berk.) Casp. [*Peronosporaceae*]

sub: *P. viciae* Casp.; né castagneti di Collecchio, provincia di Parma; sulle foglie dell'*Orobus niger*; Maggio 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. viciae* de Bary f. *Lathyri pratensis*; Bohemia: Teplitz; 7. 1873; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora violae de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *P. violae* de Bary f. *Violae tricoloris arvensis*; Silesia: Breslan; 9. 1865; leg. Schneider; Ex Herb. de Thümen.

Peronospora sp. [*Peronosporaceae*]

Oran; 2. 1880. M. Gandoger, Flora Algeriensis exsiccata.

Pestalotia cesatii Rabenh. [*Pestalotiopsidaceae*]

in foliis *Podocarpis latifoliae*; in Hort. Botanico Neapoli; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pestalotiopsis conigena (Lév.) G.C. Zhao & Nan Li [*Pestalotiopsidaceae*]

sub: *Pestalotia conigena* Lév., ad conos dejectos *Abietis excelsae* DC.; in sylvis di Collecchio, prov. Parmensis; per annum; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pestalotiopsis funerea (Desm.) Steyaert [*Pestalotiopsidaceae*]

sub: *Pestalozzia funerea* Desm.; sur les rameaux et les feuilles mortes du *Thypha occidentalis*; au jardin de Mme Veuve Goethals-Vercruyse, à Courtrai; Autumno.

Pestalotiopsis guepinii (Desm.) Steyaert [*Pestalotiopsidaceae*]

sub: *Pestalozzia guepinii* Desm.; ad folla humistrata *Camelliarum*, *Prunorum*; etc; in Hort. Bot. Neapolitano; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pezicula carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel [*Dermateaceae*]

sub: *Dermatea carpinea* Fr., sur l'écorce d'un charme mort; aux environs de Mons; Mr Tosquinet.

Pezicula ocellata (Pers.) Seaver [*Dermateaceae*]

sub: *Habrostictis ocellata* Fuckel; Saxonia boruss: Eisleben; leg. Kunze; Ex herb. de Thümen.

Pezicula rubi (Lib.) Niessl [*Dermateaceae*]

sub: *Patellaria rubi* Lib., ad ramos dejectos Ruborum; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Peziza arduennensis Marchal [*Pezizaceae*]

sur les sarments morts des rouces; dans les plantations du camp de Beverloo; sur les branches et rameaux du *Rosa arvensis*, dans un petit bois des environs de Courtrai.

Peziza calicium Pers. [*Pezizaceae*]

ad ramos dejectos *Pini silvestris*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Peziza hederæ Lib. [*Pezizaceae*]

sur les feuilles mortes et tombées à terre de l'*Hedera helix*; in foliis delapsis Hederæ; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Peziza pulchella Pers. [*Pezizaceae*]

in ramis exsiccatis *Quercus* et *Rubi idaei*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Peziza sclerotiacea Ces. [*Pezizaceae*]

nei gerbidi asciutti; Oldenico nel Verellese; Dicembre 1859; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Peziza trifoliorum Lib. [*Pezizaceae*]

in foliis trifoliorum adhuc vivis; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Peziza vesiculosa Bull. [*Pezizaceae*]

sub: *P. vesiculosa* Grev.; sui mucchi di concio; nelle campagne di Pisa; Marzo 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Phacidium buxi A. B. Frank. [*Phacidiaceae*]

croît sur les feuilles mortes du buis (*Buxus sempervirens*); aux environs de Bruxelles, Bruges, Ypres, etc.

Phacidium coronatum Fr. [*Phacidiaceae*]

sulle foglie morte dei faggi; all'Oropa e a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; 1858; Cesati; sulle foglie morte dei faggi; a Riva in Valsesia; 1858; Carestia; sub: *P. coronatum* f. *quercus*; Bohemia: Teplitz; 7. 1873; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles pourrissantes du chêne; dans les bois des environs de Courtrai.

Phacidium foliicola (Lib.) W.J. Li & K.D. Hyde [*Phacidiaceae*]

sub: *Cytospora foliicola* Lib. f. *Magnoliae longipetalae*; Bohemia: Tetschen; 10. 1873; Ex herb. (le Tbiimen; ad folia emortua *Hederæ* et *Vincae*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830); sur les feuilles mortes du *Vinca minor*.

Phacidium friesii Ces. [*Phacidiaceae*]

in foliis *Ranunculi*; Biellae (Pedemonti); leg. V. de Cesati.

Phacidium lacerum Fr. [*Phacidiaceae*]

in foliis dejectis *Pini sylvestris*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Phacidium lauri (Sowerby) Crous & D. Hawksw. [*Phacidiaceae*]

sub: *Ceuthospora phacidioides* Grev., sulle foglie dell'agrifoglio; sopra la grotta di Pozzuolo, in Toscana; Marzo 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles mortes du houx (*Ilex aquifolium*); environs de Namur; le Rév. Père Bellyncq; sub: *Phacidium ilicis* Tul., in pagina superiore foliorum *Ilicis aquifolii*; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837); sub: *Phacidium multivalve* Fr.; sur les feuilles à moitié pourries du Houx.

Phacidium patella (Sommerf.) Fr. [*Phacidiaceae*]

sub: *P. patella* Fr. alpestre; in sylvaticis udis ad caules siccos *Angelicae sylvestris*; Libert, *Plantae Cryptogamae*; sub: *P. patella* Fr. f. *campestris* Fr.; in horto meo ad caules *Anethi foeniculi* siccos; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834); sur des tiges desséchées du *Daucus carota* sauvage; dans les champs cultivés aux environs de Bourges; 10 Juin 1855; Rec. Ripart.; E Schultz, Herbarium normale. Cent. 2.

Phacidium quercinum Schwein. [*Phacidiaceae*]

sub: *P. quercinum* Desm.; sur les feuilles morte et tombee du *Quercus ilex*, aux Martégans; 23 Août 1874.

Phaeosphaeria herpotrichoides (De Not.) L. Holm [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Leptosphaeria herpotrichoides* De Not., sui culmi secchi dell'*Andropogon ischaemum*; nell'alveo della Baganza, a Vigheffio, presso Parma; estate 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; in culmis *Andropogonis ischaemi*; a Vigheffio, prope Parmam; Aut. 1876; Passerini; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Phaeosphaeria lycopodina (Mont.) Hedjar. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria crepini* Westend., sur les bractéoles des epis du *Lycopodium annotinum*; dans les forêts des environs de Saint-Hubert (Luxembourg); d'où Mr Fr. Crépin, jeune botaniste, à qui nous la dédions.

Phaeosphaeria nardi (Fr.) L. Holm [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria nardi* Fr., sur les feuilles du *Nardus stricta*; dans les bruyères de Beverloo.

Phaeosphaeriopsis glaucopunctata (Grev.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria rusci* Wallr., sul *Ruscus aculeatus*; nel giardino di Boboli a Firenze; 1861; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sul *Ruscus aculeatus*; dai dintorni di Locarno; 1861; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Ruscus aculeatus* et *androgynus*; au Jardin botanique de Gand; Automne.

Phallus impudicus L. [*Phallaceae*]

né pascoli; dintorni di Vercelli e di Oldenico; Ottobre-Novembre 1860; Cesati, Malinverni.

Phellinus ignarius (L.) Quél. [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Polyporus ignarius* Fr.; sul tronco del *Salix alba*; nella pianura Lucchese; 1859; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polyporus ignarius* L.; Stiria superiore; Heufler; sub: *Polyporus nigricans* Fr.; su tronchi putrescenti di faggio; presso Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Phellodon melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst. [*Thelephoraceae*]

sub: *Hydnum graveolens* Delastr.; pinete; Polcevera, sopra Genova; Autunno 1863; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hydnum graveolens* Delastr.; prope Botzen, Tyrol; Sept. 1871; G. de Hohembilhel; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Hydnum graveolens* Delastr.; tra i muschi, appié di castagni, né castagneti; presso Parma; Agosto 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Hydnum graveolens* Delastr.; né faggeti; a S. Giovanni d'Andorno, nel Biellese; Settembre 1858; Cesati.

Phellodon niger (Fr.) P. Karst. [*Thelephoraceae*]

sub: *Hydnum nigrum* Fr., in muscos sylvorum; [...]; 30 Nov 1873; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae; sub: *Hydnum suberosum* var. *cinereum* Batsch, pineta; Olmatello, presso Faenza; Novembre 1863; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; pineta di S. Rossore, presso Pisa; Dicembre 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Phellodon violascens (Alb. & Schwein.) A.M. Ainsw. [*Thelephoraceae*]

sub: *Hydnum cinereum* Bull.; in pinetis; prope Schuckenau; W. Karl.

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds. [*Meruliaceae*]

sub: *Merulius tremellosus* Schrad., ad troncus quercinos; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sub: *M. lacrimans* Schumach.; ad ligna putrida; locis humidis domesticis; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sur les troncs pourris; Seine-et-Marne: forêt de Fontainebleau; Automne 1883; Feuilleaubeis; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccatae; auf einer Waldkultur an Lanbholzstumpfen; Donnstetten; Okt. 1876; Kemmler; Rabenhorst, Fungi europaei; su toppi di faggio; Torchiana, presso Parma; Novembre 1862; G. Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Phlyctema caulium (Lib.) Petr. [*Dermateaceae*]

sub: *Ascochyta caulium* Lib., in caulibus plantarum exsiccatis; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Phloeospora aceris (Lib.) Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Cheilaria aceris* Lib., sur les feuilles de l'*Acer campestre*; aux environs de Namur; Mr Bellynck; in foliis *Aceris campestre*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Phloeospora bupleuri (Desm.) Höhn. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria bupleuri* Desm., sur les feuilles du *Bupleurum falcatum*; à Ham-sur-Lesse, près de Rochefort; Mr Crépin.

Phloeospora heraclei (Lib.) Petr. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta heraclei* Lib., in foliis languescentibus *Heraclei sphondylii*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Phloeospora robiniae (Lib.) Höhn. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta robiniae* Lib.; in foliis *Robiniae pseudoacaciae*; Aestate-Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sub: *Septoria robiniae* Desm.; sur les feuilles languissantes du *Robinia pseudoacacia*; dans les plantations du camp de Beverloo.

Phoma agaves Durieu & Mont. [*Didymellaceae*]

feuilles vivantes de l'*Agave americana*; au Serra d'eu Vaquer, Pyrénées orientales: Perpignan; 15-30 Juillet 1879; 0. Debeaux; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccata.

Phoma bellynckii Westend. [*Didymellaceae*]

dans les jardins légumiers de Courtrai; Hiver.

Phoma exigua Desm. var. *exigua* [*Didymellaceae*]

sub: *Phyllosticta sambuci* Desm.; sur les feuilles du *Sambucus nigra*; aux environs de Namur; Mr Bellynck; sub: *Phoma exigua* Desm.; sur les tiges languissantes du fin (*Linum usitatissimum*); cultivé aux environs de Courtrai.

Phoma exserta Thiim. [*Didymellaceae*]

sub: *P. exsertum* Thiim.; Franconia: Bayreuth; 10. 1879; leg. Walther; Ex herb. de Thümen.

Phoma herbarum Westend. [*Didymellaceae*]

sub: *P. herbarum* f. *nesliae*; Bohemia: 6. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *P. herbarum* Westend. f. *medicaginis* Westend.; prope Termonde; leg. Westendorp; Rabenhorst, Fungi europaei; in folia *Nesliae paniculatae*; 1872; G. I. Austriari; sur les tiges de l'ortie et du sainfoin; sur les tiges mortes du *Melampyrum sylvaticum*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phoma leguminum Westd. [*Didymellaceae*]

sur les feuilles; Fevrier 1874; sur les gousses du *Cercis siliquastrum*; dans les jardin de Mme Veuve Pycke; à Courtrai; sub: *P. leguminum* Westend. f. *laburni*; Franconia: Bayreuth; 6. 1879; Ex herb. de Thümen; sub: *P. leguminum* Westend. f. *pseudacaciae*; Bohemia: Kaplitz; 3. 1872; leg. Kirchner; Ex herb. de Thümen.

Phoma leucospila Pass. [*Didymellaceae*]

ad folia mox decidua *Sorbi hybridae* Hort.; in horto agr. Parmae; Julio; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei.

Phoma lineolata Desm. [*Didymellaceae*]

sub: *P. lineolatum* Desm.; sur la face externe des écailles des c6nes du mélèze (*Larix europaea*); à Courtrai.

Phoma longissima (Pers.) Westend. [*Didymellaceae*]

sub: *P. longissima* Westend.; sur les tiges mortes du *Chenopodium viride*; au camp de Beverloo.

Phoma podagrariae Westend. [*Didymellaceae*]

sur les feuilles de l'*Aegopodium podagraria*; environs de Charleroy.

Phoma rabiei (Pass.) Khune ex Gruyter [*Didymellaceae*]

sub: *Zythia rabiei* Pers., sulle sommità raggrinzite dei ceci; dalla cosiddetta Robbia; né campi presso Parma; Maggio, Giugno; Passerini.

Phoma rubi Marignoni [*Didymellaceae*]

sur les sarments et rameaux des ronces; dans les fortifications de la ville de Termonde.

Phoma samararum Desm. [*Didymellaceae*]

sur les samares tombées à terre du frêne; dans le jardin de St George, à Courtrai; Mars; ad samaridia *Fraxinorum*; in Hort. Bot. Neapol.; hyemis tempore; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Phoma vincetoxici Westend. [*Didymellaceae*]

sub: *P. vincetoxici* Westend. a *folliculorum* West.; sur les follicules du *Cynanchum vincetoxicum*; au Jardin Botanique de Louvain; Mr Ed. Martens; ainsi qu' aux environs de Namur; M' le Professeur Bellynck.

Phoma violae Westend. [*Didymellaceae*]

sur les feuilles vivantes de la violette commune; dans les dunes; entre Furnes et Nieuport; rare; Novembre.

Phoma westendorpii Tosq. & Westend. [*Didymellaceae*]

sub: *P. westendorpi* Tosq.; sur les feuilles pourrissantes du nénuphar jaune; à l'étang de Zillebeke, près d'Ypres; Mr Tosquinet.

Phomopsis aucubae (Westend.) Traverso [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma aucubae* Westend., sui les feuilles languissantes de l'*Aucuba japonica*; dans les jardins; le R. P. Clém. Dumont.

Phomopsis convallariae (Westend.) Grove [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma convallariae* Corda.; Prefsburg; Schneller; Herbarium Heuflerianum. sur les tiges mortes du *Polygonatum multiflorum*; aux environs de Namur; Mr le Professeur Bellynck.

Phomopsis coronillae (Westend.) Bubák [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma coronillae* Westend., sur les rameaux morts du *Coronilla emerus*; au jardin de Mr l'Avocat Biebuyck, à Courtrai.

Phomopsis ebulina (Sacc. & Schulzer) Grove [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma ebulina* Sacc., sur les tiges seches du *Sambucus ebulus*; France: Fontainebelau (Seine-et-Marne); Avril 1884; Herbarium Feuilleauboisi.

Phomopsis incarcerata Höhn. [*Diaporthaceae*]

sub: *Sphaeropsis depressa* Lév., sur les rameaux du *Syringa vulgaris*; au part de Saint-George, à Courtrai.

Phomopsis macilenta (Roberge ex Desm.) Petr. [*Diaporthaceae*]

sub: *C. macilenta* Rob.; sur les rameaux morts du *Cornus mascula*; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Phomopsis malvacearum (Westend.) Died. [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma malvacearum* Westend., sur les tiges mortes de l'*Althaea officinalis*, ainsi que sur celles de l'*Alcea rosea*; dans les jardins.

Phomopsis petiolorum (Desm.) Grove [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma petiolorum* Rob.; sur les petioles des feuilles tombées du *Robinia pseudoacacia*; dans le jardin de la Société de St. George à Courtrai; Octobre.

Phomopsis phaseoli (Desm.) Sacc. [*Diaporthaceae*]

sub: *Phoma phaseoli* Desm., sur les tiges mortes du haricots (*Phaseolus vulgaris*); Automne.

Phomopsis rhinanthi (Sommerf.) Arx [*Diaporthaceae*]

sub: *Sphaeronaema rhinanthi* Lib., ad caules et capsulas *Rhinanthi*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sur les tiges et capsules du *Rhinanthus trista-galli*; aux environs de Namur; Mrs le Coliate A. De Limminghe et J. Barbier.

Phomopsis ryckholtii (Sacc.) Höhn. [*Diaporthaceae*]

sub: *Sphaeria ryckholtii* Westend., sur les branches et rameaux morts du *Lonicera symphoricarpos*; dans le jardin de M.me Van Landeghem; Anne à Termonde.

Phomopsis velata (Sacc.) Traverso [*Diaporthaceae*]

sub: *Sphaeria conorum* Desm., sur les bractées des cemes tombées à terre du *Pinus abies*; à la campagne de Mr Goethals-Delivigne; près de Courtrai, sub: *Sphaeria controversa* Desm., sur les rameaux du *Cornus sanguinea* et les sarments de la ronce; aux environs de Courtrai.

Phragmidium acuminatum Fr. [*Phragmidiaceae*]

sub: *P. acuminatum* Fr.; sur les feuilles du *Poterium magnoli*; 13 Aug 1874.

Phragmidium apiculatum Rabenh. [*Phragmidiaceae*]

sub: *P. apiculatum* f. *Potentilla verme*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. apiculatum* Rabenh. f. *Poterii*; Franconia: Bayreuth; Oct 1874; Ex herb. de Thümen.

Phragmidium asperum Wallr. [*Phragmidiaceae*]

sulle foglie del rovo comune; a Bolzano; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie del rovo comune; a Vigheffio, presso Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Rubus fruticosus*; dans les bois aux environs de Courtrai.

Phragmidium brevipes Fuckel [*Phragmidiaceae*]

Walleisia; Sept 1873; leg. Brittain; Ex herb. de Thümen.

Phragmidium bulbosum (Fr.) Schltld. [*Phragmidiaceae*]

dans la feuille vivant du *Rubus*; St. Marguerita, près de Marseille; 16 Août 1874; sur les feullies des rouces; sub: *Phragmidium microsorum* Sacc., 18 Aug 1874.

Phragmidium effusum Auersw. [*Phragmidiaceae*]

ad *Rubi*, prope Zürich; Oct 1879; G. Winter.

Phragmidium fragariae (Rabenh.) Ces. [*Phragmidiaceae*]

sub: *Phragmidium fragariastris* (DC.) J. Schrift., sur les feuilles des frasiers des bois; aux environs de Courtrai et de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phragmidium fusiforme J. Schröt. [*Phragmidiaceae*]

ad *Rosae alpina* folia; Zürich, Helvetiae; Sept 1878; G. Winter.

Phragmidium incrassatum Link [*Phragmidiaceae*]

sub: *P. incrassatum* Link f. *Rubi discoloris*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. incrassatum* Link f. *Rubi fruticosi*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen;

sulle foglie di rovo; presso Forlì; Sett. 1859; L. Caldesi; sulle foglie di rosa; presso Faenza; Luglio 1859; L. Caldesi.

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schldl. [*Phragmidiaceae*]

sub: *Phragmidium bullatum* Westend., sur les branches et les rameaux de l'églantier; dans un petit bois, aux environs de Courtrai, du cote de St-Genois; sub: *P. mucronatum* Schlecht; sulla *Rosa canina* e *R. rubiginosa*; a Vigheffio, presso Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. subcorticium* Winter; sur les feuilles du *Rosa alba* dans les jardins; Aube: Méry-sur-Seine; 25 Juillet 1888; legit P. Hariot; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *P. rosarum* Fuckel f. *Rosa caninae*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. rosarum* Fuckel f. *Rosa centifoliae*; Hungaria centralis, Comitatus alba; 1873; leg. Dr August Tauschen; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles du *Rosae centifoliae*; Hungaria centralis, Comitatus alba; 20 Julio 1870; Dr August Tauschen; adjosam cult. folia; Zürich; 9. 1878; leg. Winter; sub: *Uredo pinguis* DC., sur le petiole, les nervures et le calice de plusieurs rosiers, qu'il tuméfie et déforme; dans les bois de la propriété de Mule Surmont de Volsberghe.

Phragmidium potentillae (Pers.) P. Karst. [*Phragmidiaceae*]

sub: *Phragmidium obtusum* (F. Strauss) G. Winter, Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; ad *Potentillae tormentillae* Sibth. folia; in Monte "Thrichberg" prope Ztirich (Helvetiae); leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 145; sub: *P. potentillae* Corda; sur les feuilles du *Potentilla reptans* and *P. tormentilla*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phragmidium rubi-idaei (DC.) P. Karst. [*Phragmidiaceae*]

sub: *Uredo gyrosa* Rebert., sur les feuilles du *Rubus idaeus*; assez rare; in *Rubo idaeae*; Mai; Ungrai; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt. [*Phragmidiaceae*]

sub: *P. poterii* Wallr., sur les feuilles du *Poterium sanguisorba*; à Bouge, près de Namur; Mr Bellynck.

Phragmotrichum chailletii Kunze [*Incertae Sedis*]

sub: *Phragmotrichum chailletii* Kunze; in pagina exteriore squamarum *Pini abietis*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Phyllachora graminis (Pers.) Fuckel [*Phyllachoraceae*]

sub: *Dothidea graminis* (Pers.) Chevall., sur les feuilles des graminées; communiquée des environs de Blankenberghe; pas le Rév. Père Leburton; sub: *P. graminis* Pers.; Leipzig; Aug 1871; leg. G. Winter; Ex herb. de Thümen; sub: *P. graminis* Pers. f. *Cynodontis dactylis*; in foliis emortuis vel languidis ejusdem; Aug 1875; leg. P. A. Saccardo; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Sphaeria graminis* Pers., sulle foglie del *Cynodon dactylon*; a Vigheffio presso Parma; Autunno 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; ad folia graminum; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Phyllachora heraclei (Fr.) Fuckel [*Phyllachoraceae*]

sub: *Dothidea heraclei* Fr., sur les feuilles de l'*Heracleum spondylium*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Phyllachora junci (Alb. & Schwein) Fuckel [*Phyllachoraceae*]

sub: *P. junci* Fuckel; Anglia: Derbyshire; Mar 1874; leg. E Brittain; Ex herb. de Thümen.

Phyllachora pteridis (Rebent.) Fuckel [*Phyllachoraceae*]

sub: *P. pteridis* Fkl.; Piuzgan; leg. Sauter.

Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe guttata* a. *fraxini* Link; sur les feuilles du frane, aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *E. guttata* b. *coryli* Fr.; sur les feuilles du noisetier; dans le jardin de M. le lieutenant Wahis, Sauborg de Bruges, près de Menin; sub: *E. guttata* a. *coryli* Link; su foglie secche di nocciolo; nella Val di Bieno in Valle Intrasca, Lago Maggiore; 1863; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *E. guttata* a. *coryli* Link; su foglie secche di nocciolo; Serravalle Scrivia; 1863; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. suffulta* Sacc.; sur les feuilles du *Corylus avellana* cultivé; Beynost; Automme 1882; Dr A. Magnin; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *P. suffulta* Sacc.; sur les feuilles du *Corylus avellana*; Aube: Méry-sur-Seine; 25 Septembre 1885; P. Hariot; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *P. guttata* Lév. f. *Betulae albae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex Herb. de Thümen; sub: *P. guttata* Lév. f. *fraxini*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex Herb. de Thümen; sub: *P. guttata* Lév.; dans les feuilles du [...], St Cron près de Marseille; 3. [...] 1874; sub: *P. guttata* Lév. f. *coryli*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex Herb. de Thümen; sub: *P. guttata* Lév. f. *hippohaes*; Nieder-Oesterreich: bei Krems, an einer einzigen Stelle, dort aber sebr Mufig, auf der daselbst ganz gemeinen *Hippophaë rhamnoides*, October 1871; de Thümen; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *P. guttata* Lév.; 9. 1878; leg. Dietz; ex Herb. Richter, Flora Hungarica; sub: *P. guttata* Lév. var. *coryli*; sur les feuilles du *Corylus avellana*; France-Fontainebleau (Seine-et-Marne); Automne 1886; Herbar Feuilleaubois; sub: *P. guttata* Lév. f. *carpini*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; sub: *P. guttata* Lév. f. *fraxini*; sulle foglie vegete del *Fraxinus excelsior*; Fondo Toce al Lago Maggiore; Autunno 1858; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Phyllactinia alnicola U. Braun [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphealni* DC., ssur les feuilles de *Alnus glutinosus*; à Boninne, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phyllactinia fraxini (DC.) Fuss [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe lamprocarpa* Lév. f. *ballotae*; parasitica in foliis *Ballota nigrae*; prope pagum Sziget lejfalù; legit 6 Juli 1873; Dr Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* Lév. f. *Stachydis germanicae*; in foliis *Stachydis germanicae*; prope pagum Sziget lejfalù; legit 10 Juli 1873; Dr Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* Lév. f. *Xanthi italici*; ad ejusd. folia; Vigheffio prope Parma; autumnno 1875; G. Passerini; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* Lév. f. *marrubii*; in foliis *Marrubii vulgaris*; prope pagum Sziget lejfalù; legit 12 Julio 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* Lév. f. *marrubii*; in foliis *Marrubii cardiaci*; prope pagum Sziget lejfalù; legit 10 Julio 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* Lév.; ad *Stachydis palustris* folia; Zürich, Helvetiae; Octb. 80; leg. G. Winter; sub: *E. lamprocarpa* Lév. f. *Leonuri cardiaci*; in foliis *Leonuri cardiaci*; prope pagum Sziget lejfalù; legit 10 Juli 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *E. lamprocarpa* f. *plantaginis* Link; sur les feuilles du *Plantago major*; aux environs de Courtrai; sub: *E. lamprocarpa* Lév.; parasitica in foliis *Artemisia vulgaris*, Hungaria centralis, Comitatus Pest. Insula Danubialis, Csepel; prope pagum Sziget lejfalù; Dr. Jul. Aug. Tauscher.

Phyllactinia mali (Duby) U. Braun [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysiphe mali* Duby, sur les feuilles des pommiers; aux environs de Namur; Mr J. Barbier.

Phyllosticta orbicularis (Ehrenb.) U. Braun [*Erysiphaceae*]

sub: *Erysibe orbicularis* Link, in foliis languescentibus *Fagi sylvaticae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Polyporus evonymi* Kalchbr.; ad basin truncorum vivorum *Euonymi europaei*; Saxonia: Königstein; Nov. 1881; leg. W. Krieger; de Thümen, Mycotheca universalis; sub: *Polyporus ribis* (Schumach.) Fr., sulle vecchie ceppaie del *Ribes rubrum*; negli orti di Parma; 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Phyllosticta andromedae Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles de l'*Andromeda cassiniifolia*; au jardin de Mr Devriesere, Horticulteur, à Courtrai.

Phyllosticta asclepiadearum Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles de l'*Hoya carnosa*; dans la serre de Mr D'Hondt, horticulteur, à Courtrai; Mr Crépin l'a également trouvé sur les feuilles du *Cynanchum vincetoxicum*, à Hans-sur-Lesse.

Phyllosticta convallariae Pers. [*Phyllostictaceae*]

sub: *P. cruenta* Fr.; sulle foglie della *Convallaria multiflora*; dintorni di Biella; Estate 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. cruenta* Fr.; sulle foglie della *Convallaria multiflora*; da Bignasco di Val Maggia in Cantone Ticino; Estate 1860; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. cruenta* Fr.; *Convallaria polygonorum*; bei Glaggenitz; leg. Heufler; sub: *P. cruenta* Fr.; sur les feuilles du *Convallaria multiflora*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phyllosticta cornicola (DC.) Rabenh. [*Phyllostictaceae*]

Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Phyllosticta coryli Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles du Coudrier; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Phyllosticta cruenta (Fr.) J. Kickx f. [*Phyllostictaceae*]

sub: *Ascospora cruenta* Fr., Parma; 8.1874; leg. Passerini; Ex herb. de Thümen.

Phyllosticta cynarae Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les fueilles languissantes du *Cynara scolymus*; dans les jardins légumiers; à Courtrai.

Phyllosticta digitalis Bell. [*Phyllostictaceae*]

a la face supérieure des feuilles *Digitalis lutea*; aux environs de Rochefort; M' l' Abbé Bellynck et Mr Crépin.

Phyllosticta fragaricola Roberge ex Desm. [*Phyllostictaceae*]

sub: *P. fragaricola* (Wallr.) Rabenh.; Bohemia: Tetschen; 9. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *P. fragaricola* (Wallr.) Rabenh.; auf *Fragaria virginiana*; im botanischen Garten zu Berlin; im Juli 1873; leg. P. Magnus; Rabenhorst, Fungi europaei.

Phyllosticta lauri Westend. [*Phyllostictaceae*]

epiphyllie sur les feuilles languissantes du laurier (*Laurus nobilis*); dans les jardins.

Phyllosticta mercurialis Desm. [*Phyllostictaceae*]

sur la *Mercurialis annua*; le long du chemin de fer de Courtrai, à Henie.

Phyllosticta nerii Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles du *Nerium oleander*; au jardin du collège de la Paix, à Namur; Mr Bellynck.

Phyllosticta philoprina (Berk. & M.A. Curtis) Wikee & Crous [*Phyllostictaceae*]

sub: *Sphaeria ilicis* Fr., sur les feuilles mortes, mais encore attachés à l'arbre du Houx (*Ilex aquifolium*).

Phyllosticta primulicola Desm. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Primula veris* et *P. elatior*; aux environs de Courtrai.

Phyllosticta rhamni Westend. [*Phyllostictaceae*]

à la face supérieure des feuilles du *Rhamnus frangula*; dans les bois taillis des environs de Beverloo; Juillet.

Phyllosticta ruscolica Durieu & Mont. [*Phyllostictaceae*]

sub: *P. ruscolica* Desm.; sur les feuilles du *Ruscus aculeatus*; dans les jardins; le R. P. Clém. Dumont.

Phyllosticta sagittariae Rabenh. [*Phyllostictaceae*]

saepius in consortio *Macrosporii heteronemi* Desm.; Rabenhorst; Rabenhorst, Fungi europaei.

Phyllosticta sorghi Anzi [*Phyllostictaceae*]

in foliis *Sorghii saccharati*; in agro Novo-Comensi; Octobre; leg. Anzi; Rabenhorst, Fungi europaei.

Phyllosticta ulmi Westend. [*Phyllostictaceae*]

sur les feuilles mourantes de l'Orme; aux environs de Louvain; M' Ed. Martens.

Phyllosticta violae Desm. [*Phyllostictaceae*]

Reichenberg in Bohemia; leg. Wilh. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei; sur les feuilles languissantes de la violette odorante; au parc de St George, à Courtrai.

Phyllosticta vulgaris Desm. [*Phyllostictaceae*]

sub: *P. vulgaris cerasi* Desm.; sur les feuilles du *Prunus virginiana*; à Courtrai.

Physalospora scirpi (Gutner) Arx sub: [*Camarosporiaceae*]

sub: *Camptoum curvatum* Link; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *C. curvatum* Link; in foliis aridis *Scirpi sylvatici*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary [*Peronosporaceae*]

sub: *Botrytis infestans* Pers.; Befüllt die Bitter von *Solanum tuberosum* L.; veranlasst Teldtung der Pflanze; Stockung und nulniss in den knollen; Wiirttemberg; sub: *Peronospora infestans* de Bary f. *lycopersici*; Nassovia: Wiesbaden; 9. 1973; Ex Herb. de Thümen; sub: *Peronospora infestans* Mont.; ad *Solani tuberosi* folia; Ztirich, Helvetiae; 8. 1880; leg. G. Winter.

Piggotia ulmi (Grev.) Keissl. [*Didymellaceae*]

sub: *Asteroma ulmi* Grev.; sur les feuilles de l'*Ulmus campestris*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Pileolaria terebinthi (DC.) Castagne [*Pileolariaceae*]

sub: *Pileolaria terebinthi* Castagne; sulle foglie del *Pistacia terebinthus*; ad Albissola Marina, Liguria occidentale; Autunno 1868; Gibelli, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub:

Pileolaria terebinthi Cast.; sur les feuilles du *Pistacia terebinthus*; aux Martegam, près de Marseille; 23 aoin 1874; sub: *Uredo terebinthi* DC., sur les feuilles du *Pistacia terebinthus*; près Le Luc (Var, France); 3 Juillet 1867; rec. Hanry; F. Schultz et F. Winter, Herbarium normale ser. II.

Pilidium carbonaceum (Lib.) Berk. & Broome [*Chaetomellaceae*]
ad ramos salicinos; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Pilidium disseminatum Lib. [*Chaetomellaceae*]
ad folia delapsa *Aceris pseudoplatani*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Piloderma bicolor (Peck) Jülich [*Atheliaceae*]
sub: *Sporotrichum fallax* Lib., in fagetis ad folia dejecta, truncos et radices herbarum muscorumque; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert [*Sclerodermataceae*]
sub: *Polysaccum pisocarpium* Vittad.; nei prati arenosi; Cascine di Pisa; Settembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polysaccum pisocarpium* Fr.; Glaggenitz bei Duisburg; Heufler.

Plagiostoma salicellum (Fr.) Sogonov [*Gnomoniaceae*]
sub: *Diplodina microsperma* (Johnston) B. Sutton, sub: *D. salicis* Westend.; sur les branches du Saule-plumeur; dans le pare de Saint-George, à Courtrai; sub: *Sphaeria salicella* Fr., assez commune sur les rameaux morts du saule. Nouvelle pour la Flore Belge.

Plasmopara densa (Rabenh.) J. Schröt. [*Peronosporaceae*]
sub: *Peronospora densa* Rabenh., a Parma; né prati suburbani; sulle foglie del *Rhinanthus minor*; primavera 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.; sub: *P. densa* de Bary f. *Rhinanthi minoris*; Franconia; Bayreuth; 6. 1874; Ex herb de Thümen.

Plasmopara obducens (J. Schröt.) J. Schröt. [*Peronosporaceae*]
sub: *Peronospora obducens* J. Schriit., auf der Unterseite der Cotyledon von Impatiens nolitangere; im Mai 1877, in der Geggenau bei Rastatt in Baden; Dr Schröter; Rabenhorst, Fungi Europaei.

Plasmopara nivea (Unger) J. Schröt. [*Peronosporaceae*]
sub: *Peronospora nivea* de Bary; Hungaria centralis; Comitatus alba; in foliis maxime radicalibus Conii maculati prope oppidum Ercsi; legit 16 Junio 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Peronospora nivea* de Bary f. *aegopodii*; Austria inf.: Krems; 6. 1871; Ex Herb. de Thümen, sub: *Peronospora nivea* Unger; ad *Angelicae silvestris* L. folia viva; Zürich berg pr. Ztirich (Helvetiae); raro; September 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 187; sub: *Peronospora nivea* de Bary; Hungaria centralis; Comitatus alba; in foliis Conii maculati prope oppidum Ercsi; legit 19 Junio 1873; Dr. Jul. Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei.

Plasmopara viticola (Berk. & G. Winter) Berl. & De Toni [*Peronosporaceae*]
sub: *Peronospora viticola* Berk. & Curt.; sur les feuilles de la vigne; France: Fontainebleau (Seine-et-Marne); Juillet 1886; Herbiere Feuilleaubeis.

Plenodomus agnitus (Desm.) Gruyter, Aveskamp & Verkley [*Incertae Sedis*]
sub: *Leptosphaeria agnita* Desm.; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *L. agnita* Ces. & De Not.; steli secchi di Eupatorium cannabinum; lungo la Baganza, a S. Ruffino, presso Parma; Estate 1871;

Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *L. agnita* Desm.; in caulibus siccis *Eupatorium cannabinum*; Frankfurt ad M.; leg. Bagge; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pleomassaria siparia (Berk. & Broome) Sacc. [*Pleomassariaceae*]

sub: *M. siparia* De Not.; sui ramoscelli di betulla; Orto botanico di Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. siparia* Ces. et De Not.; sui ramoscelli della *Betula alba* morti sulla pianta; nell'Orto botanico di Parma; Febbraio 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Pleonectria pyrrohochlora (Auersw.) G. Winter [*Incertae Sedis*]

sub: *Nectria pyrrohochlora* Awd.; in *Aceris campestris* ramulis siccis; Arnstadae; leg. Fleischhack; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pleospora gei-reptantis Carestia [*Pleosporaceae*]

sulle foglie del *Geum reptans*; in vetta all'Alpe Valdobbia, a Gressoney Saint Jean; 1868; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Pleurothyriella pinastris (Oudem.) Petr. & Syd. [*Incertae Sedis*]

sub: *Phoma pinastris* Westend. p. *foliorum* Lév.; Harth bei Leipzig; Wrtz 1872; leg. G. Winter; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *P. pinastris* Lév.; Franconia: Bayreuth; 4. 1874; Ex herb. de Thümen.

Pleurothyrium longissimum (Lib.) Bubàk [*Incertae Sedis*]

sub: *Leptostroma longissimum* Lib.; ad stipes *Aspidii filicisloeminae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Pleurotus lingulatus (Paulet) Sacc. [*Pleurotaceae*]

sub: *Agaricus sementino* Viv.; né monti sopra Genova, tra la valle della Polcevera e quella di Bisagno; Novembre 1868; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Pleurotus nebrodensis (Inzenga) Qué. [*Pleurotaceae*]

sub: *Agaricus nebrodensis* Inzenga; sulle radici fracide di diverse ombrellifere; al liquefarsi delle nevi; né Monti Nebrodi in Sicilia; Inzenga; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. [*Pleurotaceae*]

sub: *P. ostreatus* f. *macropus*; su cumuli di avanzume degli olivi; in Noli, nella Liguria occidentale; Febbraio 1870; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Pleurotus salignus* (Schrad.) Qué., Bohemia: Teplitz; 11. 1873; Ex herb. de Thümen.

Ploettnera solidaginis (Ces.) B. Hein [*Calloriaceae*]

sub: *Cryptodiscus solidaginis* Ces., sugli steli disseccati della *Solidago virga-aurea*; nei monti del Biellese; Autunno 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Podisoma juniperi-communis Fr. [*Gymnosporangiaceae*]

sul *Juniperus communis*; nelle selve sopra Orselino nel Canton Ticino; Maggio 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Podosphaera kunzei Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *P. kunzei* Lév.; sulle foglie del *Prunus spinosa* a Collecchio e Vighèffio nell'agro parmense; autunno 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. kunzei* Lév. f. *padi*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874.

Podosphaera fuliginea (Schltdl.) U. Braun & S. Takam. [Erysiphaceae]

sub: *Erysiphe fuliginea* Fr., sur les feuilles des véroniques à feuilles glabres, ainsi que sur celles de la *Sanguisorba officinalis*. Nos échantillons ont été recoltés dans la station du chemin de fer à Courtrai; sub: *E. fuliginea* a. *veronicarum* Fr.; sur les feuilles d'une veronique; dans un jardin à Vlierbeeck, près de Louvain; M' l'Abbé Leburton.

Podosphaera macularis (Wallr.) U. Braun & S. Takam. [Erysiphaceae]

sub: *Erysiphe humuli* Duby; sulle foglie del luppolo; in territorio di Oldenico nel Vercellese; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Erysiphe macularis* a. *humilis* Fr.; sur les feuilles du houblon; aux environs de Courtrai.

Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary [Erysiphaceae]

sub: *Erysiphe pannosa* Link, in ramis calycibusque *Rosae villosae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Polyporus lipsiensis (Batsch) E.H.L. Krause [Polyporaceae]

sub: *Ganoderma lipsiense* (Batsch.) Atk.; su alberi diversi; a Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Polysaccum cranium Lév. [Sclerodermataceae]

Ajaccio.

Polystigma fulvum Pers. ex DC. [Phyllachoraceae]

sub: *Cenangium padi* Fr., ad ramos exsiccatos *Pruni padi*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832); sub: *C. padi* f. *pycnidifera*; in pado; Aug.; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; in *Pruno pado*; Lindberg; leg. Heufler; sub: *Hypocrea fulva* (DC.) De Not., su foglie vegete di un ciliegio; a Macugnana, Valle Intrasca; Autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polystigma aurantiacum* Pers. ex Fr., croît à la face supérieure des feuilles des poiriers et de pommiers dans les jardins; nous l'avons également trouvée sur les feuilles de l'aubépin et chose digne de remarque, c'est que cette espèce est presque toujours en société avec les *Roestelia* ou les *Aecidium* qui croissent sur ces feuilles.

Polystigma rubrum (Pers.) DC. [Phyllachoraceae]

sub: *Polystigmia rubra* Pers.; sur les feuilles des amandiers; à Marignon; 13 août 1874; sub: *P. rubrum* Pers. f. *pruni-spinosae*; Franconia; Bayreuth; Aug 1874; Ex Herb. De Thümen; sub: *P. rubrum* DC.; sulle foglie del *Prunus spinosa*; ad Oldenico presso Vercelli; 1858; Malinverni; sub: *Septoria rubra* Desm.; sur les feuilles du *Prunus spinosa*; aux environs de Namur; M l'Abbé Bellyneck.

Polythrincium trifolii Kunze [Mycosphaerellaceae]

sulle foglie del *Trifolium stellatum*; presso Cagliari; Maggio 1864; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano; sul *Trifolium repens*; nei dintorni di Firenze, presso Parma; 1863; Caldesi, Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. trifolii* Kunze f. *trifolii incarnati*; Borussia rhen: Bonn; 11. 1873; leg. Kornicke; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles des tréfiles; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Porodaedalea pini (Brot.) Murrill [Hymenochaetaceae]

sub: *Trametes pini* (Brot.) Fr., pineta; Ravenna; Giugno 1864; Caldesi; sul *Pinus pinea*; nella Selva Pisana; Settembre 1863; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Poronia oedipus (Mont.) Mont. [Xylariaceae]

sub: *P. oedipus* Mont.; sugli escrementi equini; nei prati delle cascate di Pisa; Novembre 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Pronectria lichenicola (Ces.) Clem. [Bionectriaceae]

sub: *Cryptodiscus lichenicola* Ces., sulla *Peltigera canina* languente; nei dintorni di Biella in Piemonte; Maggio, Agosto 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Propolis panizzi (De Not.) Sherwood [Marthamycetaceae]

sub: *Stictis panizzei* De Not.; sulle foglie sternate degli ulivi; San Remo; 1869; Panizzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sulle foglie degli ulivi scosse al suolo; all'Isola Palmaria; Ottobre 1857; Doria.

Prostheciium pyriforme Jaklitsch & Voglmayr [Melanconidaceae]

sub: *Stilbospora pyriforme* Corda; in cortice *Aceris pseudoplatani*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); sub: *Stegosporium pyriforme* Corda; sur des branches mortes du hêtre; au jardin de Mr Devriesere, jardinier-fleuriste; à Courtrai; Février; sub: *Stegosporium pyriforme* Corda; sulla corteccia di un tronco d'*Acer pseudoplatanus* morto; a S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Protomyces macrosporus Unger [Taphrinacea]

sub: *P. macrosporus* Unger f. *aegopodii*; Franconia; Bayreuth; Sept 1874; Ex herb. de Thümen.

Pseudocercospora depazeoides (Desm.) U. Braun & Crous [Mycosphaerellaceae]

sub: *Exosporium depazeoides* Desm., in foliis vivis *Sambuci nigrae*; prope Graz, Helvetiae; Sept.; G. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.

Pseudocercospora lilacis (Desm.) Deighton [Mycosphaerellaceae]

sub: *Exosporium lilacis* Desm., sur les feuilles du Lilas; France: Chailly (Seine-et Manie); Novembre 1883; Herbarium Feuilleaibois; sur les feuilles vivantes du Lilas commun; dans les jardins, à Courtrai.

Pseudocercospora eryngii (Westend.) U. Braun [Mycosphaerellaceae]

sub: *Septoria eryngii* Westend., sur les feuilles de l'*Eryngium maritimum*; dans les dunes de Nieuport; le R. P. Clém. Dumont.

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer [Pseudoclitocybaceae]

sub: *Agaricus cyathiformis* Fr.; in arvis graminosis; Sero Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Pseudomicrostroma juglandis (Bérenger) Kijp. & Aime [Incertae Sedis]

sub: *Microstroma pallidum* Messl., Austria inf.; Mautern; 8. 1870; Ex herb. de Thümen.

Pseudonectria buxi (DC.) Seifert, Gräfenhan & Schroers [Nectriaceae]

sub: *Chaetostroma buxi* Corda, sulla pagina inferiore delle foglie morte del bossolo; a Villagrappa presso Forti; Novembre 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Pseudoophiobolus erythrosporus (Riess) Phookamsak, Wanas. & K.D. Hyde [Phaeosphaeriaceae]

sub: *Rhaphidophora urticae* Rabenh.; su steli fracidi di *Urtica dioica*; nel suburbio di Parma; Marzo 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Pseudoophiobolus mathieui (Westend.) Phookamsak, Wanas., S.K. Huang, Camporesi & K.D. Hyde [Phaeosphaeriaceae]

sub: *Sphaeria mathieui* Westend., sur les tiges mortes de l' *Oenothera biennis*; dans les plantations du camp de Beverloo. *Sphaeria mesascium* De Not.; sub: *S. mesascium* f. *pyri* De Not.; sulla scorza di un vecchio pero; a Vigheffio, presso Parma; Autunno 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Pseudopeziza caricina (Lib.) Sacc. [Drepanopezizaceae]

sub: *Peziza caricina* Lib., in foliis emortuis *Caricis patulae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Pseudopeziza medicaginis (Lib.) Sacc. [Drepanopezizaceae]

sub: *Phacidium medicaginis* Lib., croit sur la surface supérieure des feuilles vivantes de la Luzerne (*Medicago sativa*); in foliis *Medicaginis willdenovii*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Pseudopeziza trifolii (Biv.) Fuckel [Drepanopezizaceae]

sub: *Ascobolus trifolii* Biv., sur les feuilles languissantes de plusieurs especes de trefle; aux environs de Menin; espee nouvelle pour la fore Beige.

Pseudorhytisma bistortae (DC.) Juel [Rhytismataceae]

sub: *Rhytisma bistortae* Lib.; sur les feuilles du *Polygonum bistorta*; dans le Luxembourg; Mr Tosquinet; sub: *Rhytisma bistortae* Lib.; in foliis vivis *Polygoni bistortae*; aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*.

Pseudoseptoria everhartii (Sacc. & P. Sydow) B. Sutton [Sacrotheciaceae]

sub: *Septoria calamagrostidis* Westend.; sur les feuilles vivantes du *Calamagrostis sylvatica*; dans les bois entre Bande et le relai de Champlon, Luxemburg; Mr Crepin.

Pseudotryblidium neesii (Körb.) Rehm [Incertae Sedis]

sub: *Peziza neesii* Flot., sulla corteccia dell' *Abies pectinata*; a Riva in Valsesia; 1865; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Psilachnum chrysoctigmum (Fr.) Raitv. [Pezizellaceae]

sub: *Peziza aspidiicola* Berk. & Broome, ad *Pteridis aquilinae* caules putridos; "Sihlwald" prope Ztirich (Helvetiae); raro; Juli 1880; leg. G. Winter.

Psilonia festucae Lib. [Nectriaceae]

in foliis aridis *Festucae sylvaticae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Psilonia luzulae Lib. [Nectriaceae]

ad folia *Luzulae maximae*, Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Pterula subulata Fr. [Pterulaceae]

dintorni di Faenza; Autunno 1862; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia acetosae (Schumach.) Körn. [Pucciniaceae]

sub: *Uredo apiculata* Chev., sur les feuilles du haricots; sub: *Uromyces apiculatus* F. Lév.; sulle foglie del *Cytisus laburnum*; presso Riva in Valsesia e nell'agro Lucchese; 1862; Carestia, Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia acuminata Fuckel [*Pucciniaceae*]

Dania: Skarup; 8. 1874; leg. Rostrup; Ex herb. de Thümen.

Puccinia adoxae R. Hedw. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. adoxae* DC.; Borussia rhen: Bonn; 5. 1874; leg. Kornicke; Ex herb. de Thümen; sub: *P. adoxae* DC.; sur les feuilles et les pétioles de l'*Adoxa moschatellina*; aux environs d'Auvers, d'ou Mr Vandennest nous l'a envoyé; le Rév. Père Bellynck nous l'a aussi communiqué des environs de Namur; printemps.

Puccinia aegopodii (Schumach.) Link [*Pucciniaceae*]

sub: *P. aegopodii* Link.; Austria inf.: Krems; 6. 1871; Ex herb. de Thümen; sub: *P. aegopodii* Link.; sur les feuilles de l'*Aegopodium podagraria*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Puccinia albescens (Grev.) Plowr. [*Pucciniaceae*]

Borussia rhen: Bonn; 4. 1874; leg. Kornicke; Ex herb. de Thümen; sub: *Aecidium adoxae* Duby; sur les petioles et les feuilles de l'*Adoxa moschatellina*; Dreux (Eure-et-Loir): France; Mai 1866; Gallet; Herbarium Feuilleaobois; sub: *A. adoxae* Duby; sur les feuilles de l'*Adoxa moschatellina*; a Fooz pres de Namur; Mr l'Abbe Bellynck.

Puccinia albulensis Magnus [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia veronicarum* DC., sulla *Veronica urticaefolia*; ad Oropa e S. Giovanni d'Andomo, provincia di Biella; Agosto, Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; Tyrol; leg. Hausmann; Ex herb. de Thümen.

Puccinia alliorum Corda [*Pucciniaceae*]

sur les tiges mortes de plusieurs espèces d'*Allium*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Puccinia angelicae (Schumach.) Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *Didymosporium bullatum* Fr., sur les tiges mourantes du *Libanotis vulgaris* DC.; sur les rochers de Poilvache, près de Namur; M' Bellynck.

Puccinia annularis (F. Strauss) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia scorodoniae* Link, in foliis *Teucri scorodoniae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); Anglia: Kings Lynn; leg. Plowright; sur les feuilles du *Scorodonia teucrium*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *P. scorodoniae* Link; Caen; 1860; Caldesi.

Puccinia apii Desm. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. apii* Corda; Borussia rhenana: Bonn; leg. Kornicke; Ex herb. de Thümen; sub: *P. apii* Corda; sur les feuilles vivantes de l'*Apium graveolens*; a St. [...], près de Marseille; Août 1874; sub: *P. apii* Corda; sui sedani; negli orti a Panna; Erbario Crittogamico Italiano; sur les deux faces des feuilles du *Apium graveolens*; aux environs de Courtrai.

Puccinia arenariae (Schumach.) J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia dianthi* DC., sur les feuilles du *Dianthus barbatus*; dans la station du chemin de fer à Courtrai; sub: *Puccinia lychnidearum* Link, sulla *Lychnis sylvestris*; a Pettinengo nella provincia di Biella; Giugno 1857; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Puccinia moehringiae* Fuckel, [...]; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Puccinia spergulae* DC., Franconia: Bayreuth; 10.1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Puccinia stellariae* Duby, sulla *Moehringia trinervia*; nei dintorni di Biella,

in Piemonte; Giugno 1859; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; de Thümen, Fungh. Suph. n. 365; sub: *P. stellariae* Corda; sur les feuilles de l'*Alsine inedia*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Puccinia argentata (Schultz) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia nolitangere* Corda, sull' *Impatiens nolitangere*; a Riva in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les feuilles de l'*Impatiens noli-tangere*; à La Hulpe, près de Bruxelles; Mr Mathieu. — Bohemia: Teplitz; 9. 1873; Ex herb. de Thümen.

Puccinia aristolochiae (DC.) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sull' *Aristolochia pallida*; in luoghi asciutti ed esposti a meriggio, presso Maneille in Val di S. [...], circondario di Pinerolo; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia aristolochiarum Corda [*Pucciniaceae*]

sull' *Aristolochia rotunda*; nella Valle del Serchio in Toscana; 1864; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia arundinacea R. Hedw. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. arundinacea* Hedw.; Franconia: Bayreuth; 9.1874; leg. Dr Walther; Ex herb. de Thümen; sulle foglie della *Phragmites communis*; a Bolzano nel Tirolo italiano; 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. arundinacea* Tul. var. *epicaula* Wallr.; sur les gaines du roseau à balais (*Arundo phragmites*); sub: *P. arundinacea* Tul.; in *Phragmites*; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *P. arundinacea* var. *epiphylla* Wallr.; sur les feuilles du roseau à balais (*Arundo phragmites* L.).

Puccinia asari Link [*Pucciniaceae*]

de Thümen, Fungh. Suph. n. 801; sub: *P. asari* Kunze et Schmidt; sulle foglie dell'*Asarum europaeum*; presso il Casino dé Boschi, provincia di Parma; 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia asparagi DC. [*Pucciniaceae*]

in caule et foliis *Asparagi officinalis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); in un orto a Vigheffio presso Parma; Autunno 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sull'*Asparagus officinalis*; nei dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale; Ottobre 1870; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les tiges de l'asperge cultive; dans les jardins; Septembre.

Puccinia asphodeli (DC.) Duby [*Pucciniaceae*]

sub: *P. asphodeli* Duby; sulle foglie di asfodelo; al colle di Freius fra la Valle della Doria riparia superiore (Bardonecchia) e quella dell'Arc in Savoia; Agosto 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia atragenes W. Hausm. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie dell' *Atragene alpina*; al monte Ritten sopra Bolzano, nel Tirolo meridionale; estate 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia balsamitae (F. Strauss) Rabenh. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. balsamitae* Strauss; Wallendorf (Hungaria); leg. Kalchbrenner; Ex herb. de Thümen.

Puccinia balsamorrhizae Peck [*Pucciniaceae*]

Salt Lake City; August 1883; collected by Marcus E Jones A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah.

Puccinia betonicae (Alb. & Schwein.) DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. betonicae* DC.; Anglia: Manchester; leg. Brittain; Ex herb. de Thümen; sub: *P. betonicae* DC.; sulle foglie di *Betonica*; dalla Valle di S. Martino, circondario di Pinerolo; Rostan; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. betonicae* DC.; sulle foglie di *Betonica*; dai dintorni di Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. betonicae* DC.; sulle foglie di *Betonica*; dalla Valle del Serchio in Toscana; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. betonicae* DC.; sur les feuilles du *Betonica offi cinalis*; au château de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Puccinia bistortae (F. Strauss) DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. bistortae* DC.; in foliis *Polygoni bistortae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *P. bistortae* Strauss; ad *Polygoni bistortae* L. folia viva; prope Cellarina, Ober Engadin (Helvetiae); frequentissimae; alt. ca. 1730 m; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 130; sub: *P. bistortae* DC.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 943; sub: *P. bistortae* DC.; sur les feuilles du *Polygonum bistorta*; à Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *P. bistortae* Fuckel; sulle foglie del *Polygonum bistorta* e *P. viviparum*; in Valle di Sotto e in Valtellina; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia brachypodii G. H. Otth var. *brachypodii* [*Pucciniaceae*]

sub: *P. baryi* Berk. et Br.; ad *Brachypodi sylvatici* Mina. et Schultz folia viva languidaque; prope Zürich; October 1880; G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 128; sub: *P. brachypodii* Fuckel; in foliis *Brachypodi sylvatici*; prope Briinn; Autumno; leg. G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Uredo poae-sudeticae* Westd.; sur les feuilles du *Poa sudetica* West.; entre Tellin et les baraques de Transine, Luxembourg; Mr Crépin.

Puccinia brickelliae Peck [*Pucciniaceae*]

Bowie; 16 September 1884; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Puccinia bulbocastani (A. Cumino) Fuckel [*Pucciniaceae*]

in sylvibus pedemontani; Vere; Passerini.

Puccinia bupleuri F. Rudolphi [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium bupleuri* f. *Bupleuri falciati*; Bohemia: Teplitz; 5. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *P. bupleuri* Rud. f. *Bupleuri falciati*; Bohemia: Teplitz; 9.1873; Ex herb. de Thümen.

Puccinia buxi DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles vivantes du buis; à St. Pons de Gemenes; 6 Jun 1894; sulle foglie del bosso; nelle siepi a Valdottaro lungo il Serchio in Toscana; giugno 1858; Bicchi; sur les feuilles du buis; à Marche-les-Dames, près de Namur; Mrs le comte A. De Lemminghe et J. Barbier.

Puccinia calcitrapae DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia bardanae* Corda f. *Lappae minoris*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. bardanae* Corda f. *Lappae minoris*; Franconia: Bayreuth; 10.1874; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles du *Arctium lappa*; aux environs de Namur; Mr Bellynck; Kralovn; Arva megye; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; in *Lappa majoris*; Sept; Duchter; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Puccinia compositarum* Schtdl., sulle foglie di *Cirsium lanceolatum*; ad Oldenico, presso Vercelli; 1861; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; ad *Leontodontis hispidi* folia; Zürich, Helvetiae; Sept 1879; leg. G. Winter; ad *Crepidis biennis* folia caulesque; Zürich, Helvetiae; Sept 1879; leg. G. Winter; sur la *Centaurea aspera*; bords de l'Huveanne à la [...]; pres de Marseille; 28 Août 1874; sulle foglie del *Cirsium spinosissimum*; al monte Braulio, in Valtellina; Erbario

Crittogamico Italiano ser. II; sulla *Centaurea cyanus*; presso Faenza; Aug 1860; sur les tiges et les feuilles du *Centaurea calcitrapa*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Belynyck.

Puccinia calthae Link [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Caltha palustris*; souvent meld avec l' *Uredo calthae* et le *Puccinia caltharum*, aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.; ad *Calthae palustris* folia viva; prope St. Moriz, Ober Engadin (Helvetiae); frequens; alt. ca. 1800 m; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 139; presso il Santuario d'Oropa, né Monti Biellesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II, sur les feuilles du *Caltha palustris*; souvent male avec l' *Uredo calthae*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert; sub: *Uredo calthae* Rabenh., sur les feuilles du *Caltha palustris*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Puccinia caricina DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium grossulariae* DC.; Franconia: Bayreuth; 6. 1874; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles du *Ribes grossulariae*; au jardin du College de la Paix; a Namur; Mr l'Abbe Belynyck; sub: *P. caricina* DC. f. *Caricis hirtae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen.

Puccinia centaureae DC. var. *centaureae* [*Pucciniaceae*]

sub: *P. centaureae* f. *faceae*; Bohemia: [...]; 9.1873; Ex herb. de Thümen; ad *Centaurea faciae* folia; Zürich, Helvetiae; Oct 1879; leg. G. Winter; sur les feuilles de *Centaurea nigra* e *C. jacea*; aux environs de Charleroy; M' Tosquinet.

Puccinia chrysanthemi Roze [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia artemisiarum* Duby, de Thümen, Fungh. Suph. n. 728; sur les feuilles de l'*Artemisia vulgaris*; aux environs de Namur; Mr Belynyck; sub: *Uredo tanacetii* Lib., sur la face inferieure des feuilles de la Tanaïsse vulgaire; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Belynyck.

Puccinia circaeae Pers. [*Pucciniaceae*]

sulla *Circaea luteniana*; né luoghi silvestri presso Oldenico, provincia di Vercelli; Estate 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; su *Circaea luteniana*; September 1873; [...], Baden; leg. Schrader; Ex herb. de Thümen; in foliis *Circaea lutenianae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834); Parmae; Aestate; Passerini; sur les feuilles vivantes du *Circaea luteniana*; aux environs d'Audenarde; W Tosquinet.

Puccinia cirsii Lasch f. *cirsii* [*Pucciniaceae*]

sub: *P. cirsii* Lasch f. *Cirsii oleracei*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Puccinia clintonii Peck [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium pedicularis* Libosch., sur les tiges et les feuilles du *Pedicularia palustris*; dans les marais de bois; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Puccinia commutata P. Syd. & Syd. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia valerianae* Carestia, sulle foglie della *Valeriana celtica*; presso l'Ospizio di Valdobbia sopra Riva in Valsesia; Estate 1860; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia conglomerata (F. Strauss) Röhl. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. conglomerata* Strauss; ad *Senecionis cordati* Koch folia viva; in Monte "Speer" prope Wessen, St. Gallen (Helvetiae); rarissima; alt. ca. 1650; September 1860; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 133.

Puccinia convolvuli (Pers.) Castagne [*Pucciniaceae*]

sub: *P. convolvuli* Castagne; sulle foglie del *Convolvulus sepium*; presso Como; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia coronata Corda [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del *Rhamnus frangula*; ad Oldenico nel Vercellese; 1859; Autunno; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Rhamnus frangula*; dans les Bois de Belleghem, pres de Courtrai; sub: *P. coronata* Corda f. *Holci lanati*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. coronata* Corda b. *Lolii perennis*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. coronata* Corda; sur les feuilles languissantes de l'*Avena elatior*; à Coquelet, près de Namur; l'Abbé Bellynck; sub: *P. coronata* Corda 13 *Lolii* Bellk.; sur les feuilles du *Lolium perenne*; aux environs de Namur; Bellynck; sub: *P. coronata* Desm.; Caen; leg. Caldesi; sub: *P. coronata* Corda; su foglie di Graminacee; nei boschi di Larizzate, presso Vercelli; 1865; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.; Franconia: Bayreuth; Vere; 1874; Ex herb. de Thümen., sub: *Aecidium frangulae* Schumach. var. *fructigenum* Thum.; Franconia: Bayreuth; Vere; 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Aecidium irregulare* DC., sur les feuilles du *Rhamnus catharticus*; au Fond. d'Arquet, pres de Namur; J. Barbier; sub: *Aecidium rhamni* J. F. Gmel., sulle foglie del *Rhamnus frangula*; a Bolzano, nel Tirolo meridionale; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Rhamnus frangula*; dans les Bois de Belleghem, pres de Courtrai; sub: *Caecoma crassatum* Link, in foliis, petiolis, ramisque *Rhamni frangulae*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Puccinia cyani Pass. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo cyani* DC., sur les feuilles du *Centaurea calcitrapa*; près de la porte de Bruxelles, à Namur; M' l'Abbé Bellynck.

Puccinia cynodontis Lacroix ex Desm. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium plantaginis* Cesati, dintorni di Oldenico, provincia di Vercelli; Primavera 1857; Malinverni; sub: *P. cynodontis* Desm.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 229.

Puccinia dioicae Magnus [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia caricis* DC.; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *P. caricis* DC.; Dirmike; XII. 1871, Eihelbaum; Ex herb. de Thümen; sub: *P. caricis* Rebent.; ad *Caricis pilosae* folia; Zürich, Helvetiae; Febr. 1879; leg. G. Winter; sub: *P. caricis* Rebent.; ad *Caricis glaucae* folia; Zürich, Helvetiae; Sept 1879; leg. G. Winter; sub: *P. caricis* DC.; in *Caricis muricata*; Parmae; 1. 1877; G. Passerini.

Puccinia elymi Westend. var. *elymi* [*Pucciniaceae*]

sur la face supérieure des feuilles de l'*Elymus arenarius* L.; dans les dunes d'Ostende; d'ou M. Louis Landzweert.

Puccinia enormis Fuckel [*Pucciniaceae*]

ad *Chaerophylli villarsii* Koch folia, caules, fructus etc.; prope St. Moriz, OberEngadin (Helvetiae); frequentissimae; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 125.

Puccinia epilobi DC. [*Pucciniaceae*]

sull'*Epilobium hirsutum*; a Serravalle Scrivia; Estate 1860; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; montanum; nei monti dell'Oropa, nel Biellese; 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles de l'*Epilobium roseum*; au jardin du College de la Paix à Namur (Mr l'Abbé Bellynck), ainsi que sur les feuilles de la même plante; au jardin du College à Courtrai.

Puccinia eryngii DC. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie dell'*Eryngium campestre*; a Moresco, distretto di Fermo; Agosto 1864; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles de l'*Eryngium*; dans les jardins; le R. P. Clém. Dumont.

Puccinia falcariae Fuckel [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Pimpinella magna*; au chateau de Namur; Mr l'Abbe Bellyneck.

Puccinia festucae Plowr. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium periclymeni* DC.; sur les feuilles du *Lonicera periclymenum*; au chateau de Namur; R. P. Bouquenand.

Puccinia flosculosorum Röhl. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. flosculosorum* Alb. et Schwein; ad *Cirsi spinosi* folia viva; "Albula-Pass" prope Ponte (Rhaetiae); Alt. 2100 m; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 138.

Puccinia galii-vernii Ces. [*Pucciniaceae*]

Botzen, Tirol; C. Kerk; nei dintorni di Biella; primavera ed autunno 1857; Cesati; sub: *P. valantiae* Pers.; ad *Galii cruciati* folia; Zürich (Helvetiae); Octb. 1879; leg. G. Winter; sub: *P. valantiae* DC.; in *Galium mollugo*; Mai 1873; [...] bei Barshall; leg. D. Schroeter; Ex herb. de Thümen; sub: *P. valantiae* Pers.; sur les feuilles du *Vaillantia cruciata* Waldst.; au mont d'Avelghem; sub: *P. valantiae* var. *pallida* Lib.; sur les mêmes feuilles dans un bois attenat à la maison de M.elle Surmont de Volsberghe, près de Courtrai; Automne.

Puccinia gentianae (F. Strauss.) Link var. *gentianae* [*Pucciniaceae*]

sub: *P. gentianae* Link; sulla *Gentiana cruciata*; nei monti di Parma; Luglio 1869; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia gladioli Castagne [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Gladiolus segetum*; a Verdarn près Marseille; 7 Jul. 1874; sulle foglie del *Gladiolus segetum*; a Vigheffio, nel Parmigiano; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie del *Gladiolus segetum*; agro pisano; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia glechomatis DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. glechomae* DC.; sulla *Glechoma hederacea*; nelle vicinanze di Bolzano, Tirolo meridionale; Giugno 1869; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. glechomae* DC.; sur les feuilles du *Glechoma hederacea*; le long du chemin de fer de Courtrai, à Bruges; Septembre.

Puccinia globulariae DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles vivantes du *Globularia vulgaris*; dans les bois des environs de Han-sur Lesse (Namur); Mr Crépin.

Puccinia glomerata Grev. [*Pucciniaceae*]

[...]; ai Cappuccini; vicino la [...]; sub: *Puccinia senecionis* Lib., in foliis *Senecionis saracenicis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Puccinia gonolobi Ravenel [*Pucciniaceae*]

sub: *P. gonolobi* Rav. var. *Philibertiae* P'k.; Bowie; 17 September 1884; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Puccinia graminis Pers. subsp. *graminis* [Pucciniaceae]

sub: *P. graminis* Pers. f. *Agropyri repentis*; Franconia: Bayreuth; 4. 1874; Ex herb. de Thümen, sub: *P. graminis* Pers. f. *cynodontis*; Austria inf.: Krems; 3. 1871; Ex herb. de Thümen, sub: *P. graminis* Pers. f. *Poa annuae*; Franconia: Bayreuth; 10.1874; Ex herb. de Thümen, sugli steli dell'*Oryza sativa*; ad Oldenico, provincia di Vercelli; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano, sui culmi dell'*Agrostis vulgaris*; nelle pasture di Val Intrasca, Lago Maggiore; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sur les chaumes, les gaines et les feuilles de plusieurs espèces de gramineés, Botzen, Tirol; C. Kerk., sub: *P. graminis*, El Paso; 22 April 1884; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona, sub: *P. graminis* b. *epiphylla* Nob.; sur les feuilles des gramineés, sub: *P. graminis* var. *spicolorum*; épis de l'*Agropyron repens*, sub: *Aecidium berberidis* Gmel.; Austria inf.: Alauenthal pr. Krems; 5. 1870; Ex herb. de Thümen, sub: *Aecidium berberidis* Gmel.; Franconia: Bayreuth; 6. 1874; Ex herb. de Thümen, sub: *Aecidium berberidis* Gmel. var. *fructigenum* Lasch; Franconia: Bayreuth; 6. 1874; Ex herb. de Thümen, sub: *Aecidium berberidis* Gmel.; sulle foglie del *Berberis vulgaris*; ad Oldenico, provincia di Vercelli; primavera 1857; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano, sub: *Aecidium berberidis* Gmel.; sur les feuilles, les pétioles et même les fleurs de l'épine vinette (*Berberis vulgaris*); environs d'Ostende par M' Louis Lanszweert, sub: *Aecidium berberidis* Gmel.; Botzen; Haussman.

Puccinia helianthi-mollis (Schwein.) H.S. Jacks. [Pucciniaceae]

sub: *Puccinia helianthi* Schwein., de Thümen, Fungh. Suph. n. 369; in foliis *Helianthi annui*; Hungaria centralis-Comitatus Alba, prope oppidum; Eresi; 2 Sept 1872; Dr Julius Aug. Tauscher; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *P. helianthi* Fuckel; Ungrian; Oct 1878; leg. Dietz; ex Herb. Richter, Flora Hungarica.

Puccinia helvetica J. Schröt. [Pucciniaceae]

ad *Asperula taurinae* L. folia viva; in montibus "Churfürsten" prope Wallenstadt, St Gallen (Helvetiae); raro; altitud. ca. 600-800; Juni-August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 132.

Puccinia heterisiae H.S. Jacks. [Pucciniaceae]

sub: *Puccinia aspera* Dietel & Holw., sul *Thalichtrum foetidum*; nella Valle di S. Martino presso Perrero, circondario di Pinerolo; Giugno 1861; Rostan; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia heterochroa Roberge ex Desm. [Pucciniaceae]

Caen; Lenormand; 1860; Caldesi.

Puccinia hieracii (Röhl.) H. Mart. [Pucciniaceae]

sub: *P. hieracii* Mart.; Manchester (Anglia); Brittain.

Puccinia hystereum Röhl. [Pucciniaceae]

sulle foglie del *Tragopogon pratense*; ad Oldenico, provincia di Vercelli; primavera 1857; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; feuilles du *Tragopogon pratensis* L.; Aube: Saint-Martinles-Vignes; Mai 1890; A. Guyot; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *Aecidium tragopogoni* Pers., sur les feuilles du *Tragopogon pratensis*; aux environs de Namur; d'ou le R.P. A. Bourquenaud.

Puccinia iridis (DC.) Wallr. [Pucciniaceae]

sub: *P. iridis* Duby; Parmae; G. Passerini.

Puccinia kuhniae Schwein. [*Pucciniaceae*]

Bowie; 18 September 1884; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Puccinia lapsanae Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium compositarum* f. *doronici* Ces.; sulle foglie di *Doronicum*; presso Biella; 1857-58; Cesati, Malinverni, Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *A. compositarum* f. *senecionis* Ces.; sulle foglie di *Senecio fuchsii*; ad Oldenico (Vercelli) e Serravalle Scrivia; 1857-58; Cesati, Malinverni, Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; [...], Botzen; Haussman.; sub: *A. compositarum* Martin var b. *bellidis* Durieu & Mont.; sur les feuilles du *Bellis perennis*; aux environs de Louvain; Mr l'Abbe Leburton; sub: *P. lamsanae* Corda; ad *Lampsana communis* folia caulesque; Zarich; Oct 1879; leg. G. Winter; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. lamsanae* Fkl.; in *L. ramuni*; Parmae; Aestate; G. Passerini; sub: *P. lamsanae* Bellk.; sur les feuilles du *Lampsana communis*; à Namur; Mr Bellynck.

Puccinia liliacearum Duby [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del *Muscari comosum*; sulle foglie del *Muscari comosum*; al giardino pubblico di Parma; Aprile 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia littoralis Rostr. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. junci* Desm.; sur les chaumes des joncs; Bruxelles; Marissal.

Puccinia luzulae Lib. [*Pucciniaceae*]

in foliis *Luzulae vernalis*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830)*; sur les feuilles du *Luzula verna et L. pilosa*; à Gheluvelt; Automme; sub: *Puccinia oblongata* Link; ad *Luzulae campestris* DC. folia viva; Oerlikon prope Ztirich (Helvetiae); Raro; October 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 129.

Puccinia maculosa Schwein. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. chondrillae* Corda f. *Hypochoeridis glabrae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sulle foglie della *Prenanthis purpurea* e *P. tenuifolia* ancora vegete; all'Oropa nel Biellese; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; de Thümen, Fungh. Suph. n. 845; sub: *P. prenanthis* Fr.; Iglò; Jul 1878; Dietz; ex Herb. Richter, Flora Hungarica.

Puccinia malvacearum Bertero ex Mont. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. malvacearum* Mont. f. *Althaea roseae*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. malvacearum* Mont. f. *Malvae neglectae*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. malvacearum* Mont. f. *Malvae sylvestris*; Franconia: Bayreuth; 8.1874; Ex herb. de Thümen; ad *Malvae sylvestris* folia; prope Wesen (St. Gally); 10. 1879; leg. G. Winter; 2 Nov. 1873; Durieu de Maisonneuve; in foliis *Malvae*; Transilvania australis, [...]; 30. 8. 1878; sub: *P. malvacearum* Mont. var. *malvastri*; Salt Lake City; August 1883; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah; sub: *P. malvacearum* Mont. var. *malvastri*; Grant's; 1 Oct. 1884; collected by Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of New Mexico; Bologna; 5. 1889; F. Delpino; Herb. Delpino; Holubiy; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Puccinia menthae Pers. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium menthae* DC., Anglia: pr. Liverpool; 9. 1874; leg. Brittain; Ex herb. de Thümen; sub: *P. menthae* Tul.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 76, sub: *P. menthae* Pers. f. *Menthae arvensis*; Franconia: Bayreuth; 7. 1874; Ex herb. de Thümen; sulla *Mentha sylvestris*; presso Riva in Valsesia; 1862; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; sulla *Calamintha*; presso Bolzano, nel Tirolo merid-

ionale; 1862; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sulla *Mentha aquatica*; a Gajone presso Parma; Ottobre 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. menthae* Fuckel; Iglò; Aug. 1871; Dietz; ex Herb. Richter, Flora Hungarica; sur les feuilles des menthes; aux environs de Charleroy; d'ou notre ami, Mr le Médecin de Bataillon Tosquinet; sub: *Puccinia labiatarum* Schldl., sulla *Glechoma*; a Tenero, nel Canton ticino; 1862; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano; sul *Teucrium scorodonium*; a Biella in Piemonte; 1857; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Puccinia clinopodii* DC., sur les feuilles du *Clinopodium vulgare*; aux environs de Namur; Mr Bellynck; sub: *Uredo labiatarum* DC., sur les feuilles des Menthes et autres labiees.

Puccinia molinae Tul. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie e sui culmi della *Molinia serotina*; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Estate 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia montana Fuckel [*Pucciniaceae*]

ad *Centurea montana* folia caulesque; Leistheamn pr. Walensee; Oct 1879; leg_ G. Winter.

Puccinia mucronata Schumach. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. mucronata* var. *rubi* DC.; sur les feuilles de plusieurs espèces de Rubus; sub: *P. mucronata* var. *rosae* Pers.; sur les feuilles des Rosiers; au jardin de Mr Forster à Bruges.

Puccinia obtusa J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

Krems, Austria inf.; 9. 1871; Ex herb. de Thümen.

Puccinia pedunculata J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. rumicis* Bellk.; sur les tiges sèches du *Rumex scutatus*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Puccinia penstemonis Peck [*Pucciniaceae*]

Bowie; 18 Sept 1884; collected by Marcus E. Jones; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Puccinia phragmitis (Schumach.) Tul. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium rubellatum rumicis* Rabenh., nel territorio d'Oldenico, provincia di Vercelli; Autunno 1858; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia pimpinellae (F. Strauss) Link [*Pucciniaceae*]

sub: *P. pimpinellae* Link.; sur les feuilles du *Pimpinella magna*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Puccinia poarum Nielsen [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium tussilaginis* DC.; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Aecidium tussilaginis* DC.; in *Tussilago farfara*; Parmae; G. Passerini; sub: *Aecidium tussilaginis* Pers.; [...] Bonnes; Septembre 1850, Maggio 1851, Arcangeli; J. Arcangeli, Herbarium Francavillarum; sub: *Aecidium tussilaginis* Pers.; sur les feuilles du *Tussilago farfara*; à Saint-Gervais, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck; ainsi qu'aux environs de Charleroi; Mr Tosquinet; *Aecidium tussilaginis* Pers.; sulle foglie della *Tussilago farfara*; a Riva in Valsesia; Estate 1860; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia polygoni-amphibii Pers. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia amphibii* Fuckel, Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Puccinia polygonorum Schldl. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del *Polygonum viviparum*; al monte Cenisio; Agosto 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie del *Polygonum bistorta*; in valle Pusteria nel Tirolo meridionale; Estate 1861; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles languissantes du *Polygonum persicaria*; aux environs de Courtrai; Septembre.

Puccinia porri (Sowerby) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sub: *P. allii* Castagn.; sulle foglie dell' *Allium sativum* L.; a Panna; Luglio 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; *Allium* sp.; Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *Uredo alliorum* DC., porreau (*Allium porrum*).

Puccinia primulae (DC.) Duby [*Pucciniaceae*]

sub: *Uromyces primulae* (DC.) Lév., sulle foglie della *Primula latifolia*; nei monti della Valsesia; estate 1870; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *P. primulae* DC.; ad *Primulae elatioris* Jacq. folia viva; in monte "Speer" prope Wesen, St Gallen (Helvetiae); raro; Altitud. ca. 1000 meter; September 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 135.

Puccinia pulverulenta Grev. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium epilobi* Desm.; Coen; 1860; Lenormand; sur les feuilles de l'*Epilobium roseum*; au jardin du College de Courtrai; été; sulle foglie dell'*Epilobium hirsutum*; presso Oldenico, provincia di Vercelli; Estate 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Puccinia punctata Link [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia galiorum* Link f. *Molluginis*; Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen; Parmae; aut. 1872; G. Passerini; in *Galium aparine*; Parmae; Aestate; G. Passerini.

Puccinia punctum Link [*Pucciniaceae*]

Carice; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; crósit sur les feuilles de plusieurs espèces de *Carex*; ainsi que sur celles de quelques Liliacées; près la porte de Bruges à Courtrai; assez rare.

Puccinia recondita Roberge ex Desm. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles de l'*Aquilegia vulgaris*; au jardin du Collège de la Paix, a Namur; Mr J'Abbe Bellynck; sub: *Aecidium clematidis* DC.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 852; - sub: *Aecidium clematidis* DC.; ad *Clematidis vitalbae* L. folia caulisque viva; Ali prope Zürich (Helvetiae); raro; Juli 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 156; sub: *Aecidium clematidis* DC.; sulla vitalba presso Firenze; Giugno 1860; Caldesi; sub: *Aecidium clematidis* DC.; sulla *Clematis vitalba*; ad Oldenico, nella province di Vercelli; 1859; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Aecidium clematidis* DC., sur les feuilles du *Clematis vitalba*; au Fond d'Argtz, près de Namur; Mr. A. Richald; sub: *Aecidium clematidis* DC.; Cosnino; 11 August 1884; collected by 3, larzm E. Jones; Marcus E. Jones, Flora of Arizona; ad *Anchusa arvensis*; Bormike; 8. 1872; Ex herb. de Thümen.; sulla *Cerintho aspera*; nei dintorni di Pisa; Marzo 1862; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Borago officinalis*; aux environs de Louvain, d'ou W Ed. Martens a eu extreme obligeance de nous l'envoyer; nous l'avons egalment recu des environs de Namur, par Mr Bellynck; sub: *Uredo rubigo-vera* DC., sulle foglie della segale; in Val Intrasca, Lago Maggiore; Giugno 1866; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Uromyces rubigo* Fr.; auf Mays; Tyrol austr., leg. Heufler.

Puccinia ribis DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. ribis* DC. f. *Ribis rubri*; Dania: Skarup; 8. 1874; leg. Rostrup; Ex herb. de Thümen.

Puccinia scirpi DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium nymphoidis* DC., Mantuae; Julio; G. Passerini; sub: *P. scirpi* Tul; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *P. scirpi* Link.; in *Scirpi lacustris*; Parmae; G. Passerini; *Scirpus lacustris*; a Casale Monferrato, lungo il Po; Ottobre 1866; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Puccinia sessilis J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

ad *Paridis quadrifoliae* L. folia viva; prope Altstetten ad Zurich; May 1880; G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 153; ad *Convallariae multiflorae* L. folia; prope Altstetten ad Zilrich; frequens; Mai 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 154; sur les feuilles du *Convallaria polygonatum*; aux environs de Bruxelles; ad *Allium ursini* L. folia viva; prope Altstetten ad Zürich (Helvetiae); frequens; Mai 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 141; sub: *Aecidium orchidearum* Desm., sur les feuilles de l' *Orchis latifolia*; a Courtrai; Juin.

Puccinia sileris W. Voss [*Pucciniaceae*]

sub: *P. sileris* Fkl.; Franconia: Bayreuth; 9.1874; Ex herb. de Thümen.

Puccinia solidaginis Peck [*Pucciniaceae*]

Salt Lake City; August 1883; collected by Marcus E. Jones; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Puccinia sorghi Schwein. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia maydis* Berenger, sulle foglie di mais; presso Colico e presso Como; Settembre-Ottobre 1863; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; Autumno; Hazslinszky von Hazslin, Magyarharon viranyabol; sub: *Puccinia zea* Berenger, Rabenhorst, Fungi europaei.

Puccinia stachydis DC. [*Pucciniaceae*]

[...]; Rabenhorst, Fungi europaei.

Puccinia straminis Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *P. straminis* Fuckel f. *Arrhenateri*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. straminis* Fuckel f. *Bromis mollis*; Franconia: Bayreuth; 6. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *P. straminis* Fuckel f. *Bromis sterilis*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Puccinia striiformis Westend. [*Pucciniaceae*]

sur les chaumes des céréales; aux environs de Courtrai; sub: *Uredo glumarum* Roberge, dans l'intérieur des glumes et des balles du froment cultivé; aux environs de Courtrai; été.

Puccinia striola Link [*Pucciniaceae*]

[...]; Ex herb. de Thümen; sur le *Carex* et les *Cyperus*; sur les bord du [...]; 13 Août 1874; sub: *P. striola* Strauss; sur les feuilles du *Carex acuta*; aux environs d'Audenarde; M' Tosquinet.

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo suaveolens* Pers., sul *Cirsium arvense*; nei dintorni di Bolzano; Giugno 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; a la face inferieure des feuilles in *Serratula arvensis*; été.

Puccinia tanacetii DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia artemisiae* Fuckel, Salt Lake City; collected by Marcus E. Jones A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah; sul *Tanacetum balsamita*; a Serravalle alla Scrivia; Autunno 1859; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Puccinia discoidearum* Link, sur les feuilles du *Tanacetum vulgare*; aux environs de Tournai; Août; sulle foglie di *Artemisia*; presso [...]; Oct 1860; leg. Caldesi; sub: *Puccinia pyrethri* (Wallr.) Rabenh.; da un erbario micologico austriaco; sub: *Uredo artemisiae* Rabenh., sur les feuilles de l'*Artemisia vulgaris*; aux environs de Namur; W l'Abbé Bellynck.

Puccinia thesii (Desv.) Chaillet [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium thesii* Desv., Cotes du Calvados; 1860; Caldesi; sub: *A. thesii* Desv. f. *Thesium pratensis*; Austria inf.: Senflenberg; 7. 1871; Ex herb. de Thümen.

Puccinia tumida Grev. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. umbeliferarum* f. *Physospermi*; sui pezioli del *Physospermum aquilegifolium*; né castagneti di Collecchio, provincia di Parma; Giugno 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les feuilles du *Chaerophyllum sylvestre*; dans les fossés des fortifications de la ville de Menin; alle foglie dell'*Aegopodium podagraria*; nel Parco regio di Marlia presso Lucca; Giugno 1858; Bicchi.

Puccinia tumidipes Peck [*Pucciniaceae*]

Bowie; 17 September 1884; Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizima.

Puccinia umbilici Guépin [*Pucciniaceae*]

sub: *P. umbilici* Guep.; sur les feuilles de l'*Umbilicus pendulinus*.; dans R. P. Clém. Dumont.

Puccinia urticata (Link) F. Kern. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium urticae* (Schwein.) Burrill, sub: *A. urticae* Schwein.; in silva ad Borkut; Jun.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *A. urticae* DC.; sur les tiges et les feuilles de l'Ortie dioique; environs de Courtrai; sub: *A. urticae* Schwein.; de Thümen, Fungh. Suph. n. 104.

Puccinia ustalis Berk. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia compacta* de Bary, sur les feuilles de l'*Anemones*; de Thümen, Fungh. Suph. n. 52.

Puccinia variabilis Grev. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. variabilis* Grev. f. *taraxaci*; Anglia: [...]; 7. 1872; leg. Brittain; Ex herb. de Thümen; sub: *P. variabilis* Grev.; sur les feuilles des *Leontodon* et des asperge; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Puccinia vincae (DC.) Plowr. [*Pucciniaceae*]

sulla *Vinca acutiflora*; presso Iglesias nella Sardegna meridionale; 1864; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie della *Vinca minor*; nelle selve presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Estate 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. vincae* Berk.; feuilles de la *Vinca major*; at St. Guro; près de Marseille; Aotli 1874; sub: *Uredo vincae* DC., Botzen, Tirol; C. Kerk.

Puccinia violae (Schumach.) DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. violae* DC.; sur les feuilles de la violette odorante; au jardin de MmeVe Pycke, à Courtrai; Novembre; sub: *Aecidium violae* Schumach., ad *Viola sylvaticae* folia; Thrich, Helvetiae; Mai 1878.

Puccinia violae (Schumach.) DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *P. violarum* Link. f. *Violae sylvestris*; Anglia: Chesire; 7. 1872; leg. Brittain; Ex herb. de Thümen.

Puccinia virgae-aureae (DC.) Lib. [*Pucciniaceae*]

sub: *Asteroma atratum* Chevall., sulle foglie languenti per gelo della *Saponaria officinalis*; Vercelli; Novembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. virgaureae* Lib.; in foliis *Solidaginis virgaureae*; Autunno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837); sub: *P. virgaureae* Lib.; dintorni di Biella in Piemonte; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano, sub: *P. virgaureae* Lib.; sur les feuilles du *Solidago virgaurea*; dans les bois de Gheluvelt, près d'Ypres; août.

Pucciniastrum agrimoniae (Dietel) Tranzschel [*Pucciniastraceae*]

sub: *Coleosporium ochraceum* Bonord., Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen.

Pucciniastrum areolatum (Fr.) G.H. Otth [*Pucciniastraceae*]

sub: *Melampsora areolata* Fr., de Thümen, Fungh. Suph. n. 226; sub: *Sclerotium areolatum* Fr., ad folia dejecta *Pruni padi*; Autunno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Pucciniastrum circaeae (Schumach.) Speg. [*Pucciniastraceae*]

sub: *Melampsora circaeae* (Schumach.) Thiim., ad *Circaea lutetianae* L. folia viva et languida; in Hottingen prope Zürich; September et November 1879; leg. G. Winter; Johannes Kunze, *Fungi selecti exsiccati*, *Fungi helvetici* no. 147; sub: *Uredo circaeae* Schumach., sur les feuilles du *Circaea lutetiana*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Pucciniastrum epilobii (Pers.) G.H. Otth [*Pucciniastraceae*]

sub: *Melampsora epilobii* Fuckel f. *Epilobi rosei*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. epilobii* DC.; ad *Epilobium rosei* folia; Zürich, Helvetiae; August 1879; G. Winter; sur les feuilles de l'*Epilobium spicatum*; au bois de Dave, près de Namur; Mr le Professeur Bellynck; sub: *Uredo pustulata* Pers. v. *salicis* West.; sur les feuilles du *Salix capraea*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Pucciniastrum goeppertianum (J.G. Kühn) Kleb. [*Pucciniastraceae*]

sulle foglie dell'*Abies excelsa*; nelle selve della Valle di Otro sopra Alagna in Valsesia; Estate 1857; Carestia; sub: *Calyptospora goeppertiana* J. G. Kiihn, Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Peridermium columnare* Alb. et Schw.; Gressoney; Aug 1854; Cesati; Rabenhorst *Herb Mycologicum* ed. II.

Pucciniastrum pyrolae (J.F. Gmel.) J. Schröt. [*Pucciniastraceae*]

sub: *Uredo pyrolae* Mart., sur les feuilles du *Pyrola minor*; dans les bois entre Nassogne et Bande, Luxembourg; M' Crépin.

Pucciniastrum symphyti (DC.) McKenzie & Padamsee [*Pucciniastraceae*]

sub: *Uredo symphyti* DC., sulle foglie di *Symphytum tuberosum*; nei dintorni di Biella; Giugno 1857; Cesati.

Pustula tragopogonis (Pers.) Thines [*Albuginaceae*]

sub: *Cystopus cubicus* Lév. f. *Inulae britannicae*; Bohemia: Teplitz; 7. 1872, sub: *Cystopus cubicus* de Bary; France: Dreux (Eure-et-Loir); sur les feuilles du *Tragopogon porri*, Juin 1886; legit Gallet; *Herbier Feuilleaubeis*, sulle foglie delle giovani pianticelle di *Xeranthemum cylindricum*; né colli di Langbirano, provincia di Parma; Aprile 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser II.

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus cinnabarinus* (Jacq.) Fr., sul tronco dei ciliegi languenti ed abbattuti; da Trobaso in Valle Intrasca al Lago Maggiore; 1861; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sul tronco dei

ciliegii languenti ed abbattuti; da Scopello presso Riva in Valsesia; 1861; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; Valle Intrasca; 1854; De Notaris.

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Mollisia atrata* (Pers.) P. Karsten var. *asparagi* G. Winter ex W. Phillips, sub: *M. atrata* (Pers.) Karst. f. *asparagi*; in horto; pr. King's Lynn (England); leg. Charles B. Plowright; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Peziza atrata* Pers., su steli secchi di *Scabiosa columbaria*; né luoghi incolti presso la Baganza, a Vigheffio, provincia di Panna; autunno 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. atrata* Pers. a *leguminum* Westend.; sur les gousses pourrissantes à terre de l'haricot; pendant l'hiver; sub: *P. atrata* Pers. p. *follicola* Westend.; sur les feuilles mortes du *Plantago lanceolata*, aux environs de Namur; d'ou Mr le Comte Alfred de Limminghe nous l'a fait connaitre; sur les tiges pourrissantes de l'asperge; au jardin de l'HoSpital militaire de Bruges.

Pyrenopeziza betulina (Alb. & Schwein.) Rauschert [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Sclerotium betulinum* Fr., ad folia decidua *Betulae albae*; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sur les feuilles du Bouleae blanc (*Betula alba* L.); à Gheluelvelt.

Pyrenopeziza brassicae B. Sutton & Rawl. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Gloeosporium concentricum* Berk. et Br., sur les feuilles malavives de *Brassica napus*; France: Chailly (Seine-et-Marne); Ottobre 1883.

Pyrenopeziza karstenii Sacc. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Mollisia graminis* P. Karst. f. *Phlei pratensis*; Helvetiae: Neuchatel; 3. 1874; leg. Morthier; Ex herb. de Thümen.

Pyrenopeziza petiolaris (Alb. & Schwein.) Nannf. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Hysterium petiolare* Fr.; sur les pétioles des feuilles mortes de l'*Acer pseudoplatanus*. in petiolis *Acer pseudoplatani*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Excipula rubi* Fr., sur les sarments du Framboisier; aux environs d'Audenarde (M' Tosquinet), au jardin du collège Saint-Stanislas à Mons (Mr Dumont) et à Louette-Saint-Pierre (M' Gust. Aubert); sub: *Phacidium rubi* Fr., in foliis *Rubi folaei*; ad *Salem*; leg. Fack; Rabenhorst, Fungi europaei. sur les feuilles mortes du *Rubus fruticosus*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Pyrenopeziza tini (Duby) Nannf. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Phacidium tini* Duby, sur les feuilles mortes et tombées du laurier-tin (*Viburnum tinus*); dans le jardin de Mr l'Avocat Biebuyck, à Courtrai.

Pyrenopeziza velutina (Sacc.) Boud. [*Ploettnerulaceae*]

sub: *Peziza velutina* Wallr., sur les troncs et les branches mortes du frane, dans la cour de l'infermeire militaire de Menin.

Pyrenophora pellita (Fr.) Sacc. [*Pleosporaceae*]

sub: *Sphaeria pellita* Fr., sur les tiges mortes du pavot somnifère; à la campagne de Mr Goethals-Delivigne; près de Courtrai.

Pyrenophora phaeocomes (Rebent.) Fr. [*Pleosporaceae*]

sub: *Sphaeria phaeocomes* Rebent., in foliis exsiccatis *Holci mollis*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Pyrenophora tritici-repentis (Died.) Drechsler [*Pleosporaceae*]

sub: *Sphaeria culmorum* Cooke, sur les chaumes du *Scirpus lacustris* et *Juncus conglomeratus*. Nouvelle pour la Flore Belge.

Pyronema marianum Caruso [*Pyronemataceae*]

Glaggenitz; 8.1857; leg. Heufler.

Rachicladosporium iridis (Auersw.) Crous [*Cladiosporaceae*]

sub: *Dothidea iridis* Desm., sur les feuilles de l'*Iris pseudo-acorus*; à la campagne de Mr Willemse, à Courtrai.

Ramaria aurea (Schaeff.) Quél. [*Gomphaceae*]

sub: *Clavaria aurea* Jul. Schaeff., nelle pinete di Varenna, presso Pegli, Liguria occidentale; Ottobre; Baglietto; *Erbario Crittogamico Italiano*.

Ramaria botrytis (Pers.) Bourdot [*Gomphaceae*]

sub: *Clavaria botrytis*, [...]; Austria sup.; C. Kerk.

Ramaria flava (Schaeff.) Quél. [*Gomphaceae*]

sub: *Clavaria flava*; [...]; Austria sup.; C. Kerk.

Ramularia alborosella (Desm.) Gjaerum [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Stysanus alborosella* Desm., sur les feuilles languissantes du *Cerastium vulgatum*; au camp de Beverloo.

Ramularia bistortae Fuckel [*Mycosphaerellaceae*]

Bohemia: Teplitz; 6. 1872; Ex herb. de Thümen.

Ramularia geranii Fuckel [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *E. foliorum geranii*; sur les feuilles languissantes du *Geranium molle* et *G. dissectum*; sub: *Ramularia geranii* Fuckel f. *Geranii pusilli*; Franconia: Bayreuth; 5. 1874; Ex de Thümen.

Ramularia ovata Fuckel [*Mycosphaerellaceae*]

Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Ramularia pusilla Unger [*Mycosphaerellaceae*]

ad *Alchemilla vulgaris* L. folia viva; "Albula-Pass", Rhaetiae; frequens; aital 1900 m; August 1880; G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati.

Ramularia rosea Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Fusidium roseum* Fuckel, Nagyvaad; leg. Simkovits; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Ramularia rubella (Bonord.) Nannf. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ramularia obovata* Fuckel f. *Rumicis crispi*; Moravia, Schonberg; 7. 1873; leg. Paul; Ex herb. de Thümen.

Ramularia stellariae Rabenh. [*Mycosphaerellaceae*]

Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen.

Remotididymella destructiva (Plowr.) Valenz.-Lopez, Cano, Crous, Guarro & Stchigel
[*Didymellaceae*]

sub: *Phyllosticta destructiva* Desm.; sur les feuilles du *Lycium europaeum*; aux environs de Louvain; Mr Ed. Martens.

Resupinatus applicatus (Batsch) Gray [*Pleurotaceae*]

sub: *Agaricus applicatus* Batsch; ad truncus et ramos putridos *Ribis grossulariae*; Hieme, Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Rhabdospora senecionis Carestia [*Mycosphaerellaceae*]

sulle foglie languenti del *Senecio fuchsii*; a Riva di Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Rhagadostoma lichenicola (De Not.) Keissl. [*Nitschkiaceae*]

sub: *Bertia lichenicola* De Not.; sul tallo della *Solorina crocea*; nelle alpi della Valsesia; 1863; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Rhizina undulata Fr. [*Rhizinaceae*]

sub: *Rhizina laevigata* Fr., am Boden eines Nadelwaldes; bei Salzburg (Austria); Dr. Sauter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Rhizoctonia brassicarum Lib. [*Ceratobasidiaceae*]

ad radices *Brassicae oleraceae rubrae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Rhizoctonia dauci Rabh. [*Ceratobasidiaceae*]

ad radices *Dauci*; E Kiihn; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Rhizoctonia muscorum Fr. [*Ceratobasidiaceae*]

ad radices muscorum; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Rhizoctonia napaeae Westend. & Wallays [*Ceratobasidiaceae*]

sur des navets pourris dans une cave; à Courtrai; pendant l'hiver.

Rhizoctonia solani J. G. Kiihn. [*Ceratobasidiaceae*]

campo sperimentale di agricoltura; Halle a/S; 31.5.1873; Kiihn.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Rhizomorpha setiformis Roth [*Ceratobasidiaceae*]

sur les mousses et les feuilles en décomposition; dans les bois; pendant l'hiver.

Rhizomorpha subcorticalis P. Micheli ex Pers. [*Ceratobasidiaceae*]

entre le bois et l'écorce de vieilles billes ayant servi au support des rails du chemin de fer; à Gand; Demey.

Rhizomorpha subterranea Pers. [*Ceratobasidiaceae*]

sur les poutres humides; dans les houilleries; aux environs de Mons; Mr l'Abbé Michot.

Rhizomorpha trichophora Desm. [*Ceratobasidiaceae*]
sur un sommier; à Marcke, près de Courtrai; Septembre.

Rhizopogon luteolus Fr. [*Rhizopogonaceae*]
dans les bois de sapins des Flandres; surtout ceux où le sol est sablonneux.

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. [*Rhizopogonaceae*]
sub: *R. rubescens* Tul.; nelle selve montane; presso Bolzano, Tirolo meridionale; 1865; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange [*Rhizopogonaceae*]
sub: *R. provincialis* Tul.; pinete dei dintorni di Nizza marittima; Autunno 1859; Barla; Erbario Crittogamico Italiano.

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill. [*Rhizopodaceae*]
sub: *Mucor stolonifer* Ehrenb., Cultivirt auf gekochten zwetschen von H. Hoffmann in Giessen; Rabenhorst, Fungi europaei.

Rhizosphaera pini (Corda) Maubl. [*Venturiaceae*]
sub: *Coniothyrium pini* Corda; sulle foglie dell'*Abies pectinata*; in Val Vogna sopra Riva in Valsesia; 1865; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Rhodesia subsecta (Roberge ex Desm.) Grove [*Nectriaceae*]
sub: *Fusarium subsectum* Roberge ex Desm., sur les feuilles mortes de l'*Arundo arenaria*; dans les dunes; aux environs d'Ostende.

Rhodocybe parilis (Fr.) Singer [*Entolomataceae*]
sub: *Agaricus parilis* Fr.; su pasture apriche; nella campagna di Unchio, in Vai Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1866; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Rhopoglyphus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuckel [*Incertae Sedis*]
— sub: *R. pteridis* Sow.; ad *Pteridis aquiline* L. caules putridos; “Zürich berg” prope Zürich (Helvetiae); frequens; Marz 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 183; sub: *Sphaeria filicina* Fr., in stipitibus *Pteridis aquilinae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. [*Rhytismataceae*]
sub: *Melasmia acerina* Awd.; in foliis *Aceris campestris*; Schloss Heiligenberg (Oberbaden); leg. Jack; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *M. acerina* Lév. f. *Aceris campestris*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *M. acerina* Lév. f. *pseudoplatani*; Franconia: Bayreuth; 9. 1874; Ex herb. De Thümen; sur les feuilles de l'*Acer pseudoplatanus*; dans les plantations de camp de Beverloo; sub: *R. acerinum* Fr. f. *pseudoplatani*; Bohemia: Teplitz; 11.1873; Ex herb. de Thümen; sub: *Rhizomorpha subcorticales* Pers.; Bohemia: Osseg; 10.1873; Ex herb. de Thümen; sub: *R. acerinum* Fr.; feuilles des divers érables; Seine-et-Marne: Fontainebleau; ètè 1883; Feuilleaubois; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *R. acerinum* Fr.; sur les feuilles languissantes des érables et des platanes; sub: *R. acerinum* Fr.; in foliis acerinis; autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830); sub: *R. acerinum* Fr.; in foliis acerinis; 1880; sub: *R. acerinum* Fr.; Seine-et-Marne: forêt de Fontainebleau; aofit 1882; Feuilleaubois; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *R. acerinum* Fr.; sur les feuilles de l'*Acer monspessulanum* L.; à St. Pons de Gemenes; 1874;

sub: *Melanosorus acerinus* De Not.; sulle foglie languenti di acero; a Persolino presso Faenza; Ottobre 1859; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Rhytisma andromedae (Pers.) Fr. [*Rhytismataceae*]

sur les feuilles vivantes de l'*Andromeda polyfolia*; dans les tombières entre Samrée et Laroche (Luxembourg); M' Crépin.

Rhytisma lagerstroemiae Henn. [*Rhytismataceae*]

sub: *R. lagerstroemiae* Rabh.; im Rewah State südlich von Allahabad Central-Indien; Jan. 1874; leg. S. Kurz.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. [*Rhytismataceae*]

sub: *R. salicinum* Fr. f. *S. auritae*; Austria inf.: Krems; 9.1871; Ex herb. de Thümen; sub: *R. salicinum* Fr.; sur les feuilles du *Salix caprea*, aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert; sur les feuilles languissantes des différentes espèces de Saule; sub: *R. salicinum* Fr.; ad folia salicina; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832); sub: *R. salicinum* Fr.; sulle foglie del *Salix caprea*; presso Riva di Valsesia; Autunno 1837; Carestia; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Rigidoporus ulmarius (Sowerby) Imazeki [*Meripilaceae*]

sub: *Polyporus ulmarius* Fr.; nell'agro Vercellese; autunno 1857; Malinverni.

Robergea cubicularis (Fr.) Bres. [*Stictidaceae*]

sub: *Sphaeria cubicularis* Fr., ad ramos putrescentes *Fraxini*, *Corni*, *Syringae* etc.; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Roestelia amelanchieris Mérat [*Rhytismataceae*]

sulle foglie dell'*Aronia rotundifolia*; presso Bolzano, Tirolo meridionale; 1866; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Amelanchier vulgaris*; Seine-et-Marne: Fontainebleau; Settembre 1883; Feuilleubois; Ch. Magnier, Flora selecta exsiccata.

Roestelia mespili Erikss. [*Gymnosporangiaceae*]

sur les feuilles du *Mespilus germanica*; aux environs de Bruxelles; Mr Mathieu.

Roestelia penicillata (O.F. Müll.) Fr. [*Gymnosporangiaceae*]

auf Blättern von *Sorbus aria*, in dessen *Juniperus communis* wächst, sehe hdufig bei Reichenhall. Gesammelt zu Ende; August 1869; von A. Braun.

Rosellinia andurnensis Ces. & De Not. [*Xylariaceae*]

sub: *R. andurnensis* De Not.; investe le erbe, la terra e le pietre del suo feltro giallo-verdognolo dapprima, poi grigio e finalmente bruno; S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Rosellinia rosarum Niessl [*Xylariaceae*]

in ramulis *Rosarum* et *Crataegi*; prope Brtinn; Vere; G. De Niessl.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Rosellinia tassiana De Not. [*Xylariaceae*]

sub: *R. tassiana* De Not. et Ces.; nelle screpolature della corteccia delle quercie; a Rodda nel Chianti in Toscana; Giugno 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Russula delica Fr. [*Russulaceae*]

Bohemia: Teplitz; 7. 1879; Ex herb. de Thumen.

Rutola graminis (Desm. ex Fr.) J.L. Crane & Schokn. [*Incertae Sedis*]

sub: *Torula graminis* Desm., ad folia graminea sicca; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Rutstroemia bulgarioides (P. Karst.) P. Karst. [*Rutstroemiaceae*]

sub: *Peziza bulgarioides* Rabenh., sugli strobili dell'*Abies excelsa* marcescenti a terra; a Riva in Valsesia; Aprile 1867; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Rutstroemia firma (Pers.) P. Karst. [*Rutstroemiaceae*]

sub: *Peziza firma* Pers., ad ramos quercinos putridos; sero autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber [*Helminthosphaeriaceae*]

sub: *Lasiosphaeria spermoides* Ces. & De Not., su legno fracido; a S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella; Autunno 1865; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Saccharomyces cerevisiae (Desm.) Meyen [*Saccharomycetaceae*]

sub: *Ulvina aceti* Kiitz.; Bewirt in weinigen Fliissigkeiten die Essigohrung. Aus Obstweinessig; sub: *Ulvina aceti* Kiitz.; Nage dans et sur le vinaigre exposé au contact de l'air.

Saccobolus glaber (Pers.) Lambotte [*Ascobolaceae*]

— sub: *Ascobolus kerverni* Crouan; in fimo ovinum; Bathaston, Somersetshire; Oct. 1868; leg. C. E. Broome; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Sarcodon imbricatus (L.) P. Karst. [*Bankeraceae*]

sub: *Hydnum imbricatum* L., nelle pinete; monti della Polcevera e dintorni di Pegli, Liguria occidentale; Ottobre 1866; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hydnum subsquamosum* Batsch, nelle pinete dell'alta Polcevera, sopra Genova; Ottobre 1861; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Sarcodontia setosa (Pers.) Donk [*Meruliaceae*]

sub: *Hydnum schiedemayri* Heufler; unter der Rinde eines alten Apfelbaumes, die Rinde endlich ablesend; im Garten des Apotheker Hofrichter; Schandau (Skhs Schweiz); im Aug 1875; leg. W. Krieger; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Sarcorhopalum tubaeforme Rabenh. [*Taphrinaceae*]

in Aspidio [...]; in montibus; Nilagiri; Nilagiri & Hohenacker, Pl. Indiae Orientalis.

Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma [*Erysiphaceae*]

sub: *Oidium aceris* Rabenh. f. *Aceris campestris*; Bohemia: Teplitz; 8. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *O. cucoconium* Desm. f. *centifoliae*; Bohemia: Teplitz; 9. 1873; Ex herb. de Thümen; sub: *Erysibe bicornis* Link, Heufler; Austria; sub: *Erysiphe aceris* DC., nous avons trouvé cette espèce, qui n'est peut-être qu'une variété de l'*Erysiphe abnormis* Duby; au parc de Saint-George à Courtrai; Novembre et Décembre; sub: *Erysiphe bicornis* Fr.; sur les feuilles de l'*Acer campestre*; au parc de Saint-George à Courtrai; Décembre; sub: *Uncinula bicornis* Lév., sur les feuilles de l'*Acer campestre*; Beynost; Automne 1882; Dr A. Magnin; Ch. Magnier, *Flora selecta exsiccata*.

Schizophyllum commune (L.) Fr. [*Schizophyllaceae*]

sub: *S. commune* Fr.; Valle del Serchio, in Toscana; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. commune* Fr.; dintorni di Riva in Valsesia; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. commune* Fr.; Monte dei Sette Fratelli, nella Sardegna meridionale; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *S. commune* Fr.; dal tronco di un ippocastano; a Castiglione d'Asti; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *S. commune* Fr.; da tronchi secchi di *Tilia parviflora*; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *S. commune* Fr.; ad truncos fagorum; in Appennino etrusco, loco dicto "Sali"; Julio 1875; legit J. Arcangeli; J. Arcangeli, *Plantae Italicae exsiccatae*; sub: *S. commune* Fr.; bei [...]; Heufler.

Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk [*Schizoporaceae*]

sub: *Irpex obliquus* Fr., Iglò; Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.
Isaria farinosa (Dicks.) Fr.; in chrysalidibus emortuis; prope Lipsiam; leg. Delitsch; Rabenhorst, *Fungi europaei*.

Schizothyrioma ptarmicae (Desm.) Höhn. [*Dermateaceae*]

sub: *Labrella ptarmicae* Desm., sur les tiges et les feuilles de *Achillea ptarmica*; dans les jardins.

Scirrha aspidiorum (Lib.) Bubák [*Dothideaceae*]

sub: *Sphaeria aspidiorum* Lib., in stipitibus *Aspidiorum*; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Scirrha castagnei (Mont.) Nitschke [*Dothideaceae*]

sub: *Dothidea castagnei* Mont., sugli steli essiccati dell'*Equisetum arvense*; nei dintorni di Vercelli; Autunno 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Scleroderma citrinum Pers. [*Sclerodermataceae*]

sub: *S. vulgare* Vittad.; né prati; alle Cascine di Pisa; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano;
 sub: *S. vulgare* Vittad.; nell'Orto botanico di Pisa; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. vulgare* Vittad.; nell'Orto botanico di Genova; Canepa; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. vulgare* Vittad.; Glaggenitz; 8. 1837; leg. Heufler; sub: *S. vulgare* Vittad.; boschi; Castiglione dei Pepoli; Agosto 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Scleroderma polyrhizum (J. F. Gmel.) Pers. [*Sclerodermataceae*]

sub: *S. geaster* Fr.; nei prati; S. Rossore, presso Pisa; Autunno 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. geaster* Fr.; in pinetis; Aprile 1846.

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary [*Sclerotiniaceae*]

sub: *Peziza sclerotiorum* Lib., ad *Sclerotium tectum*; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837); sub: *Sclerotium varium* Pers., sur les carottes entassées et pourries; dans les caves pendant l'hiver.

Sclerotium bullatum DC. [*Typhulaceae*]

sur l'écorce des Courges et Citronilles pourries; nos échantillons ont été récoltés sur des navets pourris conserés en cave pendant l'hiver; Courtrai; Libert.

Sclerotium cepae Berk. & Broome [*Typhulaceae*]

intra squamas bulborum *Alli cepae* putridorum; Hieme; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834).

Sclerotium compactum DC. [Typhulaceae]

sub: *S. clavus a althaeae* Westend.; sur les semences de l'*Althea officinalis*; au Jardin botanique de Louvain; sub: *S. clavus* var. *zeae* Westend.; sur les rachis de l'épi du *Zea mays*; à Louvain (Mr Leburton); intra pedunculos supra receptacula et semina *Helianthi annui*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Sclerotium durum Pers. [Typhulaceae]

sub: *S. durum a zeae* Nob.; sur les feuilles et les gaines du *Zea mays*; sub: *S. durum* var. *echinophila* Desmaz.; sur les involucre du Chataignier; sub: *S. durum c. scolymi* Nob.; sur les folioles du calice de l'artichaut; sub: *S. durum d. hippocastani* Nob.; sur les involucre du Marronnier d'inde; sur les tiges mortes des plantes herbacée; ad caules plantarum exsiccatos; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Sclerotium entogenum Westend. [Typhulaceae]

se développe sous l'épiderme, ainsi que dans la substance ligneuse et médullaire des tiges mortes de l'asperge; a été trouvé dans un jardin légumier à Terbank, près de Louvain; (Mr Leburton).

Sclerotium eurotioides Lib. [Typhulaceae]

in cortice coriario sub dio coacervato; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Sclerotium fibrillosum Lib. [Typhulaceae]

in cortice coriario sub dio coacervato; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Sclerotium leiodermum Roberge [Typhulaceae]

sur les tiges d'un *Polygonum*; aux environs de Courtrai; Mr Wallays.

Sclerotium lilicearum Lib. [Typhulaceae]

sub: *S. lilicearum* var. *scillae* Nob.; sur les tiges et les péricarpes mortes du *Scala nutans*; aux environs de Courtrai et de Namur; Mr le Comte Alfred de Limminghe; sub: *S. lilicearum* var. *amarylli*; sur les pericarps des amarylles, dans les jardins.

Sclerotium maculare Fr. [Typhulaceae]

sur les feuilles pourrissantes du peuplier, du bouleau, etc.; aux environs de Courtrai, Hiver.

Sclerotium pezizaeforme Schumach. [Typhulaceae]

ad folla dejecta *Fagi sylvaticae*; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. II (1832).

Sclerotium populneum Pers. [Typhulaceae]

sur les feuilles pourrissantes des peupliers.

Sclerotium punctum (Chevall.) Lib. [Typhulaceae]

sub: *S. punctum* Lib.; in foliis dejectis *Convallariae polygonati* et *verticillariae*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830); sub: *S. punctum* Lib.; sur les feuilles du *Convallaria polygonatum* et *multiflora*; aux environs de Namur (Mr l'Abbé Bellyneck), ainsi qu'à Louvain (Mr l'Abbé Leburton).

Sclerotium pustula DC. [*Typhulaceae*]

sulle foglie marcite del *Quercus pubescens*; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Autunno 1861; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du chêne; aux environs de Louvain, de Courtrai et d'Ypres; Mr Leburton; sub: *Sclerotium pustula* DC. a *petiolarum* Westend.; sur les pétioles tombés à terre du frêne; à Vlierbeeck, près de Louvain; Mr Leburton.

Sclerotium pyrinum Fr. [*Typhulaceae*]

sur des pommes pourries, conservées dans un grenier; pendant l'hiver; au Collège de la Paix, à Namur (Mr l'Abbé Leburton).

Sclerotium sphaeriaeforme Lib. ex Desm. [*Typhulaceae*]

in caulibus *Brassicae oleraceae rubrae*; Vere, Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834); sur la racine et les tiges mortes d'un guimauve (*Althaea officinalis*); au jardin de Mr D' Hont; Jardin Flemike, à Courtrai; Automne.

Sclerotium tectum Fr. [*Typhulaceae*]

ad radices *Dauci* et legumina *Phaseolorum*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Sclerotium velutinum Westend. [*Typhulaceae*]

sur les pétioles du frêne, ainsi que sur les feuilles de chêne, de peuplier et de frêne, amassées dans les troncs d'arbre creux dans les bois-taillis; pendant l'hiver; aux environs de Courtrai, dans les bois de Ste-Anne, ainsi que dans ceux dépendant de la propriété de Mule Sumont de Volsberghe.

Scutellinia hystrix (Saut.) Kuntze [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza (Blicteria) hystrix* De Not.; sui culmi disseccati della *Molinia caerulea*; al ponte di Possaccia in Valle Intrasca; Settembre 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Scutellinia scutellata (L.) Lambotte [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza scutellata* L., sur la terre argilleuse; aux environs de Courtrai; sub: *P. scutellata macrochaeta* Franzoni; sulla terra e su frammenti di legno lungo i ruscelli; presso Cimalmotto nel Canton Ticino; estate 1860; Franzoni; Erbario Crittogamico Italiano.

Sebacina incrustans (Pers.) Tul. & C. Tul. [*Sebacinaceae*]

sub: *Merisma cristatum* Pers.; dans le bois sur la terre, parmi les mousses et les graminées qu'elle enveloppe.

Secotium malinvernianum Ces. [*Incertae Sedis*]

pascolo asciutto; terreno siliceo; Oldenico, presso Vercelli; Ottobre 1864; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; colture di *Zea mays*; Oldenico, presso Vercelli; Settembre 1868; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Seimatosporium hypericinum (Ces.) B. Sutton [*Sporocadaceae*]

sub: *Pestalotia hypericina* Ces., sur les tiges sèches de l'*Hypericum perforatum*; France: Chailly (Seine-et-Marne); Janvier 1884; Herbarium Feuilleaubeis.

Septobasidium orbiculare (Dur. & Lév.) Donk [*Septobasidiaceae*]

sub: *Hypochnus michelianus* Caldesi; ad *Laurum*; in horto; Boboli, Florentiae; Jun 1861; leg. Caldesi; Rabenhorst, *Fungi europaei*; sub: *Hypochnus michelianus* Caldesi; sul tronco degli allori;

nel giardino Boboli, a Firenze; 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hypochnus michelianus* Caldesi; sugli Allori; Boboli, a Firenze; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Hypochnus michelianus* Caldesi; su *Pistacia lentiscus*; ad Orri, nella Sardegna meridionale; 1867; Canepa e Gennari; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Septobasidium quercinum (De Not. & Bagl.) Sacc. [*Septobasidiaceae*]

sub: *Hypochnus quercinus* Bagl., sulla corteccia screpolata di antiche querce; a Vallombrosa in Toscana; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Septocyta ruborum (Lib.) Petr. [*Incertae Sedis*]

sub: *Ascochyta ruborum* Lib.; in ramis *Ruborum*; Vere; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834); sub: *Septoria ruborum* (Lib.) Westend., sur les sarments vivants des ronces; dans les bois taillis, aux environs de Courtrai; Mars.

Septoria aesculicola (Fr.) Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. aesculicola* Westend.; sur les feuilles tombées de l'*Aesculus hippocastanum*.

Septoria anemones Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes de l'anemone des bois (*Anemone nemorosa*); aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria apiicola Speg. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. petroselinii* Desm.; sur les feuilles languissantes du persil (*Apium petroselinum*); au jardin de l'hôpital militaire de Bruges.

Septoria betae Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles de la betterave cultivée (*Beta vulgaris*); aux environs de Courtrai.

Septoria brassicae Ellis & Everh. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes du colza; aux environs de Courtrai.

Septoria carthusianorum Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les différentes parties du calice du *Dianthus carthusianorum*; au jardin de Mr D'Hont, Horticulteur; à Courtrai; Novembre.

Septoria cerastii Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. cerastii* Rob.; sur les feuilles languissantes du *Cerastium vulgatum*; aux environs de Courtrai; Décembre.

Septoria cheirantii Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Cheiranthus annuus*; dans les jardins, à Mons; Mr Clém. Dumont.

Septoria chelidonii (Lib.) Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta chelidonii* Lib., in foliis languescentibus *Chelidoni majoris*; Autumno; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830), sur les feuilles du *Chelidonium majus*, sulle foglie del *Chelidonium majus*; nei dintorni di Como; Autunno 1874; M. Anzi; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Septoria chenopodii Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Chenopodium viride*; le long du chemin de fer de Courtrai, à Bruges.

Septoria convolvuli Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Convolvulus arvensis* et *C. sepium*; aux environs de Courtrai.

Septoria cruciatae Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. cruciata* Rob.; sur les feuilles du *Vaillantia cruciata*; à Dave, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria dianthi Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. dianthi* b. *saponariae* Desm.; sur les feuilles du *Saponaria officinalis*; aux environs de Bruxelles; Mr Mathieu; sub: *S. dianthi* b. *saponariae* Desm.; sur les feuilles du *Saponaria officinalis*; Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sur les feuilles du *Dianthus fulgens*; au jardin du Collège de la Paix, à Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sur les feuilles languissantes du *Dianthus barbatus*; dans la station du chemin de fer, à Courtrai.

Septoria epilobii Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles de l'*Epilobium spicatum*; sur les bords du ruisseau Wepion, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria fraxini Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles vivantes du frêne; dans les plantation du camp de Beverloo; su foglie di frassini; né boschi di Collecchio, presso Parma; Ottobre 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Septoria galeopsidis Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Galeopsis tetrahit*; aux environs de Mons; le R. P. Clém. Dumont.

Septoria grossulariae (Lib.) Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. grossulariae* Westend.; sur les feuilles languissantes du *Ribes grossularia*; dans les plantations du camp de Beverloo.

Septoria hederæ Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sulle foglie languenti dell'edera; a Bolzano, Tirolo meridionale; 1870; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les feuilles vivantes du lierre; le R. P. Clém. Dumont.

Septoria heterochroa Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. heterochroa* a. *lamii* Desm.; sur les feuilles du *Lamium*; aux environs de Namur; W l'Abbé Bellynck; sub: *S. heterochroa* b. *plantaginis* Desm.; sur les feuilles du *Plantago lanceolata*; aux environs de Courtrai; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *S. heterochroa* c. *anthirrhini* Desm.; *Anthirrhinium majus*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria humuli Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes du houblon (*Humulus lupulus*); aux environs d'Ypres.

Septoria hydrocotyles Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes de l'*Hydrocotyle vulgaris*; aux environs d'Ypres.

Septoria incondita Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. incondita* a *quercina* Desm. et Rob.; sur les feuilles du chêne; dans les bois de Courtrai.

Septoria lavandulae Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. lavandulae* Rob.; sur les feuilles du *Lavandula spica*; au jardin du collège de la Paix; à Namur; Mr le Professeur Bellynck.

Septoria leguminum Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. leguminum scopariae* Westend.; sur les gousses vertes du *Spartium scoparium*; dans les plantations du camp de Beverloo; Juillet 1853.

Septoria lepidii Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Lepidium campestre*; aux- environs de Namur; du côté des Grands-Malades.

Septoria levistici Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Ligustrum levisticum*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Septoria lysimachiae Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Lysimachia vulgaris*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Septoria maiianthemi Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Mayanthemum bifolium*; aux environs de Louvain; Mr Ed. Martens.

Septoria nebulosa Rostr. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. nebulosa* Desm.; sur des pieds de persil (*Apium petroselinum* L.); à Courtrai.

Septoria oenotherae Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Rhabdospora oenotherae* Ces., sulle foglie languenti dell'*Oenothera biennis*; nei dintorni di Vercelli; Estate 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles de l'*Oenothera biennis*; Seine-et-Marne; Aot 1883; Feuilleaubois; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sur les feuilles du *Oenothera biennis*; au camp de Beverloo, ainsi que dans un jardin à Louvain; Mr l'Abbé Leburton.

Septoria orchidearum Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles de l'*Orchis latifolia*; dans les près humides le long la Lys, à Courtrai.

Septoria paeoniae Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Paeonia sinensis*; dans un jardin à Champion, près de Namur; Mr Bellynck.

Septoria pastinacae Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du panais (*Pastinaca sativa*); aux environs de Gand, près de la nouvelle citadelle; Août.

Septoria petroselini Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta petroselini* Lib., in foliis *Apii petroselini*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Septoria pisi Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Pisum arvense*; dans un champ, à Marche-les-Dames, près de Namur; Mr le Comte Alfred De Lemminghe et J. Barbier.

Septoria polygonorum Desm. [Mycosphaerellaceae]

sub: *Ascochyta polygوني* Rabenh. f. *Persicariae*; Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sur les feuilles languissantes du *Polygonum persicaria*; aux environs d'Ypres.

Septoria pyri Castagne [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du poirier; à la Campagne de Mr le Baron Guido Van Zuylen Nyevelt; à St Croix-lez-Bruges.

Septoria quercina Desm. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du chene; aux environs de Namur et Courtrai; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria ranunculi Westend. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Ranunculus sceleratus*; aux environs de Louvain; Mr Leburton.

Septoria salicis Westend. & J. Kichx f. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Salix argentea*; dans les dunes de Furnes à Nieuport; Septembre; sub: *S. salicis* Westend. f. *Salicis capreae*; Seine-et-Marne: Chailly; Octobre 1883; Feuilleaubeis; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccata.

Septoria saponariae (DC.) Savi & Becc. [Mycosphaerellaceae]

sub: *S. saponariae* Savi et Beccari; sulle foglie della *Saponaria officinalis*; nel Giardino Botanico di Pisa; Settembre 1861; Pi. Savi, Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Septoria scabiosicola Desm. [Mycosphaerellaceae]

sub: *Depazea scabiosicola* DC., su *Knautia longifolia*; leg. Heufler; sub: *Depazea scabiosicola* Desm.; sur les feuilles vivantes de la scabieuse.

Septoria scillae Westend. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Scilla nutans*; aux environs de Courtrai.

Septoria sedi Westend. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Sedum*; au jardin de Mr D'Hout; horticulteur à Courtrai; Novembre.

Septoria scrophulariae Peck. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Scrophularia nodosa*; le R. P. Clém. Dumont.

Septoria senecionis Westend. [Mycosphaerellaceae]

sur les feuilles du *Senecio sarracenicus*; au château de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria sii Roberge ex Desm. [Mycosphaerellaceae]

sub: *S. sii* Rob.; sur les feuilles du *Sium latifolium*; aux environs de Courtrai, ainsi qu'à Kesselloo, près de Louvain; par Mr l'Abbé Leburton; Novembre.

Septoria stellariae Roberge ex Desm. [Mycosphaerellaceae]

sub: *S. stellariae* Rob.; sur les feuilles de l' *Alsine media*; au camp de Beverloo.

Septoria tiliae Westend. [Mycosphaerellaceae]

sur les deux faces des feuilles du tilleul; dans les plantations du camp de Beverloo.

Septoria tormentillae Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. tormentillae* Rob.; sur les feuilles du *Tormentilla erecta*; dans les bois de Dave, près de Namur; sub: *Septoria tormentillae* Roberge a *potentillae* Westend.; *Potentilla reptans*; Mr le Professeur Bellynck.

Septoria tussilaginis Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

epiphyllé sur les feuilles du *Tussilago fragans*; au jardin de Mr DevrieSere, Horticulteur, à Courtrai.

Septoria urticae Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. urticae* Rob.; sur les feuilles de l'*Urtica dioica*; aux environs de Courtrai; Automne.

Septoria verbenae Roberge ex Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. verbenae* Rob.; sur les feuilles de la verveine (*Verbena officinalis*); aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Septoria viburni Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Viburnum opalus*; dans un jardin à Champion, près de Namur; Mr Bellynck.

Septoria viciae (Lib.) Westend. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta viciae* Lib., ad folia *Viciae sepium*; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837), sur les feuilles et les gousses du *Vicia sepium*; au château de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Septoria villarsiae Desm. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles du *Villarsia nymphoides*; aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Septoria vincetoxici (Schub.) Awersw. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. vincetoxici* Westend.; sur les feuilles vivantes du *Cynanchum vincetoxicum*; à Ham-sur-Lesse; Mr E. Crépin.

Septoria violae-palustris Died. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. violae* Westend.; sur les feuilles languissantes du *Viola canina*.

Septoria vitis Lév. [*Mycosphaerellaceae*]

sur les feuilles languissantes de la vigne; dans les jardins.

Septoriella junci (Desm.) E. Sutton [*Incertae Sedis*]

sub: *Septoria junci* Desm.; sur les chaumes du *Juncus conglomeratus*; à Marcke, près de Courtrai, Mars.

Setoseptoria arundinacea (Sowerby) Kaz. Tanaka & K. Hiray. [*Lentitheciaceae*]

sub: *Melogramma arundinacearum* Niessl, in culmis siccis *Phragmites vulgaris*; prope Briinn; Junio; G. v. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei.; sub: *Sphaeria godivi* Desm., croit à la base des chaumes mortes de l'*Arundo phragmites*; nos échantillons ont été trouvés dans le fossé de la ville de Courtrai; près de la porte de Menin. Nouvelle pour la flore Belge.

Sigarispora caulium (Fr.) Thambug., Wanas., Kaz. Tanaka & K.D. Hyde [*Lophiostomataceae*]

sub: *Lophiostoma caulium* (Desm.) Niessl.; an moderm den Stengeltheilen von *Epilobium hirsutum* L.; an Wassergriiben in der Nffile der Fresseniihle bei Oberrissdorf unweit Eisleben (prov. Sachsen); ende November 1874; leg. Johannes Kunze.

Sillia ferruginea (Pers.) P. Karst. [*Sydowiellaceae*]

sub: *Sphaeria ferruginea* Pers., sur les jeunes pousses mortes du coudrier; dans les bois des environs de Courtrai.

Sirodesmium granulosum De Not. [*Coniosporaceae*]

su pali; né luoghi coltivati dei dintorni di Bellinzona; 1858; Franzoni.

Sphaerella euonymi (Kunze) Auersw. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. euonymi* Rabenh.; sulle foglie languenti dell'*Evonymus europaeus*; nei dintorni di Vercelli; Novembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Sphaerella lamprocarpi Pass. [*Mycosphaerellaceae*]

sulle squame fiorali e le brattee del *Juncus lamprocarpus*; nel torrente Baganza a S. Ruffino, presso Parma; Ottobre 1869; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Sphaerella maculiformis (Pers.) Auersw. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *S. maculaeformis* Fr.; sulle foglie di castagno; a Castelramiero presso Faenza; Novembre 1863; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. maculiformis* Fr.; Preszbung; leg. Richter; ex Herb. Richter, Flora Hungarica.

Sphaerella nebulosa (Pers.) Sacc. var. *veneta* De Not. [*Mycosphaerellaceae*]

sugli steli secchi del *Peucedanum venetum*; a Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1863; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Sphaerellopsis filum (Biv.) B. Sutton [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Ascochyta dianthi* Lib.; in foliis languescensibus *Dianthi barbati*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Sphaeria aucubae Westend. [*Hypoxylaceae*]

sur les feuilles languissantes de l'*Aucuba japonica*; dans les jardins; le R. P. Clém. Dumont.

Sphaeria balsamiana De Not. [*Hypoxylaceae*]

sulla corteccia dé gelsi annosi; a Persolino presso Faenza; agosto 1859; Caldesi.

Sphaeria berkeleyi Desm. [*Hypoxylaceae*]

sur les tiges mortes de l'*Heracleum spondylium*; aux l'environs de Courtrai.

Sphaeria clypeiformis De Not. [*Hypoxylaceae*]

sui sarmenti secchi del rovo; alla Spezia; 1857; Caldesi.

Sphaeria crinita Pers. [*Hypoxylaceae*]

sur les billes de bois pourries argont servi de support aux rails au chemin de fer de Bruges à Fabbeyne.

Sphaeria gigaspora Desm. [*Hypoxylaceae*]

sur les branches mortes d'un *Acer* à Louette-St. Pierre (M' Gust. Aubert).

Sphaeria helminthospora Ces. [*Hypoxylaceae*]

sui fusti secchi e più facilmente sulla parte superiore dé ramellini dell'*Artemisia campestris*; nei dintorni di Vercelli; estate 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Sphaeria laurocerasi Desm. [*Hypoxylaceae*]

sur les feuilles mortes du *Prunus laurocerasus*; aux environs d'Ypres.

Sphaeria limminghii Westend. [*Hypoxylaceae*]

sur le branches mortes de l'orme; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Sphaeria maculaeformis Pers. [*Hypoxylaceae*]

sub: *S. maculaeformis a castaneae* West.; sur les feuilles du chataignier (*Castanea vesca* L.); dans les jardins; sur les feuilles du chêne, du marronnier d'inde, etc.

Sphaeria millepunctata Nitschke [*Hypoxylaceae*]

sub: *S. millepunctata* Spreng.; ad ramos *Fraxini excelsioris*; per annum; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Sphaeria petasitidis Rabenh. [*Hypoxylaceae*]

sur les feuilles mourantes du *Petasites fragans*; au parc de Saint-George, à Courtrai.

Sphaeria rosicola Fuckel [*Hypoxylaceae*]

sub: *S. rosaecola* Fuck. f. *idaei*.; Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Sphaeria rostrata Fr. [*Hypoxylaceae*]

sur des branches mortes et tombées à terre du *Robinia pseudoacacia*; aux environs de Namur.

Sphaeria spiculosa Fr. [*Hypoxylaceae*]

sur les rameaux morts du lierre rampant (*Hedera helix*); à la campagne de Mr Goethals-Delivigne, près de Courtrai.

Sphaeria stipata Schwein. [*Hypoxylaceae*]

ad folia putrescentia *Fagi*; *Autumno*, *Hieme*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Sphaerobolus stellatus (Tode) Pers. [*Gaeastraceae*]

sub: *S. stellatus* Tode; su travi fracide di quercia; a Collecchio, presso Parma; Novembre 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. stellatus* Tode; ad ligna et culmos Graminum; *Autumno*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Sphaeronaema brunneo-viride Auersw. [*Incertae Sedis*]

Prunus pado; Jun 1779; *Prunus pado*; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Sphaeropsis caulicola (Wallr.) Fuckel ex Petr. & Syd. [*Botryosphaeriaceae*]

sub: *Sphaeria caulicola* Walh, assez commune sur les tiges mortes de la scabieuse deschamps (*Scabiosa arvensis*); aux environs d'Ypres.

Sphaerotheca castagnei Lév. [*Erysiphaceae*]

sub: *S. castagnei balsaminearum* Lév.; sull'*Impatiens nolitangere*; nella valle del Cervo, presso Campiglia, circondario di Biella; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. castagnei* Fuckel; on Humuli; Iglò; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Sphaerulina aceris (Lib.) Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Ascochyta aceris* Lib., in foliis languescens *Aceris pseudoplatani*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Sphaerulina frondicola (Fr.) Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Leptothyrium tremulae* Lib.; in foliis *Populi tremulae*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1832).

Sphaerulina hyperici (Roberge ex Desm.) Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria hyperici* Desm., sur les feuilles de l'*Hypericum elodes*; dans les marais de Gheluveelt et de Mons; le R. P. Clém. Dumont.

Sphaerulina myriadea (DC.) Sacc. [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Sphaeria myriadea* DC., sur les feuilles seches du chêne; en hiver.

Sphaerulina oxyacanthae (Kunze & J.C. Schmidt) Quaedvl., Verkley & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria oxyacanthae* Kunze; sur les feuilles vivantes de l'Aubépine.

Sphaerulina rehmana Jaap [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria rosae* Desm. sur les rosiers; à la campagne de Mr le Baron Guido Van Zuylen Nyevelt à St Croix-lez-Bruges; sur les feuilles languissantes de quelques espèces des roses du bengale; dans les jardins.

Sphaerulina westendorpii Verkley, Quaedvl. & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria rubi* Westend., sur les feuilles de différentes espèces de ronces; dans les bois des environs de Namur; Mr Belyneck.

Spilopodia arctii (Lib.) Höhn. [*Drepanopezizaceae*]

sub: *Phacidium arctii* Lib., ad folia *Arctii majoris* putrescentia; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Splanchospora ampullacea (Pers.) Lar.N. Vassiljeva [*Incertae Sedis*]

sub: *Massaria curreyi* Tul., ad *Tilia* ramos emortuos; prope Miinster in Guestphalia; Julio; legit Nitschke; Rabenhorst, Fungi europaei; sotto l'epidermide dei rami morti di tiglio; talora in società con *Cercospora tiliae* e *C. rabenhorstii*; nell'Orto botanico di Parma; Estate 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Sporendonema casei Desm. [*Incertae Sedis*]

sur la croûte des fromages salés de la Hollande et du Dauphiné.

Sporisorium andropogonis (Opiz) Vánky [*Ustilaginaceae*]

sub: *Ustilago ischaemi* Fuckel; sulle spighe dell'*Andropogon ischaemum*; nell'alveo della Baganza e del Taro, provincia di Parma; estate 1870; Passerini.

Sporisorium colchici Lib. [*Ustilaginaceae*]

in foliis *Colchici autumnalis*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Sporomega degenerans (Kunze) Corda [*Rhytismataceae*]

sub: *Hysterium degenerans* Fr., in ramis emortuis *Vaccinii uliginosi*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae.

Sporotrichum candidum Link [*Phanerochaetaceae*]

sur les tas de feuilles pourrissantes; Hiver.

Stagonospora atriplicis (Westend.) Lind [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Phoma atriplicinum* Westend.; sur les tiges de l'*Atriplex hortensis*; à Courtrai.

Stagonospora calystegiae (Westend.) Bubák [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Septoria calystegiae* Westend., sur les feuilles mourantes du *Calystegiae soldanella* R. Br.; dans les dunes d'Ostende; Mr L. Landzweert.

Stagonospora hennebergii (J.G. Kühn) Petr. & Syd. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Phoma hennebergii* J. G. Kiihn., in valvis, paleis et aristis *Tritici vulgaris* aestivi; loco Kreuth; 5 Aprilii 1877; Julius Kiihn; Rabenhorst, Fungi europaei.

Stagonospora neglecta (Westend.) Sacc. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Hendersonia neglecta* Westend. sur les gaines de l'*Arundo phragmites*; dans les fossés des Villes d'Ostende et de Neuport.

Stagonospora subseriata (Desm.) Sacc. [*Phaeosphaeriaceae*]

sub: *Hendersonia subseriata* Desm., sur les chaumes de l'*Erodium coeruleum*; dans les bruyères de Beverloo et de Gheluvet; Août.

Stagonosporopsis cucurbitacearum (Fr.) Aveskamp, Gruyter & Verkley [*Didymellaceae*] sub: *Didymella effuse* Sacc., sur les rameaux sec de l'*Artemisia vulgaris*; France-Fontainebleau (Seine-et-Marne); Mai 1884; Herbarium Feuilleaubeis.

Stammaria persoonii (Moug.) Fuckel [*Incertae Sedis*]

sub: *Peziza persoonii* Moug., ad *Equiseta arida*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sugli *Equisetum*; nella selva Pisana, presso il Gombo; Pi. Savi; Erbario Crittogamico Italiano; sugli *Equisetum*; ad Oldenico nella provincia di Vercelli; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray [*Steccherinaceae*]

sub: *Hydnum dichroum* Pers.; sulla corteccia degli alberi; nel Cantone ticino; 1862; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Hydnum pudorinum* Pers.; *Quercum ilicem*, in sylvis di Capodimonte; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei; sub: *Hydnum pudorinum* Pers.; ad truncum denudato et humi jacentem *Pini fulminis* ictu necatae; in H. Botan. Neap.; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Stegonsporium cellulolum Corda [*Melanconidaceae*]

sub: *S. cellulolum* Fr.; sulla corteccia di un *Acer pseudoplatanus* languente; a Cornigliano presso Genova; 1858; Dufour; Erbario Crittogamico Italiano.

Stegonsporium ovatum (Pers.) S. Hughes [*Melanconidaceae*]

sub: *Melanconium ovatum* Link, sui rami secchi del noce; presso Voltri, Liguria occidentale; 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *M. ovatum* Link; sur les troncs d'arbres morts; environs de Bruges; par Mr L. Matthys.

Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons [*Pleosporaceae*]

sub: *Pleospora allii* Schumach.; sugli scapi disseccati dell'*Allium porrum*; in un orto a Parma; Dicembre 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *P. allii* Ces. & De Not.; sur les

tiges seches de l'*Allium porrum*; France-Chailly (Seine-et-Marne); Novembre 1883; Herbarium Feuilleaubeis; sub: *Phoma albicans* Rob., sur les tiges et les péduncules des cichoracées; à Courtrai, le long du chemin de fer; sub: *P. herbarum* Rabenh.; sugli steli disseccati della *Ferula tingitana*; presso Cagliari; 1860; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. herbarum* Tul. a *allii* Lasch; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *P. herbarum* f. *petiolicola*; sui pezioli secchi della *Robinia*; comune al Monte Ritten presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; 1864; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria herbarum* Pers., sub: *S. herbarum* Pers. d. *dianthi* Westend.; sur les calices morts d'un *Dianthus*; dans un jardin; Mr Clement Dumont; sub: *S. herbarum* Pers. b. *asparagi* Fr. var. c. *eryngii* Nob.; sur les tiges mortes de l'asperge; dans les jardin légumes à Courtrai; la var. b sur l'*Eryngium maritimum*; dans les dunes d'Ostende; sub: *S. herbarum* Pers. var. *allii* Desm.; sur les scapes de l'*Allium porrum*; dans les jardins légumes; sub: *S. herbarum* Fr.; sur les tiges du *Faba sativa*, sub: *Sphaeria pisi* Sowerby, sur les tiges et les gousses sèches des pois (*Pisum sativum*). Nouvelle pour la Flore Belge.

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. [Stereaceae]

sub: *S. hirsutum* Fr.; su pali; nelle campagne di Val Intrasca, Lago Maggiore; 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *S. hirsutum* Fr.; su tronchi d'alberi disseccati; né dintorni di Serravalle Scrivia; Ottobre 1859; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Thelephora hirsuta* Willd.; sur des troncs morts; sub: *Stereum ochraceum* De Not., su pali di *Betula alba*; ad una siepe, sopra Santino in Valle Intrasca, Lago Maggiore; Autunno 1862-63; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Stereum lilacinum Pers. [Stereaceae]

sul tronco di un noce; in Val Intrasca, al Lago Maggiore; Autunno 1859; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Stereum rubiginosum Fr. [Stereaceae]

su tronchi d'alberi morti; a Serravalle di Scrivia; Ottobre 1859; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sur un tronc mort; aux environs de Mons; Le R. P. Dumont.

Stereum rugosum Pers. [Stereaceae]

sub: *S. rugosum* Fr.; ad truncos putridos Quercus suber; in Sierra di Palma; Willkomm.

Stictis arundinacea Pers. [Stictidaceae]

sub: *S. luzulae* Lib.; in foliis exsiccatis *Luzulae maximae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae; sub: *Stictis sesleriae* Lib., in foliis exsiccatis *Sesleriae coeruleae*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Stigmata ostruthii (Fr.) Oudem. ex Sacc. [Venturiaceae]

sub: *Sphaeria ostruthii* Fr., sur les feuilles de l'*Imperatoria sylvestris*; dans les fosses des fortifications de la ville de Menin.

Stigmatidium schaeferi (A. Massal.) Trevis. [Mycosphaerellaceae]

sub: *Sphaeria epicymatia* Wallr., Glaggenitz, Austria inf.; 6. 1857; leg. Heufler.

Stigmia pulvinata (Kunze) M.B. Ellis [Mycosphaerellaceae]

sub: *C. pulvinatum* Kunze; sur les branches mortes du tilleul; au jardin de l'hôpital de Bruges.

Stilbella fimetaria (Pers.) Lindau [Incertae Sedis]

sub: *Stilbum erythrocephalum* Ditmar, sur les crottes de lapin; dans les bruyères de Gheluvelt; Novembre.

Stilbospora affinis De Not. [*Incertae Sedis*]

su ramoscelli languenti di *Betula alba*; nelle pasture di Possaccio in Valle Intrasca, al Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Stilbospora macrosperma Pers. [*Incertae Sedis*]

in carpino; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sur les branches et rameaux morts, tombés à terre de l'orme; au Parc de Saint-George, à Courtrai; Hiver; in cortice *Carpini betuli*; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1837).

Strobilurus tenacellus (Pers.) Singer [*Incertae Sedis*]

sub: *Agaricus tenacellus* Pers.; nei boschi, tra le foglie e sui coni dei pini e degli abeti; Sala e Collecchio, nella provincia di Parma; Marzo 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Stromatoseptoria castaneicola (Desm.) Quaedvl., Verkley & Crous [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Septoria castaneicola* Desm., sur les feuilles languissantes du chataignier; au camp de Beverloo.

Stylodothis puccinioides (DC.) Arx & E. Müll. [*Dothideaceae*]

sub: *Dothidea puccinioides* Fr.; in ramis et foliis *Buxi sempervirentis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837); sur les rameaux morts du buis (*Buxus sempervirens*); au jardin de St. George, à Courtrai; sub: *D. puccinioides* Fr.; sui ramoscelli secchi della *Syringa vulgaris*; a Riva di Valsesia; 1857; Carestia.

Suillus bovinus (L.) Roussel [*Suillaceae*]

sub: *Boletus bovinus* L.; pinete; nell'Appennino di Voltri, nella Liguria occidentale; Novembre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Suillus granulatus (L.) Roussel [*Suillaceae*]

sub: *Boletus granulatus* L.; nelle pinete; lungo la Polcevera, sopra Genova; Ottobre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Suillus viscidus (L.) Roussel [*Suillaceae*]

sub: *Suillus aeruginascens* Secr. ex Snell, sub: *Boletus viscidus* L.; prope Botzen, in Tiroli meridionali; Aug 1868; Hohembilhel, Heufler; Rabenhorst, Fungi europaei.

Sydowiella fenestrans (Duby) Petr. [*Sydowiellaceae*]

sub: *Sphaeria fenestrans* Duby; sur les tiges mortes de l'*Epilobium spicatum*; aux environs d'Audenarde; Mr Tosquinet.

Synchytrium anemones (DC.) Woronin [*Synchytriaceae*]

sub: *S. anemones* Woronin; alla base dei picciuoli, dé scapi e sulle nervature dell'*Anemone nemorosa*, né castagneti di Collecchio, presso Parma; Aprile, Maggio 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Sphaeronaema anemones* Lib., in petiolis et foliis *Anemones nemorosae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Synchytrium mercurialis Fuckel [*Synchytriaceae*]

sub: *Sphaeronaema mercurialis* Lib., in petiolis et foliis *Mercurialis perennis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Tapesia epithelephora (Saut.) Sacc. [*Mollisiaceae*]

sub: *Peziza epithelephora* Saut., sui ceppi fracidi dei faggi; a S. Giovanni d'Andorno, provincia di Biella in Piemonte; Agosto 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Taphrina alni (Berk. & Broome) Gjaerum [*Taphrinaceae*]

sub: *Exoascus alni* de Bary; Franconia: Bayreuth; 8.1874; Ex herb. de Thümen.

Taphrina bullata (Berk. & Broome) Tul. [*Taphrinaceae*]

sub: *Ascomyces bullatus* Berk. f. *crataegi*; Bohemia: Zigwald; 7.1873; sub: *Ascomyces bullatus* Berk. f. *Pyri communis*; Bohemia: Teplitz; 8.1873.

Taphrina caerulescens (Desm. & Mont.) Tul. [*Taphrinaceae*]

sub: *Ascomyces caerulescens* Mont.; sur les feuilles du chêne (*Quercus robur*); aux environs de Namur (Mr l'Abbé Bellynck).

Taphrina deformans (Berk.) Tul. [*Taphrinaceae*]

sub: *Exoascus deformans* Berk.; nella pagina superiore delle foglie sformate di pesco; in un orto a Madregolo, presso Panna; Maggio 1867; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Taphrina polyspora (Sorokīn) Johans [*Taphrinaceae*]

sub: *Ascomyces polysporus* Sorok.; an den B15.ttern von *Acer tartaricum* L.; Kazan; N. Sorokin.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Taphrina pruni (Fuckel) Tul. [*Taphrinaceae*]

sub: *Exoascus pruni* Fuckel; ad *Pruni padi* fructos; Zürich, Helvetiae; 6. 1888; leg. G. Winter.

Taphrina tosquineti (Westend.) Magnus [*Taphrinaceae*]

sub: *Ascomyces tosquineti* Westend.: sur les feuilles de l'*Alnus glutinosa*; aux environs d'Audenarde; W Tosquinet; sub: *Exoascus alnitorqua* Tul. f. *Alni incanae* Tul.; An der Frticten von *Alnus incana*; September 1882; Julius Kiihn.; Rabenhorst, Fungi europaei.

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara [*Tapinellaceae*]

sub: *P atrotomentosus* Fr.; Rinnberg; Heufler.

Terana coerulea (Lam.) Kuntze [*Phanerochaetaceae*]

sub: *Corticium coeruleum* Ft; ad una palanca; a Crevola, presso Varallo in Valsesia; 1869; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Thelephora coerulea* Schrad.; sur des branches à demi pourriés; aux environs de Louvain; Mr l'Abbè Leburton; sub: *C. coeruleum* Fr.; sui pali né vigneti; dintorni di Serravalle alla Scrvia; Autunno 1860; Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Thelephora coerulea* Schrad.; in lignis et corticibus putrescentibus; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Terfezia arenaria (Moris) Trappe [*Pezizaceae*]

sub: *T leonis* Tul.; terreno sabbioso; nelle selve e macchie di Caltagirone, Dorillo, Alcerito nella Sicilia meridionale; 1868; Inzenga; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.; sub: *T leonis* L. R. et C. Tulasne; nelle sabbie marittime della Sardegna meridionale; primavera 1858; Gennari; sub: *T. leonis* Tul.; in sabuletis ad mare; prope urbe Arboream (Oristano) insulae Sardiniae; Maj 1879; leg. Eg. Melis, sylvarum inspector. Société Helvétique.

Thelephora carnea Schrad. ex J.F. Gmel. [*Thelephoraceae*]

sur des branches mortes; dans la cour de Civil de Byloke, à Gand; Mr le Vicaire Coemans.

Thelephora terrestris Ehrh. [*Thelephoraceae*]

sur la terre, dans les bruyères; Beverloo, ainsi que dans les bois de Pins des environs de Bruxelles et d'Ypres; sub: *T. laciniata* Pers.; su radici putrescenti di *Erica vulgaris*; nelle selve di Val Intrasca, al Lago Maggiore; Autunno 1862; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *T. laciniata* Pers.; sulle radici morte, su massi granitici a fior di terra; a S. Giovanni di Campiglia, nel Biellese; Settembre 1862; Cesati; Erbario Crittogamico; sub: *T. laciniata* Fr.; sur la terre dans les bois de sapin; aux environs de Louvain; Automne; par le Rev. Pere Leburton.

Therrya pini (Alb. & Schwein.) Höhn. [*Rhytismataceae*]

sub: *Phacidium pini* Schm. et Kunze; sur les branches et rameaux secs du *Pinus sylvestris*; dans les plantations du camp de Beverloo.

Thyridaria macrostomoides (De Not.) M.E. Barr [*Thyridariaceae*]

sub: *Lophiostoma macrostomoides* De Not., sulla scorza dei vecchi salici; nei dintorni di Parma; primavera 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Thyronectria concentrica (Mont. & Fr.) Voglmayr & Jaklitsch [*Incertae Sedis*]

sub: *Tubercularia concentrica* Mont. & Fr., ad folia marcescentia *Agaves americanae*; etam in H. Botanico Neapoli; sat frequens utraque fromae; Cesati; Rabenhorst, Fungi europaei.

Thyronectria cucurbitula (Tode) Jaklitsch & Voglmayr [*Incertae Sedis*]

sub: *Scoleonectria cucurbitula* (Tode) C. Booth, sub: *Nectria cucurbita* var. *buxicola* Mont.; rameaux morts du buss; à St. Pons de Gemenes; 20 fevrier 1899; sub: *Nectria cucurbita* (Tode) Fr.; ad pini junioris corticem; in sylva prope Sugenheim, Franconiae mediae; leg. Dr. Rehm; Rabenhorst, Fungi europaei.

Thyronectria rosellinii (Carestia) Jaklitsch & Voglmayr [*Incertae Sedis*]

sub: *Nectria rosellinii* Carestia, in ramis *Abietis pectinatae*; Abbé Carestia; Riva di Valsesia in Pedemontio; Rabenhorst, Fungi europaei.

Thyronectria sinopica (Fr.) Jaklitsch & Voglmayr [*Incertae Sedis*]

sub: *Nectria sinopica* Fr., sui rami dell'ellera; al Sasso sopra Locarno nel Canton Ticino; 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Tolyopocladium capitatum (Holmsk.) C.A. Quandt, Kepler & Spatafora [*Ophiocordycipitaceae*]

sub: *Xylaria capitata* Kx, parasite sur l'*Elaphomyces granulatus*; dans les bois de Gheluveld, près d'Ypres; rare.

Torula disciformis Corda [*Torulaceae*]

[...]; bei Duisburg; Heufler.

Torula heterospora Westend. [*Torulaceae*]

sur des cristaux de creme de tartre conservés dans un endroit humide; à Bruges; Mr Matthys.

Torula rhizophila Corda [*Torulaceae*]

Carex arenaria Bellardi; dans les dunes de Ravenszyde, près d'Ostende. sur les rhizomes exondées de l'*Arundo phragmites*; dans les fossés des prairies, le long de la Lys à Courtrai.

Trachyspora alchemillae (Pers.) Fuckel [*Phragmidiaceae*]

sub: *Uredo intrusa* Grev., sur les feuilles de l'*Alchemilla vulgaris*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert; sub: *Uromyces alchemillae* Lév.; sur les feuilles de l'*Alchemilla vulgaris*; aux environs de Louette-Saint-Pierre, Namur; Mr Gust. Aubert.

Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus hirsutus* (Wulfen) Fr., sugli ontani morti o languenti; presso Serravalle alla Scrivia; Autunno 1858; Ferrari, su pali vecchi; a Persolino, presso Faenza; Marzo 1861; leg. Caldesi.

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvardeen [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus zonatus* Fr.; [...], Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Trametes suaveolens (L.) Fr. [*Polyporaceae*]

sub: *T. suaveolens* Fr.; sui salici giovani languenti; presso Serravalle alla Scrivia, nella Liguria transappennina; Primavera ed Autunno 1858; Ferrari.

Trametes versicolor (L.) Pilk [*Polyporaceae*]

sub: *Polyporus versicolor* Fr.; alla base dei vecchi tronchi; 23 gennaio 1889; sub: *Polyporus versicolor* Fr.; sui pali delle viti; nella Valle del Serchio, in Toscana; 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Polyporus versicolor* Fr.; sur les troncs d'arbres morts.

Tranzschelia anemones (Pers.) Nannf. [*Tranzscheliaceae*]

sub: *Puccinia anemones* Pers., Borussia rhen: Bonn; 5. 1874; leg. Kornicke; Ex herb. de Thümen; Pragae; [...]; Ex herb. de Thümen; in *Anemones alpina* L. foliis vivis; prope St. Moriz, Ober-engadin (Helvetiae); rarissima; alt. ca. 1850 m; August 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 123; ad *Atragenes alpinae* L. folia petiolisque; Rhaetia: prope Cresta in valle "Avers"; Juli 1880; leg. F. 'User; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici n° 124; in *Anemone nemorosa*; Mai; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sur les feuilles de l'*Anemone nemorosa*; aux environs d'Avers; environs de Namur; le Rev. Pére Bellyncq; al Moncenisio, presso il Villaggio La Fenera; Agosto 1857; Cesati, Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie dell'anemone; nei colli di Cornigliano, presso Genova; Aprile 1857; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie dell'anemone; dai dintorni di Biella; Aprile 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Puccinia thalictri* Chev.; ad *Thalictri flavi* L. folia; in locis uliginosis: "Au" prope Zürich (Helvetiae); rarissima; Jul 1880; leg. G. Winter; Johannes Kunze, Fungi selecti exsiccati, Fungi helvetici no. 127.

Tranzschelia discolor (Fuckel) Tranzschel & M.A. Litv. [*Tranzscheliaceae*]

sub: *Aecidium quadrifidum* DC. sulle foglie dell'*Eranthis hyemalis*; dall'Agro bolognese; Marzo 1864; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sulle foglie dell'*Eranthis hyemalis*; dalle colline di Varano de Melegari, nel Parmigiano; Maggio 1865; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano; in *Eranthis hyemali*; Parmae; Vere; G. Passerini; sur les feuilles de l'*Anemone coronaria*; au jardin de Mr Delombaerde; horticulteur a Courtrai; été; sulle foglie dell'*Helleborus hiemalis*; dintorni di Bologna; IV. 1887; F. Delpino; Herb. Delpino.

Tranzscheliella hypodytes (Schldtl.) Vánky & McKenzie [*Tranzscheliaceae*]

sub: *Ustilago hypodytes* (Schldtl.) Fr., sub: *U. hypodytes* (Pers.) Tul.; [...]; 5 Marzo 1876; sub: *U. hypodytes* (Pers.) Tul.; a l'intérieure des gaines du *Triticum repens*; dans les fortifications d'Ostende.

Tranzschelia pruni-spinosae (Pers.) Dietel [*Tranzscheliaceae*]

Puccinia prunorum f. *armeniaca*; alla pagina inferiore delle foglie dell'Albicocco; nei dintorni di Lucca; Autunno 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; *Prunus domestica*; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Trechispora farinacea (Pers.) Libert [*Hydnodontaceae*]

sub: *Hydnum farinaceum* Pers., sur des billes de bois ayant servi de supports aux rails du chemin de fer; Bruges à Ostende.

Tremella indecorata Sommerf. [*Tremellaceae*]

ad ramos siccos *Coryli* et *Aceris pseudoplatani*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Triphragmium ulmariae (DC.) Link [*Raveneliaceae*]

sub: *Uromyces ulmariae* Lév., sur les feuilles et les tiges du *Spiraea ulmaria*; aux environs de Louett-Saint-Pierre; Gust. Aubert.

Tryblidaria melaxantha (Fr.) Boud. [*Patellariaceae*]

sub: *Patellaria melaxantha* Fr., in cortice *Abietis excelsae*; Rivae; leg. Carestia; Rabenhorst, Herb. mycologicum ed. II.

Tryblidiopsis pinastri (Pers.) P. Karst. [*Rhytismataceae*]

sub: *Tympanis pinastri* (Pers.) Tul. & C. Tul., sugli abeti atterrati; nelle selve opache della Valle Vogna, presso Riva in Valsesia; 1865; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Triblidium elatinum (Ach.) Petr. [*Triblidiaceae*]

sub: *Hysterium elatinum* (Ach.) Fr.; au Tannen und Fichten in den Wäldern um Reichenberg in Bohnrien; im Juli; leg. W. Siegmund; Rabenhorst, Fungi europaei.

Trichaptum abietinum (Pers. ex J.F. Gmel.) Ryvarden [*Incertae Sedis*]

sub: *Polyporus abietinus* (Dicks.) Fr., Helvetia: Neuchatel; 4. 1874; leg. Dr Morthier; Ex herb. de Thümen.

Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden [*Hymenochaetaceae*]

sub: *Irpex fuscoviolaceus* Fr.; su faggi putrescenti; ai Camaldoli, nel Casentino, Toscana; Ottobre 1866; Marcucci; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Trichoderma citrinum (Pers.) Jaklitsch, W. Gams & Voglmayr [*Hypocreaceae*]

sub: *Hypocrea citrina* Pers.; al piede di antichi faggi, spandendosi dalle scoperte radici dei medesimi sulla cotenna erbosa ed anche sulla nuda terra; presso S. Giovanni d'Andorno nel Biellese; Settembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *H. citrina* Pers.; prope Wien, Austriae; Sept 1882; leg. Heufler; sub: *Sphaeria citrina* Pers., in fagetis ad terram et folia delapsa; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Trichoderma viride Pers. [*Hypocreaceae*]

sur des troncs mort du frane; dans la cour de l'infermerie militaire de Menin.

Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. [*Geoglossaceae*]

sub: *Geoglossum hirsutum* Pers.; pascoli torbosi; presso Brione nel Canton Ticino; Ottobre 1862;

Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Geoglossum hirsutum* Pers.; dans les prairies tourbeuses; environs de Dochamps (Luxembourg); Mr Crépin.

Tricholoma acerbum (Bull.) Quél. [*Tricholomataceae*]

sub: *Agaricus acerbus* Bull.; nei castagneti; sopra Voltri, nella Liguria occidentale; Ottobre-Novembre 1860; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Tricholoma albobrunneum (Pers.) P. Kumm. [*Tricholomataceae*]

sub: *Agaricus albo-brunneum* Pers.; nei castagneti; Polcevera, presso Genova; Ottobre 1859; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano.

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. [*Tricholomataceae*]

sub: *Agaricus terreus* Schaeff.; nei boschi di abeti, tra le foglie putrescenti; al Ferlaro, presso Parma; Autunno 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Trichopezizella barbata (Kunze ex Fr.) Raitv. [*Solenopeziaceae*]

sub: *Lachnella barbata* Fr.; sui rami secchi della Lonicera nigra; a Riva in Valsesia; 1863; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Trichophaea gregaria (Rehm) Boud. [*Pyronemataceae*]

sub: *Peziza gregaria* Rehm, in der Harth auf Waldwegen; Leipzig; Aug 1873; leg. G. Winter; Rabenhorst, Fungi europaei.

Trichothecium roseum (Pers.) Link [*Incertae Sedis*]

ad corticem et ligna arborum; Hieme; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Trimmatostroma betulinum (Corda) S. Hughes [*Mollisiaceae*]

sub: *Coniothecium betulinum* Corda, sur les branches mortes du bouleau; aux environs de Courtrai; décembre; *Betula alba*; Lipócz; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Trimmatostroma salicis Corda [*Mollisiaceae*]

sub: *Coniothecium amentacearum* Corda, in salice; Iglò; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sur des branches mortes de saule; au jardin de Mr Devriesere, jardinier-fleuriste; à Courtrai; su rami languenti di *Salix capraea*; presso Bolzano, Tirolo meridionale; 1865; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Triphragmium ulmariae (Schwein.) Link [*Raveneliaceae*]

sub: *T. ulmariae* Link; sulle foglie della *Spiraea ulmaria*; nei dintorni di Domodossola; Primavera 1862; Rev. Gagliardi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *T. ulmariae* Link; sur les feuilles du *Spiraea ulmaria*; à Bellefontaine, près de Louette-Saint-Pierre, province de Namur; M' Gust. Aubert.

Trochila craterium (DC.) Fr. [*Cenangiaceae*]

sub: *T. craterium* Fr.; spesso accompagnata dal *Myxosporium paradoxum* (DNtrs. Microm. Dec. II n. 10); Val Intrasca al Lago Maggiore; 1866; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Trochila ilicina (Nees) Greenh. & Morgan-Jones [*Cenangiaceae*]

sub: *Stegia ilicis* Fr.; sulle foglie sternate dell'Agrifoglio; al Lago Maggiore; Autunno 1860; De Notaris, Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Stegia ilicis* Fr.; sulle foglie sternate dell'Agrifoglio; Isola Bella; Autunno 1860; De Notaris, Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub:

Stegia ilicis Fr.; sulle foglie sternate dell'Agrifoglio; dintorni di Locarno; Autunno 1860; De Notaris, Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Eustegia ilicis* Chev.; sur les feuilles tombées du houx; sub: *Eustegia ilicis* Chev.; Belgio; Libert.

Trochila laurocerasi (Desm.) Fr. [*Cenangiaceae*]

sub: *Phacidium laurocerasi* Desm., sur les feuilles mortes du *Prunus laurocerasus*; aux environs d'Ypres; sub: *T. laurocerasi* Fr.; sulle foglie secche e sternate del lauroceraso; a Persolino presso Faenza; Giugno 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Tromera xanthostigma C. Massal. [*Sareaceae*]

sulle cicatrici resinose della scorza dei larici ed abeti; nelle folte selve di Riva in Valsesia; compagna per lo più alla *Coniocybe baeomycioides*; Erbario Crittogamico Italiano.

Tryblidaria melaxantha (Fr.) Boud. [*Patellariaceae*]

sub: *Peziza melaxantha* Fr., sul ceppo di un abete; all'alpe Pianà de Servei sopra Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Tubaria conspersa (Pers.) Fayod [*Tubariaceae*]

sub: *Agaricus conspersus* Pers.; tra cespugli nelle alluvioni arenose dei torrenti; Parma e Baganza, nell'agro Parmense; Ottobre 1869; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Tuber aestivum Vittad. [*Tuberaceae*]

querzeti; nei dintorni di Bobbio; estate 1861; E. Buelli; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *T. aestivum* Bull.; im mittlern und nördlichen Europa als Perigord-triiffel 'im Handel; Perigueux, Dept. der Dordogne in Frankreich; Hohenack. Arzn. U. Handelspfl. no. 710; Fungi, Gasteromycetes - Cryptogamia Fungi; in Nord- Italien unter dem Namen tartufo nero agostano bekannt. Piemont. Hohenack. Arzn. U. Handelspfl. no 710a; [...]; Apr 1856; De Notaris.

Tuber borchii Vittad. [*Tuberaceae*]

nelle selve dei colli presso Serravalle alla Scriva; febbraio 1858; Ferrari.

Tuber brumale Vittad. [*Tuberaceae*]

In Nord-Italien tartufo nero, trifola nera ordinaria; Wird im Herbst und Winter gesamt-melt; Piemont; Hohenack. Arzn. U. Handelspfl. no 711; Fungi, Gasteromycetes -Cryptogamia Fungi.

Tuber macrosporum Vittad. [*Tuberaceae*]

colline e monti sopra Casigliano nella provincia di Parma; 1868; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Tuber magnatum Pico [*Tuberaceae*]

contorni di Faenza; Novembre 1863; leg. Caldesi; In Nord-Italien unter dem Namen triffola bianca beliebt. Im Herbst und winter; Im Lehmboden in Piemont; Hohenack. Arzn. u. Handelspfl. no 713, Fungi, Gasteromycetes - Cryptogamia Fungi; nei dintorni di Costigliole, provincia di Asti; 1860; Bucco; Erbario Crittogamico Italiano.

Tuber melanosporum Vittad. [*Tuberaceae*]

Rocca di Perti presso Finalborgo nella Liguria occidentale; gennaio 1858; Fossati.

Tuber oligosporum Vittad. [*Tuberaceae*]

In den vobergen der Appenninen Piemonts; im Herbst ausgegraben; Montferrat, Piemont; Hohenack. Arzn. u. Handelspfl. no. 712; Fungi, Gasteromycetes Cryptogamia Fungi; boschi; Castiglion dei Pepoli; Luglio 1889; F. Delpino, Herb. Delpino; boschi; Castiglion dei Pepoli; Agosto 1889; E Delpino, Herb. Delpino.

Tubercularia expallens Fr. [*Nectriaceae*]

sur un tronc mort de frêne; dans la cour de l' infirmerie militaire de Menin.

Tubercularia granulata Pers. [*Nectriaceae*]

sur des branches mortes; aux environs de Menin.

Tubercularia minor Link [*Nectriaceae*]

sur des branches mortes du murier; dans les jardin de M. Vanderplancken, jardinière-fleuriste à Menin.

Tubercularia mutabilis Nees [*Nectriaceae*]

sur les rameaux morts du *Kerria japonica*; dans le jardin de Mme Vanlandehem-Anne, à Termonde.

Tubercularia pinastri Corda [*Nectriaceae*]

in foliis *Pini sylvestris* dejectis; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Tulostoma brumale Pers. [*Agaricaceae*]

sub: *T. mammosum* Fr.; né luoghi arenosi; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Autunno 1869; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *T. mammosum* Fr.; né pascoli; presso Serravalle alla Scrivia; Primavera 1858; Ferrari.

Tympanis alnea (Pers.) Fr. [*Tympanidaceae*]

sub: *T. alnea* Fr.; sui rami secchi dell'ontano comune; a Riva in Valsesia; 1864; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano.

Tympanis conspersa (Fr.) Fr. [*Tympanidaceae*]

sub: *T. conspersa* Fr.; ad ramos dejectos *Pyri mali*; Aestate; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. H (1832).

Typhicola typharum (Desm.) Crous [*Pleosporaceae*]

sub: *Sphaerella typharum* Rabenh., sulle foglie morte della *Typha angustifolia*; in un laghetto, né boschi di Collecchio, presso Parma; estate 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Typhula culmigena (Mont. & Fr.) Berthier [*Typhulaceae*]

sub: *Pistillaria culmigena* Fr., sur les feuilles et chaumes pourrissantes des *Triticum* et autres graminées; à Gentinnes, aux environs de Namur; Mr le Comte A. De Limminghe et J. Barbier.

Typhula incarnata Lasch. [*Typhulaceae*]

fra le foglie ed erbe giacenti sul suolo ed in lenta putrefazione; Vercelli; Novembre 1861; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Unguicularia aspera (Moug. ex Fr.) Nannf. [*Incertae Sedis*]

sub: *Excipula aspera* Fr., sur les tiges sèches de l'*Osmunda regalis*; aux environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert.

Uredo andropogonis Ces. [*Pucciniaceae*]

sull'*Andropogon ischaemum*; Vercelli; dall'autunno sino all'inverno; 1860-61; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Uredo arundinacea Houel [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles de l'*Arundo phragmites*; le long du chemin de fer de Courtrai, à Heule.

Uredo caricina DC. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie della *Carex hirta*; a Bolzano, Tirolo meridionale; Giugno 1867; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Carex acuta* et *C. pseudo-cyperus*; aux environs de Namur; d'ou Mr le Comte Alfred De Limminghe a eu la bonté de nous la faire connaitre.

Uredo carpini Desm. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del carpino; in una siepe ad Intra, Lago Maggiore; Autunno 1869; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Uredo cichoracearum DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles d'un apargia et du Crepis; Aeltre, dune d'Ostende.

Uredo comandrae (Peck) Sacc. [*Pucciniaceae*]

Salt Lake City; August 1883; Marcus E. Jones, A.M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah.

Uredo elymi Westend. [*Pucciniaceae*]

sur les parties latérales des nervures saillantes de la face inférieure des feuilles de l'*Elymus arenarius*, aux environs d'Ostende; d'ou M. L. Landzwert fils, pharmacien à Ypres.

Uredo filicum Desm. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. filicum* Klotsch; sulla *Cystopteris fragilis*; nel Biellese e nei dintorni di Locarno; 1864; Cesati, Daldini; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. filicum* Chev.; sur les frondes de l'*Aspidium fragile*; aux environs de Louvain; Automne; d'ou le Rev. Pére Leburton.

Uredo formosa Rabenh. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Leontodon*; à la papeterie de Namur; où Mr l'Abbé Bellynck l'a trouvé ou printemps.

Uredo fulva Schumach. [*Pucciniaceae*]

bei Glaggenitz; Heufler.

Uredo hypodytes Desm. [*Pucciniaceae*]

a l'intérieur des gaines de l'*Elymus arenarius*; dans nos dunes aux environs de Biankenberghe, par le Rév. Pére Leburton.

Uredo laburni DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Cytisus laburnum*; dans un jardin de Namur; Mr J. Barbier.

Uredo lathyri Bellynck [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Lathyrus pratensis*, à Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Uredo longicapsula DC. [*Pucciniaceae*]

Botzen, Tirol; Hausmann; sur les feuilles du peuplier noir et sur celles du bouleau; commune.

Uredo melampyri Rebent. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Melampyrum sylvaticum*; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Uredo mixta Steud. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles, les pétioles et les rameaux de plusieurs espèces de saules; aux environs de Namur; Mr J. Barbier.

Uredo ovata F. Strauss [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du peuplier-tremble; aux environs de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Uredo paeoniarum Desm. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles des Pivoines; souvent mele ou *Cronartium paeoniae*; dans les jardin de M^{me} Veuve Pycke, à Courtrai.

Uredo parnassiae DC. [*Pucciniaceae*]

sur les deux faces des feuilles des *Parnassia palustris*; dans les bois de Zillebeke; près de Ypres.

Uredo phaseolarum R. Hedw. ex DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. phaseolorum* var. b. *psisi*; sur les feuilles des pois (*Pisum sativum*); aux environs de Namur; Mr Bellynck.

Uredo polygonorum DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles vivantes du *Polygonum persicaria*; sub: *Uredo polygonorum convolvuli* Westend.; sur les feuilles de *Polygonum convolvulus*; souvent mele avec le *Puccinia polygoni-convolvuli*; sul *Polygonum aviculare*; nei dintorni di Lucca; Luglio 1860; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano.

Uredo potentillarum DC. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Fragaria sterilis*; dans les bois des environs de Courtrai.

Uredo poterii (Schltdl.) Spreng. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du *Poterium sanguisorba*; aux environs de Namur; d'ou le Rev. Père Bellynck nous l'a adrèse, Hiver.

Uredo pruni Castagne [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles du prunier (*Prunus domestica*); à Gand.

Uredo ranunculacearum DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *Polycystis ranunculacearum* Fr., sulle foglie dell'*Hepatica triloba*; al Castello di Comino in Monferrato; Maggio 1862; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *P. ranunculacearum* Fr. v. *ranunculi*; sur le tiges, les pétioles et les feuilles des Renoncules; dans les prairies des environs de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert; sur les feuilles de l'*Anemone nemorosa*; dans les bois des environs de Namur; M^r Bellynck.

Uredo rhinanthacearum DC. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. rhinanthacearum* a. *euphrasiae* Nob.; sur les feuilles de l'*Euphrasia odontites*; commune.

Uredo rosae Pers. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles des rosiers sauvages et cultivés; Mr L. Lanzweert; sulle foglie delle rose; né dintorni di Firenze; Giugno 1860; Caldesi.

Uredo ruborum DC. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del rovo comune; nella Valle del Serchio in Toscana; Autunno 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles des ronces; dans les bois du Mont d'Avelghem; été.

Uredo scirpina Westend. [*Pucciniaceae*]

sur les chaumes du *Scirpus lacustris*; à l'étang de Zillebeke, près d'Ypres; Mr Tosquinet.

Uredo tremellosa M. J. Decne. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. tremellosa* Strauss; sur les feuilles de la *Campanula trachelium*, rapunculoides et autres.

Uredo tropaeoli Desm. [*Pucciniaceae*]

sur la face inferieure des feuilles du *Trapeolum canariensis*; dans les jardin de Mr D'Hondt, à Courtrai.

Uredo urceolarum DC. [*Pucciniaceae*]

dans l'intérieur et l'extérieur des urcéoles des laiches et surtout du *Carex arenaria*; camp de Beverloo et bois de Zillebeke, pres d'Ypres.

Uredo valerianae Schumach. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. valerianae* Desm.; sur les feuilles de la *Valeriana officinale*; aux environs de Trouchiennes, près de Gand; par le Rev. Pére Leburton.

Uredo viciae Reben. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles des vesces; aux environs de Namur (Mr l'Abbé Bellynck) et de Charleroi (M' Tosquinet).

Uredo sp. [*Pucciniaceae*]

sull'*Avena sativa*; VII. 1889; Orto Botanico di Bologna; F. Delpino, Herb. Delpino.

Urocystis anemones (Pers.) G. Winter [*Urocystidaceae*]

sub: *Urocystis pompholygodes* Rabenh., in *Anemone nemorosa*; Maj; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhoh viranyabol; sub: *U. pompholygodes* f. *nemorosa*; Maj; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhoh viranyabol; sub: *U. pompholygodes* f. *eranthidis*; sulle foglie, pezioli e scapi dell'*Eranthis hyemalis*, nei campi; presso Panna; Aprile 1874; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Urocystis colchici (Schltdl.) Rabenh. [*Urocystidaceae*]

sub: *Polycystis colchici* Lév.; sur les feuilles du *Colchicum autumnale*; à Dave, près de Namur; Mr Bellynck.

Urocystis ranunculi (Lib.) Moesz [*Urocystidaceae*]

sub: *Sporisorium ranunculi* Lib., in foliis *Ranunculi repentis*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Urocystis violae (Sowerby) A.A. Fisch. Waldh. [*Urocystidaceae*]

sub: *Uredo violarum* DC., sur les feuilles vivantes du *Viola odorata*; dans les jardin à Namur (M' Bellynck), ainsi qu' a Courtrai.

Uromyces amygdali Pass. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie vive del mandorlo; a Vigheffio, presso Parma; autunno 1865; Passerini; Erbario

Crittogamico Italiano; sulle foglie vive del pesco; in Val Intrasca (Lago Maggiore); autunno 1865; De Notaris; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces anthyllidis (Grev.) J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

Vicia sp.; Oldenico (Vercelli); Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces appendiculatus (Pers.) Unger var. *appendiculatus* [*Pucciniaceae*]

sub: *U. appendiculatus* Pers. f. *phaseoli*; sulle foglie del fagiolo; Oldenico presso Vercelli; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. appendiculatus* Pers. f. *phaseoli*; sulle foglie del fagiolo; presso Bolzano; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. appendiculatus* Pers. f. *phaseoli*; sulle foglie del fagiolo; nelle adiacenze di Como; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. phaseoli* Pers.; dans les jardin de l'école de la rue Hennequin; Aube; Troyes; Nov. 1889; A. Guyot; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sub: *Uromyces phaseolorum* de Bary, Sept; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Uromyces armeriae (Schltdl.) Lév. [*Pucciniaceae*]

sur les feuilles et les scapes de l'*Armeria vulgaris*; dans un jardin de Namur; Mr l'Abbè Bellynck.

Uromyces behenis (DC.) Unger [*Pucciniaceae*]

sulle foglie della *Silene inflata*; nelle praterie presso la Madonna del Sasso a Locarno, lago Maggiore; Agosto 1860; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces betae (Pers.) Tul. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo betae* Pers., sulle foglie e sugli steli della barbabietola; a Locarno nella Svizzera italiana; Estate 1858; Daldini; sur le feuilles vivantes de la betterave cultivé (*Beta vulgaris* L.).

Uromyces cacaliae (DC.) Unger [*Pucciniaceae*]

sulle foglie dell'*Adenostyles alpina*; presso Riva in Valsesia; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano; né boschi di conifere; in Val Furia (Valtellina); Anzi; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces chenopodi J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. chenopodi* f. *punctati*; [...]; Genn. 1876.

Uromyces dactylidis G.H. Oth [*Pucciniaceae*]

Franconia; Bayreuth; Vere; 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *Aecidium ranunculacearum* DC.; sub: *A. ranunculacearum* DC. f. *Ranunculus auricomis*; Franconia; Bayreuth; 5. 1874; sur la *Silene inflata*; au Lui; 21 June 1874; sub: *A. ranunculacearum* DC. b. *thalictri* Grey.; sur les feuilles du *Thalictrum flavum*; dans les jardins; été; sulla pagina inferiore della *Ficaria ranunculoides*; in Valle del Serchio, Toscana; Aprile 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sur les feuilles du *Ficaria ranunculoides*; Aube; Avril 1890; A. Guyot; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; sur les feuilles de la *Ficaria* et autres Ranunculacees.

Uromyces ervi (Wallr.) Westend. [*Pucciniaceae*]

sull'*Ervum hirsutum*; nei dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale; 1869; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sur les feuilles de l'*Ervum tetraspermum*; a Gentinnes, pres de Namur; Mrs le Comte A. De Limminghe et J. Barbier; sub: *U. ervi* Westend.; sull'*Ervum hirsutum*; nei dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale; 1869; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sur les tiges mortes de l'*Ervum hirsutum*; à Salzinne, près de Namur; Mr Bellynck.

Uromyces erythronii (DC.) Pass. [*Pucciniaceae*]

dalle colline dei dintorni di Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *U. erythronii* Pass.; Collecchio presso Parma; Aprile 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *U. erythronii* Pass.; da Aranco nella bassa Valsesia; 1870; Carestia; Erbario Crittogamico Italiano ser II; sub: *U. erythronii* Fuck.; [...], Transilvania australis; 1878; sub: *U. erythronii* Lév.; sulle foglie dell'*Erythronium*; nei boschi di Sala, presso Parma; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces ficariae (Schumach.) Lév. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo ficariae* Schumach., sur les feuilles et les petioles du *Ranunculus ficaria*; environs de Courtrai.

Uromyces geranii (DC.) G.H. Otth & Wartm. [*Pucciniaceae*]

sulle foglie del *Geranium rotundifolium*; al Sasso presso Locarno; 1860; Daldini, Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Uredo geranii* DC., sur les feuilles du *Geranium dissectum*; à Live, près de Namur; Mr l'Abbé Bellynck.

Uromyces hedysari-obscuri (DC.) Carestia & Picc. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uromyces hedysari* (DC.) Fuckel f. *obscuri*; sulle foglie dell'*Hedysarum obscurum*; al monte Olen sopra Riva in Valsesia; estate 1870; Carestia, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano ser II.

Uromyces limonii (DC.) Lév. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. limonii* DC.; baja di Fondachella; 4. 1877; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Uromyces statice limoni*; alla baja di Fondachella; Apr. 1877.

Uromyces lineolatus (Desm.) J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia lineolata* Desm., Caen; 1860; Caldesi.

Uromyces muscari (Duby) Niessl [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo concentrica* Desm., sur les feuilles du *Scilla nutans*; dans les bois de Marcke, près de Courtrai.

Uromyces pisi-sativi (Pers.) Liro [*Pucciniaceae*]

sub: *Uromyces lathyri* Fuckel, Salt Lake City; August 1883; Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah; sub: *Uromyces lathyri* Fuckel, Salt Lake City; August 1883; Marcus E. Jones, A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Utah.

Uromyces polygoni-avicularis (Pers.) G.H. Otth [*Pucciniaceae*]

sub: *Puccinia aviculariae* Pers.; sur les feuilles et tiges du *Polygonum aviculare*; le long du chemin de fer de Courtrai, à Bruges; Septembre; sub: *Uromyces aviculariae* J. Schröt., Comino; 11 August 1884; Marcus E. Jones, A.M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Uromyces porosus (Peck) H.S. Jacks. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium porosum* Peck, Flogstaff; 4 August 1884; collected by Marcus E. Jones A. M.; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Uromyces prunorum Fuckel [*Pucciniaceae*]

sul *Prunus spinosa*; né boschi di Collecchio, provincia di Parma; Settembre 1866; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser II.

Uromyces rumicis (Schumach.) G. Winter [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo rumicum* DC., sur les feuilles vivantes de plusieurs espèces de *Rumex*; sub: *Uromyces rumicum* Lév., dintorni di Oldenico, provincia di Vercelli; 1860; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces scaevolae G. Cunn. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uromyces puccinioides* Rabenh.; sulle foglie del *Geranium nodosum*; a Collecchio, nel Parmigiano; estate 1864; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces scrophulariae (DC.) Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium scrophulariae* DC.; sur les feuilles du *Scrophularia nodosa*; aux environs de Sart-Custinne et de Louette-Saint-Pierre; Mr Gust. Aubert; sub: *U. scrophulariae* Ces.; sulla *Scrophularia nodosa*; a Biella; Giugno 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Puccinia scrophulariae* Lib., in foliis et caulibus *Scrophulariae nodose*; Autumnno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Uromyces scutellatus (Pers.) Lév. [*Pucciniaceae*]

sub: *U. scutellatus* (Schèk.) Lév.; *Euphorbia serrata*; a Varigotti nella Liguria occidentale; Maggio 1866; Piccone; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces trifolii-repentis Liro [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium trifolii-repentis* Castagne, territorio di Oldenico, nel Vercellese; Estate 1858; Malinverni.

Uromyces trifolii Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *U. trifolii* DC.; *Trifolium repens* L.; Zürich; Aug 1879; leg. G. Winter; sub: *U. trifolii* (Alb. et Schwein) Lév.; sur les feuilles du *Trifolium pratense*; ex legato Aug. Todaro; Herbarium R. Hort. Bot. Panormitani.

Uromyces tuberculatus (Fuckel) Fuckel [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo excavata* DC., sull'*Euphorbia spinosa*; presso Voltri, Liguria occidentale; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano; Fiume; Jun.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Uromyces veratri (DC.) J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo veratri* DC., sul *Veratrum lobelianum*; al Moncenisio; Agosto 1857; Cesati, Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano.

Uromyces viciae-fabae (Pers.) J. Schröt. [*Pucciniaceae*]

sub: *Uredo fabae* Pers., sulla *Vicia faba* coltivata; a Bellinzona; Autumnno; 1858; Franzoni; sub: *Uromyces fabae* de Bary, Sz. Lipoiz; Aug.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol; sub: *Uredo leguminosarum* Rabenh., sulle vicia; presso Oldenico nel Vercellese; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano; Lesina; leg. Batteri; sur les feuilles des plusieurs espèces de légumineuses et particulièrement sur la *Vicia faba* L.; sub: *Uromyces orobi* Fuckel, sulle foglie dell'*Orobis vernus*; presso Nesso al Lago di Como; 1866; Anzi; Erbario Crittogamico Italiano.

Uropyxis petalostemonis (Farl.) De Toni [*Uropyxidaceae*]

sub: *Puccinia petalostemonis* Fari; Billings; 8 October 1884; collected by Marcus E. Jones; Marcus E. Jones, Flora of Arizona.

Ustilago destruens Schldtl. var. *foliicola* W. Hausm. [*Ustilaginaceae*]

sulle foglie della *Carex digitata*; presso Bolzano nel Tirolo meridionale; 1860; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Ustilago filiformis (Schrank) Rostr. [*Ustilaginaceae*]

sub: *Uredo longissima* Sowerby, sur les feuilles languissantes du *Poa aquatica* L.; aux environs d'Ypres, Bruges etc.; sub: *Ustilago longissima* Fuck; sulle foglie della *Glyceria fluitans*; presso Bolzano nel Tirolo meridionale; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano.

Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. [*Ustilaginaceae*]

sub: *Ustilago carbo* (DC.) Tul. & C. Tul., sub: *Ustilago carbo* f. *cynodontis*; nelle spighe del *Cynodon dactylon*, presso Parma; Settembre 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sopra un *Bromus*; Castiglion dei Pepoli; VII. 1889; E Delpino; Herb. Delpino; nei seminati; Castiglion dei Pepoli; VII. 1889; F. Delpino; Herb. Delpino.

Ustilago maydis (DC.) Corda [*Ustilaginaceae*]

Sept.; [...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Ustilago receptaculorum Tul. & C. Tul. [*Ustilaginaceae*]

[...]; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Ustilago salweyi Berk. & Broome [*Ustilaginaceae*]

sur les feuilles languissantes du *Dactylis glomerata*; à la campagne de M me la Donairière Terlinden-Anne; à Gremberghe-lez-Termonde.

Ustilago segetum (Bull.) Roussel [*Ustilaginaceae*]

sub: *U. segetum* Link.; sull'*Avena sativa*; nei dintorni di Lucca; estate 1859; Bicchi; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. segetum* Link.; sull'*Echinochloa crus-galli*; nei dintorni di Cagliari; estate 1859; Gennari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *U. segetum* Dittm.; bei Lindberg; leg. Heufler.

Ustilago striiformis (Westend.) Niessl [*Ustilaginaceae*]

sub: *Tilletia debaryana* Fisch.; alle cariossidi della *Setaria glauca*; né dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale; autunno 1868; Hausmann; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sub: *Uredo striiformis* Westend., sur les jeunes pousses de l' *Holcus lanatus* et de l' *Anthoxanthum odoratum*; dans les bois des environs de Courtrai.

Ustilago urceolarum Tal. & C. Tul. [*Ustilaginaceae*]

sur les urcéoles du *Carex humilis*; à Ham-sur-Lesse, près de Rochefort; Mr Crépin; auf *Carex pilulifera*; Berlin: Rudawer; 6. 1877; C. Muller & W. Retzdorff, Flora Marchica; sulle nucule della *Carex precox*; lungo gli argini della Baganza, a Vigheffio provincial di Parma; Maggio 1870; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II; sulle nucule della *Carex praecox*; dintorni di Oldenico (Vercelli); Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Ustilago utriculosa (Nees) Tul. & C. Tul. [*Ustilaginaceae*]

dans les fleur du *Polygonum lapathifolium*; prairies humides; Aube: Gérosdot; 25 - September 1866; C. Duval; Ch. Magnier, Flora Selecta exsiccate; dans le germe du *Polygonum hydropiper*; dans les fossés qui bordent la route de Termonde à Lokeren; Mme Westendorp-Vanlandeghem.

Ustilago sp. [*Ustilaginaceae*]

collina sopra Chiavari; Ottobre 1887; F. Delpino; Herb. Delpino.

Ustulina deusta (Hoffm.) Lind [*Xylariaceae*]

sub: *Hypoxylon deustum* Grevill.; su tronchi d'alberi cariosi; né monti del Biellese; 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Utrechtiana arundinacea (Corda) Crous, Quaedvl. & Y. Marín [*Magnaporthaceae*]

sub: *Helminthosporium arundinaceum* Corda, Franconia: Bayreuth; 8. 1874; Ex herb. de Thümen; sub: *H. arundinaceum* Desm.; sur les feuilles de l' Arundo phragmites; à Courtrai.

Valsa capistraria De Not. [*Valsaceae*]

su verghe disseccate di Salice; nei dintorni di Locarno; 1863; Daldini; Erbario Crittogamico Italiano.

Valsa salicina (Pers.) Fr. [*Valsaceae*]

sub: *Hypoxylon salicinum* Westend. et VH., sur un vieux panier d'osier, exposé à l'air; Novembre.

Valsaria insitiva (Tode) Ces. & De Not. [*Valsariaceae*]

sub: *Cytospora rubescens* Fr. sui rami di *Sorbus aucuparia*; Santuario d'Oropa, provincia di Biella; Agosto 1860; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria robiniae* Schwein, sul finire dell'inverno; Vercelli; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Venturia chlorospora (Ces.) P. Karst. [*Venturiaceae*]

sub: *Sphaeria chlorospora* Ces., sotto l'epidermide delle foglie semiputrescenti di *Salix alba* e *S. triandra*; presso Vercelli; primavera 1858; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Venturia epilobii (Desm.) Höhn. [*Venturiaceae*]

sub: *Sphaeria asteromorpha* Lib., ad caules aridos *Epilobi angustifolii*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. I (1830).

Venturia geranii (Fr.) G. Winter [*Venturiaceae*]

sub: *Stigmataea geranii* Fr.; sulle foglie dell'*Erodium moschatum*; a S. Donato presso Bologna; Aprile 1864; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *Sphaeria geranii* Kunze, sur les feuilles de l'herbe-à-robert (*Geranium robertianum*); aux environs de Namur, communiqué par le Rév. Père Bellynck.

Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter [*Venturiaceae*]

sub: *Cladosporium dendriticum* Wallr. f. *Mespili pyracanthae* Desm.; sur les feuilles du *Mespilus pyracantha*; à la campagne de Mr Goethals-Delevigne, à Courtrai; sur les feuilles des poiriers; au jardin de Mme ve Pycke à Courtrai, ainsi qu'au jardin du Collège de la Paix, à Namur; Mr l'Abbé Bellynck; sub: *Napicladium soraueri* Thiim. Franconia: Bayreuth; 10. 1874; Ex herb. de Thümen.

Venturia maculiformis (Desm.) G. Winter [*Venturiaceae*]

sub: *Sphaerella fuckelii* Pass., su steli secchi di *Epilobium dodonaei*; nell'alveo della Baganza, a Vighèffio presso Parma; Autunno 1871; Passerini; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Venturia potentillae (Fr.) Cooke [*Venturiaceae*]

sub: *C. potentillae* Fr. f. *anserinae*; Franconia: Bayreuth; Oct 1874; Ex herb. de Thibuen; sub:

Dothidea potentillae Fr., ad folia viva *Potentillae anserine*; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Venturia pyrina Aderh. [*Venturiaceae*]

sub: *Helminthosporium pyrorum* Lib., in foliis adhuc vivis *Pyri mali* et *P. communis* L.; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. II (1832).

Venturia radiosa (Lib.) Ferd. & C.A. Jørg. [*Venturiaceae*]

sub: *Oidium radiosum* Lib., in foliis vivis *Populi tremulae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. III (1834).

Vermicularia chenopodii Westend. [*Glomerellaceae*]

sur les tiges mourantes du *Chenopodium viride* et autres; aux environs de Courtrai.

Vermicularia culmigena Desm. [*Glomerellaceae*]

sur les tiges de l'*Arrhenatherum bulbosum*; dans les bois des environs de Courtrai.

Vermicularia geranii Westend. [*Glomerellaceae*]

sur les tiges mortes du *Geranium dissectum* et autres; aux environs de Courtrai.

Vermicularia herbarum Westend. [*Glomerellaceae*]

sur les tiges mortes du *Sedum thelephilum*; dans les jardins.

Vermicularia hispida Tode [*Glomerellaceae*]

in ligno *Sambuci nigrae* et *Populi tremulae*; Vere; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Vermicularia lilicearum Westend. [*Glomerellaceae*]

sub: *V. lilicearum* a *ornithogali* Westend.; sur les tiges de l'*Ornithogalum pyrenaicum*; entre Wavreille et Bure, Namur; Mr Crépin; sub: *V. lilicearum* p *scillae* Westend.; *Scilla nutans*; aux environs de Courtrai.

Vermicularia macrochaeta Desm. [*Glomerellaceae*]

sub: *V. macrochaeta* a *cerasi* Desm.; sur les feuilles du *Cerasus lusitanicus*; Mons; le R. E Clém. Dumont.; sub: *V. macrochaeta* p *viburni* Westend.; *Viburnum tinus*; Mons; le R. P. Clém. Dumont.; sulle foglie secche dell'*Arbutus unedo*; a Persolino, presso Faenza; Settembre 1860; Caldesi; Erbario Crittogamico Italiano.

Vermicularia minuta (Link) Schwein. [*Glomerellaceae*]

sub: *V. minuta* Lib.; in caulibus herbarum aridis; Autumno; Libert, Plantae Cryptogamae Arduennae, fasc. IV (1837).

Vermicularia strigosa Lib. [*Glomerellaceae*]

Belgio; Libert.

Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. [*Morchellaceae*]

sub: *Morchella bohemica* Krombh., in silvis; pr. Briim, Moraviae; April 1866; G. Niessl; Rabenhorst, Fungi europaei; in pratis sylv.; Mai; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Verpa digitaliformis Pers. [*Morchellaceae*]

né populeti, sopra vecchi depositi di foglie marcescenti; a Quinto Vercellese; Aprile 1869; Malinverni; Erbario Crittogamico Italiano ser. II.

Virgaria nigra (Link) Nees [*Xylariaceae*]

in ramis quercinis; Sept.; Hazslinszky von Hazslin, Magyarhon viranyabol.

Volutella gilva (Pers.) Sacc. [*Nectriaceae*]

sub: *Conoplea gilva* Pers., sur les tiges mortes de l'Ortie; aux environs de Courtrai, de Bruges et de Termonde.

Volutella nivea (Fr.) Sacc. [*Nectriaceae*]

sub: *Psilonia nivea* Fr., corticis *Fagi* erumpit; per annum; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Volvariella pusilla (Pers.) Singer [*Pluteaceae*]

sub: *Agaricus parvulus* Fr.; sul limo umido; alveo della Sesia, nei tratti abbandonati dalle acque ed a pieno solatio; dalla metà di settembre a tutto l'ottobre 1862; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano.

Volvariella volvacea Singer & Wasser [*Pluteaceae*]

sub: *Agaricus volvaceus* Bull.; nei letti caldi delle serre dei giardini; Genova; Giugno 1860; Baglietto, Piccone; Erbario Crittogamico Italiano.

Xenodochnus carbonarius Schldt. [*Phragmidiaceae*]

in foliis *Sanguisorbae officinalis*; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. III (1834); sub: *Phragmidium carbonarium* Schlecht.; ad *Sanguisorba officinalis* L. folia; "Au" prope Zürich; Jul 1880; G. Winter; Johannes Kunze, *Fungi selecti exsiccati*, *Fungi helvetici* n° 143.

Xepiculopsis graminea (Lib.) Nag Raj [*Incertae Sedis*]

sub: *Myrothecium gramineum* Lib., in graminis putrescentibus; Aestate; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. IV (1837).

Xerocomus subtomentosus (L.) Quéf. [*Boletaceae*]

sub: *Boletus subtomentosus* L.; né castagneti; alla Polcevera e nelle vicinanze di Pegli, Liguria occidentale; Ottobre 1868; Baglietto; Erbario Crittogamico Italiano ser. II

Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner & Maire [*Mycenaceae*]

sub: *Omphalia campanella* Batsch; Helvetia: [...], pr. Neuchatel; 4. 1874; leg. Dr. Morthier; Ex herb. de Thümen; sub: *Agaricus campanella* Fr.; boschi frondosi; presso Bolzano; Sept 1864; Hausmann; sub: *Agaricus campanella* Fr.; né boschi frondosi; presso Bolzano, nel Tirolo meridionale; Settembre 1864; Hausmann.

Xerula pudens (Pers.) Singer [*Physalacriaceae*]

sub: *Collybia longipes* Bull., nei castagneti; Serravalle Scrivia e nelle vicinanze di Pegli, nella Liguria occidentale; Settembre-Ottobre; Baglietto, Ferrari; Erbario Crittogamico Italiano.

Xylodon papillosus (Fr.) Riebesehl, Yurch. & Langer [*Schizoporaceae*]

sub: *Thelephora papillosa* Fr., ad corticem *Pruni padi*, aliorumque fruticum; Libert, *Plantae Cryptogamae Arduennae*, fasc. I (1830).

Xylodon sambuci (Pers.) Tura, Zmitr., Wasser & Spirin [*Schizoporaceae*]

sub: *Thelephora sambuci* (Pers.) Fr., sur les troncs du sureau (*Sambucus nigra*); au parc de Saint-George, à Courtrai.

Xylaria carpophila (Pers.) Fr. [*Xylariaceae*]

sub: *X. carpophila* Westend.; sur les péricarps du hêtre tombées à terre; dans le bois humides; sub: *X. carpophila* Westend.; ai mulini di Crevola, presso Domodossola; Estate 1862; Gagliardi; Erbario Crittogamico Italiano.

Xylaria clavata (Scop.) Schrank [*Xylariaceae*]

sur du vieux bois pourri; à Ever près de Bruxelles; d'ou Mr Mathieu.

Xylaria cornuta (Hoffm.) J. Kickx f. [*Xylariaceae*]

sur le vieilles souches d'arbrennvirons de Mons; Mr l'Abbé Michot.

Xylaria hypoxylon (L.) Grev. [*Xylariaceae*]

sub: *X. hypoxylon* L. var. *cupressiformis* Micheli; ad ligna putrida; Florentia; Febbraio 1884; L. Sommier; Société Helvétique; sub: *X. hypoxylon* L.; ad ligna putrida; Florentia; Febbraio 1884; L. Sommier; Société Helvétique; sub: *X. hypoxylon* Fr.; Heufler; [...]; sub: *Xylaria cupressiformis* Fr., sur les vieilles souches dans les bois, su ceppaie di pioppo, nella Selva Pisana; Autunno 1862; Beccari; Erbario Crittogamico Italiano.

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. [*Xylariaceae*]

sub: *X. polymorpha* Grev.; sul ceppo fracido di un frassino; a Mortighingo d'Andorno, nella provincia di Biella; Agosto 1859; Cesati; Erbario Crittogamico Italiano; sub: *X. polymorpha* Fr.; Heufler; [...]; sub: *X. polymorpha* Pers.; ad truncos emortuos *Quercus roburis*; in collibus Taurinensibus (Reaglie); Sept 1888; leg. Dr. S. Belli; Société Helvétique.

Xylostroma corium Pers. [*Fomitopsidaceae*]

sur les vieux troncs; Ypres.

Zaghouania phillyreae Pat. [*Pucciniaceae*]

sub: *Aecidium phillyreae* DC., Italia media; [...]; Boboli, Florentiae; Maio 1876; legit Arcangeli; J. Arcangeli, Plantae Italicae exsiccatae.

Zasmidium lythri (Westend.) U. Braun & H.D. Shin [*Mycosphaerellaceae*]

sub: *Cladosporium lythri* Westend., a la face inferieure des feuilles languissantes du *Lythrum salicaria*; dans un petit bois taillis des environs de Courtrai.

Zythia dentariae Westend. [*Sareaceae*]

sur les tiges mortes du *Dentaria bulbifera*; aux environs de Rochefort et de Namur; Mr Crépin.

Discussion

Italy is one of the richest countries in Europe in terms of scientific collections. There are an estimated 60 million herbarium specimens in about 450 institutions.

Mycological herbaria contain important records of biodiversity and, in the case of path-

ogenic fungi have been used to understand population biology and the origin of various plant diseases. Besides, herbarium collections and associated label data provide reference material for accurate identification, biological material to study for taxonomists and other researchers, habitat information, etc.

The most substantial nucleus of the mycological herbarium of the University of Palermo (PAL) is represented by the collections of the Italian Cryptogamic Herbarium, a collection curated by the Italian Cryptogamological Society between 1858 and 1885, in which many researchers of the time participated.

1707 specific and intraspecific taxa, 698 genera, 254 families are included in this paper, most of which are mycomycetes responsible for diseases on major agricultural crops, with backgrounds from all parts of the world. This represents a clear difference from modern-day fungal diversity research more oriented toward the study of macromycetes (Ferraro & al. 2022).

Prevalent in the list are species of the genus *Ascochyta* that produce more or less corroded spots on the leaves of various cultivated *Solanaceae*, artichoke, and, asparagus; *Urocystis*, a genus of smut fungi containing plant pathogens, which infect grass species and other plants, *Erysiphe*, responsible for powdery mildew on various plants, the rust fungi (*Aecidium*, *Puccinia*), *Leptosphaeria* and *Phoma* whose symptoms mainly include basal root rot, small gray leaf lesions, and root rot and *Gnomoniaceae* and the genus *Cytospora* containing several species that cause leaf spot and canker on plants.

Herbarium samples are therefore an important resource for biodiversity conservation, especially when combined with new approaches to analysis and access to biodiversity information.

References

- Berendsohn, W. G., Anagnostopoulos, A., Hagerdon G., Jakupovic J., Nimis P. L., Valdés B., Güntschil A., Pankhurst, R. J. & White, R. J. 1999: A comprehensive reference model for biological collection and surveys. – *Taxon* **48**: 511-562. <http://doi.org/10.2307/1224564>
- Cuccuini, P. 1997: L'Erbario Crittogamico Italiano. Storia e struttura di una collezione. – Firenze.
- Ferraro, V., Venturella, G., Cirlincione, F., Mirabile, G., Gargano, M. L. & Colasuonno, P. 2022. The Checklist of Sicilian Macrofungi: Second Edition. – *J. Fungi* **8**: 566-615.
- Nepi, C. & Cuccuini, P. 1992: Collectors and collections in the “Herbarium Centrale Italicum” (Phanerogamic section). – Firenze.

Addresses of the authors:

Fortunato Cirlincione¹, Maria Letizia Gargano², Giuseppe Venturella¹, Gaetano Balenzano³, Giulia Mirabile¹, Valeria Ferraro¹, & Pasqualina Colasuonno^{2*},

¹Department of Agricultural, Food and Forest Sciences, University of Palermo, Viale delle Scienze, Bldg. 5, I-90128 Palermo, Italy;

²Department of Agricultural and Environmental Science, University of Bari Aldo Moro, Via Amendola 165/A, I-70126 Bari, Italy;

³Via delle Murge 65, 70124 Bari, Italy.

* corresponding author